

ANUARIO ORNITOLÓGICO DE LA RIOJA 2013-2015

IGNACIO GÁMEZ CARMONA*
JESÚS SERRADILLA RODRÍGUEZ*
CÉSAR M^a AGUILAR GÓMEZ*
JAVIER ROBRES CABEZÓN*
ÓSCAR GUTIÉRREZ JIMÉNEZ*

RESUMEN

En el presente artículo se exponen las observaciones ornitológicas más interesantes producidas entre los años 2013 y 2015 en La Rioja, actualizando la información existente hasta el momento. Así mismo se realiza una pequeña descripción del status, abundancia, distribución, carácter migratorio y fenología de todas las especies de aves observadas en La Rioja. Se aportan 301 citas de 121 de las 302 especies de aves silvestres observadas hasta el momento en La Rioja.

Se recogen las primeras citas en La Rioja de barnacla canadiense grande (*Branta canadensis*), busardo moro (*Buteo rufinus*), calamón común (*Porphyrio porphyrio*), archibebe fino (*Tringa stagnatilis*) y págalo grande (*Stercorarius skua*).

Las segundas citas de garceta dimorfa (*Egretta gularis*), morito común (*Plegadis falcinellus*), aguilucho papialbo (*Circus macrourus*), águila moteada (*Aquila clanga*) y aguja colipinta (*Limosa lapponica*). Y la tercera de porrón acollarado (*Aythya collaris*).

Se añaden cuatro nuevas especies a la lista de las especies exóticas escapadas de cautividad: pato joyuyo (*Aix sponsa*), ánade picopinto (*Anas pectorhynga*), flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*) y gorrión de Java (*Padda oryzivora*). Se aportan, además, 17 citas para 12 de las 32 especies que conforman la misma.

Se documenta la primera reproducción segura de barnacla canadiense grande (*Branta canadensis*) en los Sotos de Alfaro, tarro blanco (*Tadorna tadorna*) y gaviota reidora (*Chroicocephalus ridibundus*) en El Lago de Herramélluri y de calamón común (*Porphyrio porphyrio*) en El Recuenco, Calahorra. Son interesantes también, por esporádicas, la reproducción de ánade friso (*Anas strepera*) en Murillo de Río Leza, cuchara común (*Anas clypeata*) en El

Lago de Herramélluri, zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*) en la laguna de Hervías, cormorán grande (*Phalacrocorax carbo*) en el río Ebro en Gimileo y avetorillo común (*Ixobrychus minutus*) en El Recuenco, Calahorra.

Por primera vez se recogen datos de la invernada regular de martinete común (*Nycticorax nycticorax*) en La Rioja. Una pequeña población permanece en el río Ebro a su paso por Logroño todos los inviernos, al menos, desde el 2012-13.

En 2013 y 2014 se recogen numerosas observaciones de aguja colipinta (*Limosa lapponica*) durante el paso prenupcial en diferentes humedales riojanos y una en el paso postnupcial, una especie de la que anteriormente sólo se conocía una cita.

Sigue la expansión del bigotudo (*Panurus biarmicus*) en La Rioja. La especie ya se reproduce en El Salobral de Pradejón y El Recuenco de Calahorra.

Palabras clave: *ornitología, ave, anuario, La Rioja, España.*

The present article aims to show the most interesting ornithological observations carried out between the years 2013 and 2015 in La Rioja, and is an update of the existing information so far. Furthermore, this article contains a brief description of the status, abundance, distribution, migrating habits and phenology of all the species of birds observed in La Rioja. Out of the 302 wild birds registered in La Rioja, this report provides a total of 301 records for 121 of them.

Here are the first records of Canada goose (*Branta canadensis*), Long-legged buzzard (*Buteo rufinus*) in La Rioja as well as Purple swamphen (*Porphyrio porphyrio*), Marsh sandpiper (*Tringa stagnatilis*) and Great skua (*Stercorarius skua*).

We also show the second records of Western reef heron (*Egretta gularis*), Glossy ibis (*Plegadis falcinellus*), Pallid harrier (*Circus macrourus*), Greater spotted eagle (*Aquila clanga*) and Bar-tailed godwit (*Limosa lapponica*).

And the third of Ring-necked duck (*Aythya collaris*).

Four new species are added to the list of exotic species escaped from captivity: American wood duck (*Aix sponsa*), Spot-billed duck (*Anas poecilorhyncha*), Chilean flamingo (*Phoenicopterus chilensis*) and Java sparrow (*Padda oryzivora*). The article includes 17 records of 12 of the 32 species that make up the list.

For the first time, we get data about actual reproduction of the Canada goose (*Branta canadensis*) in the river Ebro in Alfaro, the Common shelduck (*Tadorna tadorna*) and the Black-headed gull (*Chroicocephalus ridibundus*) in the Lake of Herramélluri, and the Purple swamphen (*Porphyrio porphyrio*).

in El Recuenco, Calahorra. Being sporadic, it is interesting to note the reproduction of the Gadwall (*Anas strepera*) in Murillo de Río Leza, the Northern shoveler (*Anas clypeata*) in the Lake of Herramélluri, the Back-necked grebe (*Podiceps nigricollis*) in the lagoon of Hervías, the Great cormorant (*Phalacrocorax carbo*) in the river Ebro in Gimileo, and the Little bittern (*Ixobrychus minutus*) in El Recuenco, Calahorra.

For the first time, we get data of the regular wintering of the Black-crowned night heron (*Nycticorax nycticorax*) in La Rioja. Every winter, at least since 2012-13, a small population stays by the river Ebro where it crosses Logroño.

In 2013 and 2014, we get many records of the Bar-tailed godwit (*Limosa lapponica*) during their prebreeding migration in different wetlands in La Rioja; and also one record during postbreeding migration. So far we only had one record of this species.

The Bearded reedling (*Panurus biarmicus*) keeps spreading in La Rioja. This species is already reproducing in El Salobral of Pradejón and El Recuenco of Calahorra.

Key words: *ornithology, bird, yearbook, La Rioja, Spain.*

1. INTRODUCCIÓN

Se presenta el sexto volumen del Anuario Ornitológico de La Rioja (AOR) con los mismos criterios e intenciones que en los cinco anteriores (Gámez *et al.*, 1999, Gámez *et al.*, 2002, Gámez *et al.*, 2003, Gámez *et al.*, 2010 y Gámez *et al.*, 2013). En él se recogen las observaciones novedosas de aves en La Rioja realizadas entre los años 2013 y 2015, ambos inclusive. Se citan agrupadas siguiendo el orden de la Lista de las aves de España (Gutiérrez *et al.*, 2012). La primera parte de la lista corresponde a las observaciones de aves silvestres y la segunda a las de aves exóticas.

La colaboración para la elaboración de nuevos números del AOR está abierta a cualquier observador de aves que posea citas novedosas e inéditas acerca de la avifauna riojana.

Los datos de las citas se cumplimentarán, de la manera más completa, en el modelo de ficha que se puede encontrar en:

<http://ecologistasenaccion.org/larioja/aor>.

Las fichas se pueden mandar en cualquier momento del año a las direcciones de correo ornitologia.larioja@ecologistasenaccionlarioja.org o gorioja@gmail.com. Esta información será guardada hasta tener un número suficiente de observaciones para una nueva edición del AOR. En ese

momento un comité editorial valorará la relevancia de cada una y elaborará, con las que cumplan los criterios, la siguiente edición del AOR.

2. LISTADO DE COLABORADORES

AGUILAR GÓMEZ, César M ^a	GUTIÉRREZ URANGA, Itziar
ALDONZA SÁENZ, Maite	HERRERO RODRÍGUEZ, Elena
ALONSO ALONSO, Pedro	IBÁÑEZ ULARGUI, Juan Ignacio
ARAMBARRI BENGEOA, Ramón	LACANAL, David
ARENZANA, José Félix	LASHERAS LLORENTE, Ivana
AYALA SANTIBÁÑEZ, Eduardo	LÓPEZ LÁZARO, Pedro Mari
AYALA, Luis	LOPO CARRAMIÑANA, Luis
BELTRÁN de la ASCENSIÓN, José	MARÍN AVIZANDA, Miguel Ángel
BENAVIDES MADARIAGA, Diego	MAZUELAS BENITO, David
CAMIÑA CARDENAL, Álvaro	MIERA LERENA, Eduardo
CARO BERGUILLA, Anabel	MKOLTA, Sergio
CIRAC DOLADER, Fernando	MÓGICA SÁNCHEZ, Daniel
ELVIRA, Miguel A.	MOMPEL, Lorena
ESQUISÁBEL MARTÍNEZ, Ignacio	MONTELÍO BARRIO, Eugenio
EZQUERRO MANGADO, Jorge	NALDA SÁENZ-TORRE, Fco. Javier
FABEIRO ALDUNATE, Eduardo	NALDA SÁENZ-TORRE, Jesús Vicente
FERNÁNDEZ GARCÍA, José M ^a	PALACIOS, José Carlos
FURGIUELE STABILE, Gabriel	PASCUAL, Arturo
GÁMEZ CARMONA, Ignacio	PASCUAL, Ignacio Fermín
GARCÍA DÍEZ, Ángel	PÉREZ JOVER, Miguel Ángel
GARCÍA MANZANARES, Diego	PÉREZ SÁENZ, José Ignacio
GARCÍA GARCÍA, Jesús M ^a	PINEDO, Javier
GÓMEZ MIGUEL, Ignacio	PINILLOS MARTÍNEZ, José
GONZÁLEZ GARCÍA, Carlos	PISABARRO, Raquel
GONZÁLEZ PERUJO, José María	ROBRES CABEZÓN, Javier
GUTIÉRREZ EXPÓSITO, Carlos	RONCERO CRESPO, Lidia
GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, Óscar	RUIZ BALTANÁS, Eduardo

RUIZ DE AZÚA, Nerea

RUIZ, Miguel

SÁENZ, Álvaro

SÁENZ, Sandra

SERRADILLA RODRÍGUEZ, Jesús

TORRE de la, Andrés

UCHA TURUMBAY, Jesús Ángel

URBIOLA, Charo

VEGA SOLANA, Mario

VELA SERRANO, Sandra

ZALDÍVAR LÓPEZ, Ricardo

ZUAZO VELASCO, Óscar

Agradecimientos

A Teresa García Villanueva por la traducción del resumen al inglés.

3. TABLAS FENOLÓGICAS Y MAPAS


Fenología

En los diagramas fenológicos que acompañan a cada una de las especies, se representan las decenas de cada mes en que una determinada especie se encuentra presente en La Rioja de forma regular (**negro**) o irregular (**gris**), si bien para presencia de especies o poblaciones muy escasas, su presencia, regular o no, siempre se representa en **gris**.

No se incluyen datos fenológicos de las especies accidentales y de la mayor parte de las ocasionales.

Mapas de distribución


Los mapas de distribución, realizados sobre la base de cuadrículas UTM de 10 x 10 km están referidos exclusivamente a la parte riojana de las mismas cuando éstas están compartidas con otras provincias. En ellos se representan en **negro** aquellas cuadrículas donde una especie se ha reproducido al menos en una ocasión de forma probable o segura y en **gris** aquellas donde la reproducción ha sido posible en al menos una ocasión, pero no está confirmada, mientras que permanecen en **blanco** las cuadrículas en donde no se conocen datos de reproducción para una determinada especie. Estos mapas están basados en el Atlas de Aves Reproductoras de España (Martí *et al.*, 2003) y se han ido ampliando con las citas aportadas en los



sucesivos anuarios desde esa fecha. Hay que tener en cuenta, por tanto, que no reflejan la reducción en el área de distribución que se hubiera podido producir en el caso de alguna especie concreta.

Además del mapa con las cuadrículas UTM que acompaña a este texto, se adjunta como anexo, otro mapa físico de La Rioja para facilitar aún más la localización de las citas.

Para algunas especies sensibles (halcón peregrino y águila perdicera) no se ha incluido mapa de distribución.



Nombres vernáculos

A continuación del nombre científico de la especie se hace mención de los nombres vernáculos utilizados en La Rioja, ver Gámez *et al.* (2003). Sin pretender ser exhaustivos, entendemos que puede resultar interesante su conocimiento y animamos a todos los aficionados a ir recogiendo esta terminología local, sin duda muy rica, para nombrar a las especies que conviven con todos nosotros.

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

En esta edición del AOR se han incluido todas las observaciones de aves no citadas con anterioridad en La Rioja. Para las aves que ya habían sido citadas alguna vez, el interés de la observación se ha basado en la novedad, de acuerdo a los conocimientos de la especie en La Rioja y a los criterios de inclusión indicados en la anterior edición del AOR. Con la información recabada se han actualizado los criterios de inclusión (CI) para próximas citas. Estos criterios se indican al final del texto introductorio de cada especie. Para aves escasas y poco conocidas el criterio es “Todas las citas”, para otras aves se dan orientaciones concretas de aquellos aspectos que pueden ser más relevantes (concentraciones numerosas, citas invernales...). Cuando se indica “Citas de interés” se refiere a todas aquellas observaciones que supongan una novedad respecto a lo indicado en el texto, mapa de distribución y diagrama fenológico de la especie, p.e. citas de reproducción en cuadrículas no señaladas en el mapa, observaciones fuera de los periodos de presencia regular del diagrama o cualquier otro aspecto reseñable (concentraciones no usuales, comportamientos interesantes, nombres vernáculos locales, etc.).

Con carácter general, no se incluirán las citas dentro del periodo fenológico conocido, salvo que se indique lo contrario en los criterios de inclusión de cada especie.

5. LISTA SISTEMÁTICA

Cisne vulgar

Cygnus olor

Posible escape de cautividad, de procedencia seguramente cimarrona. Única cita:

1. Un ave recogida muerta por un disparo en San Vicente de la Sonsierra el 23.11.03. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2003).

CI: Todas las citas, excepto las de ejemplares de procedencia doméstica conocida.

2013

- Especie escasa. Al menos, entre el 14.04 y el 07.06 en Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), permanece un ejemplar joven en las graveras (Ignacio Gámez, Sandra Vela, Javier Robres, Óscar Gutiérrez, Jesús Serradilla y Óscar Zuazo).

- Especie escasa. El 22.06 en la laguna Mateo, San Asensio (WN2106), se localiza un joven, probablemente el mismo ejemplar de Caracarros (Diario La Rioja).

2013-14

• Especie escasa. Entre el 05.12 y el 01.01 en la laguna Mateo, San Asensio (WN2106), se ven 3 aves, 2 inmaduros nacidos en 2012 y un joven (Ignacio Gámez, Sandra Vela, Javier Robres, Sandra Sáenz, Eugenio Montelío y Jesús Serradilla).

Ánsar campestre

Anser fabalis

Únicas citas:

1. Un ave el 10.01.96 en el embalse de Leiva-Tormantos. Ignacio Gámez Carmona y Luis Lopo Carramiñana (Gámez *et al.*, 1999).

2. Un ejemplar el 30.11.10 en el embalse de Leiva-Tormantos. Óscar Zuazo Velasco (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Ánsar careto

Anser albifrons

Únicas citas:

1. Dos jóvenes el 23.11.03 en el embalse de Leiva-Tormantos. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2003).

2. Dos aves el 12.12.07 en el mismo embalse. Jesús Serradilla Rodríguez (Gámez *et al.*, 2010).

3. Tres adultos y un joven el 18.12.09 también en ese embalse. Diego Benavides Madariaga (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Ánsar común

Anser anser

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Regular en migración por toda la región, principalmente en el valle del Ebro y pasos de montaña. En invierno resulta mucho más escaso, con sólo algún pequeño bando invernante en zonas apropiadas del valle.

CI: Citas de interés.

Barnacla canadiense grande

Branta canadensis

Primera cita para La Rioja.

CI: Todas las citas.

2013

• Rareza. Entre el 18.05 y el 24.09 en La Nava, Alfaro (XM0472), se confirma la reproducción de una pareja de la especie. En mayo y junio se observa la pareja y a partir del 11.09 se localizan en diferentes ocasiones los 2 adultos y 5 pollos hasta el 24.09 (Sandra Vela, Javier Robres, Ignacio Gámez y Jesús Ángel Ucha).

Barnacla cariblanca

Branta leucopsis

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

el invierno.

Observaciones esporádicas de ejemplares durante las migraciones o

CI: Todas las citas.

2015

• Especie escasa. El 02 y el 04.03 en Cantamilanos, Murillo de río Leza (WM59), se observan 2 adultos y 3 juveniles (Ignacio Gámez Carmona).

Tarro canelo

Tadorna ferruginea

Los ejemplares observados pueden proceder de escapes o de poblaciones asilvestradas. Citas anteriores:

1. Entre el 24.09 y el 16.10.05 una hembra adulta en La Degollada, Calahorra. Ignacio Gámez Carmona y Fco. Javier Nalda Sáenz-Torre (Gámez *et al.*, 2010).

2. Un macho adulto el 08 y 09.09 en San Vicente de la Sonsierra. Miguel Ángel Crespo Matute e Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2013).

3. Un joven entre el 09 y el 27.09.09 en el embalse de La Grajera, Logroño. Anabel Caro, Ignacio Gámez y Diego Benavides (Gámez *et al.*, 2013).

4. Tres aves el 16.06.11 en los sotos de Alfaro, Alfaro. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2013).


CI: Todas las citas.

2015

• Rareza. Entre el 27.09 y el 12.10 en los sotos de Alfaro, Alfaro (XM0472), se observa un ejemplar (Andrés de la Torre, Raquel Pisabarro, Javier Robres, Ignacio Gámez y Jesús Ángel Ucha).

Tarro blanco

Tadorna tadorna



2015

- Reproducción segura. Durante la temporada de cría en El Lago, Herramélluri (WN0005), se confirma la reproducción de una pareja que cría 3 pollos pero que finalmente desaparecen antes de llegar a volar (Ignacio Gámez Carmona).

Escaso en migración en humedales del valle del Ebro, donde también se observa en invierno algún ejemplar. Más raro el resto del año y con solo una reproducción comprobada en 2015.

CI: Citas de interés.

2013

- Fecha inusual. El 04.05 en Santa Cruz, Alfaro (WM9968), se observan 3 ejemplares en el humedal temporal (Javier Robres, Óscar Gutiérrez y Jesús Serradilla).

Pato mandarín


Aix galericulata

Especie ocasional con citas invernales que posiblemente corresponden a aves cimarronas dispersas por los parques europeos. Puede haber observaciones de ejemplares escapados de cautividad.

CI: Citas de interés.



Silbón europeo

Anas penelope



Pequeña población invernante en humedales del valle del Ebro, donde también se observa escaso, pero más repartido, durante las migraciones.


CI: Citas de interés.

Ánade friso*Anas strepera*

Bañares-Turburo, Bañares (WN0601), se ven 2 machos y 2 hembras en el agua (Óscar Zuazo Velasco).

2015

- Cría segura. El 24.08 en la balsa del Trashumo, Murillo de Río Leza (WM69), se localizan 2 jóvenes que aún no vuelan cruzándola de una orilla a otra para esconderse entre el carrizo (Ignacio Gámez Carmona).

Cerceta común*Anas crecca*

Común en migración y algo más escaso en invierno, en las localidades más favorables del valle del Ebro. Esporádicamente, se observan algunos ejemplares en época de reproducción, que ocasionalmente llegan a nidificar.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

2013

- Últimas observaciones, paso prenupcial. El 27.05 en la laguna de

Bañares-Turburo, Bañares (WN0601), se ven 2 machos y 2 hembras en el agua (Óscar Zuazo Velasco).


2015

- Cría segura. El 24.08 en la balsa del Trashumo, Murillo de Río Leza (WM69), se localizan 2 jóvenes que aún no vuelan cruzándola de una orilla a otra para esconderse entre el carrizo (Ignacio Gámez Carmona).

Invernante común en humedales del valle del Ebro y más raro en la sierra, apareciendo más disperso y en mayor número durante la migración. Se conocen citas antiguas de reproducción en humedales de montaña.

CI: Citas de interés.

Ánade azulón




Anas platyrhynchos

Disperso como nidificante en toda la región, especialmente en el valle del Ebro. Se encuentra desde acequias y encharcamientos temporales hasta grandes embalses y cauces fluviales. A la población indígena, parcialmente migradora y dispersiva, se le unen muchas aves en migración y durante el invierno.

CI: Citas de interés.

Ánade rabudo



Anas acuta

Población invernante muy reducida e irregular, que se localiza únicamente en los humedales más favorables del valle del Ebro. Aparece algo más común y disperso en migración.


CI: Concentraciones numerosas (> 20) y otras citas de interés.

2014

- Fecha inusual. El 08.05 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observa un ejemplar (Óscar Zuazo Velasco).

Cerceta carretona

Anas querquedula



Migrante que aparece siempre en reducido número y normalmente sólo en el paso prenupcial. Se le localiza en cualquier humedal del valle del Ebro, con frecuencia en encharcamientos temporales.



CI: Citas fuera del periodo regular y otras citas de interés.

2015

- Concentración numerosa. El 02.04 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se cuentan 26 aves (Ignacio Gámez Carmona).
- Últimas observaciones. Paso prenupcial. El 26.04 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se ven 15 aves (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres

Cabezón).

Cuchara común



Anas clypeata

Población moderada en invierno y más común en migración. De forma esporádica permanecen algunos ejemplares durante la época de reproducción en humedales favorables del valle del Ebro donde crían esporádicamente.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

2013

- Cría segura. El 09.06 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se localiza una pareja. El 11.08 se ve la pareja con 5 pollos que aún no vuelan (Ignacio Gámez Carmona y Sandra Vela Serrano).

2015

- Concentración numerosa. El 02.04 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se cuentan 240 ejemplares (Ignacio Gámez Carmona).

Cerceta pardilla

Marmaronetta angustirostris


Únicas citas:

1. Un joven con anilla de criador el 26.08.06 en el río Najerilla, Bobadilla. José Félix Arenzana e Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

2. Un joven sin anillas el 28.11.09 en la balsa de Oribe. Jesús Ángel Ucha Turumbay (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Pato colorado




Netta rufina

Hasta principios de los años noventa, parejas aisladas se reproducían de forma irregular en algunos humedales del valle del Ebro (La Grajera, El Perdiguero, El Recuenco y Oribe). Desde entonces se carece de observaciones en época de nidificación, siendo además muy escasas las observaciones de invierno o de migrantes, aunque algo más comunes en paso postnupcial.

CI: Citas de interés.

Porrón europeo



Aythya ferina

Invernante y migrante regular, con ejemplares aislados en época de reproducción que llegan a criar esporádicamente.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

2013

- Fecha inusual. El 03.06 en las graveras de Caracaros, Villalobar de Rioja (WN0302), se observa un macho (Óscar Zuazo Velasco).

2014

- Concentración numerosa. El 27.11 en el embalse de La Grajera, Logroño (WM4099/WM4199), se cuentan en total 671 aves repartidas en dos grupos, uno de 490 ejemplares y otro de 185 en el que también había 4 cucharas (Pedro Mari López, Maite Aldonza y Charo Urbiola).

2015

- Fecha inusual. El 06.06 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observan 3 machos y 3 hembras (Óscar Zuazo Velasco).
- Fecha inusual. El 05.07 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se ve un ejemplar (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).
- Ampliación área de distribución. El 12.07 en la laguna de Hervías, Hervías (WN1100), se ven 3 machos y 3 hembras. El 20.07 seguían las 6 aves y se localiza una hembra con 6 pollos. El 28.07 se observa la pareja con 5 pollos (Ignacio Gámez, Javier Robres y Óscar Zuazo).

Porrón acollarado

Aythya collaris

Únicas citas:

1. Un macho adulto entre el 04 y el 20.01.06 en el embalse de Leiva-Tormentos. Diego Benavides, Ignacio Gámez, Ana del Fresno, Sebastián Lara, Fco. Javier Nalda, Maite Aldonza, GOR (Gámez *et al.*, 2010).

2. Un macho entre el 03 y el 12.02.06 en el embalse de La Grajera, Logroño. Ignacio Gámez, Ana del Fresno, Jesús Serradilla, Fco. Javier Nalda y Óscar Gutiérrez (Gámez *et al.*, 2010).

CI: Todas las citas.

2014

- Raza. El 12.12 en La Grajera, Logroño (WM4099), se observa un macho en el embalse (Sandra Vela Serrano).

Porrón pardo

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Aythya nyroca

Ejemplares aislados se observan raramente en humedales del valle del Ebro, tanto en invierno como en migración postnupcial.

CI: Todas las citas.

2014

- Especie escasa. El 29.04 en el embalse de El Perdiguero, Calahorra (WM8482), se ve un macho adulto (Ignacio Gámez Carmona).

2015

- Especie escasa. El 25.01 en el embalse de La Grajera, Logroño (WM4099), se observa un ejemplar (Itziar Gutiérrez Uranga).

Porrón moñudo

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Aythya fuligula

Invernante escaso y de forma localizada en algún embalse del valle del Ebro, viéndose más repartido en migración. Se conocen observaciones aisladas de ejemplares no reproductores en época estival.

CI: Citas en el periodo estival y otras citas de interés.

2013

- Fecha inusual. Entre el 22.05 y 03.06 en las graveras de Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), permanece una pareja. Hasta el 19.06 se observa sólo al macho y el 02.07 se localiza únicamente a la hembra (Óscar Zuazo, Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

2015

- Fecha inusual. El 28.07 en la laguna de Hervías, Hervías (WN1100), se observa una pareja (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

Porrón bastardo

Aythya marila

Única cita:

1. Un macho el 02.12.06 en las balsas de La Molineta, Alfaro. Jesús M^a García García (Gámez *et al.*, 2010).

CI: Todas las citas.

Negrón especulado

Melanitta fusca

Única cita:

1. Un macho joven entre el 12.03 y el 05.04.12 en el embalse de El Perdiguero, Calahorra. Jesús Ángel Ucha, Ignacio Gámez, Eugenio Montelío, Javier Robres, Sandra Vela y José Pinillos (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Porrón osculado

Bucephala clangula


Únicas citas:

1. Dos aves del 17 al 22.01.87 en La Grajera, Logroño (Gómez *et al.*, 1987).

2. Un ave el 09.03.87 en El Perdiguero, Calahorra. José M^a González y Luis Lopo (González, 1996).

CI: Todas las citas.

Perdiz roja





Alectoris rufa

Común en toda la región, desde el valle del Ebro a las cimas montañosas. Desaparece en las extensas áreas forestales, excepto en los carrascales. Se detecta una evidente regresión en los últimos años.

CI: Citas de interés.

E F M A M J J A S O N D

Perdiz pardilla



ta un bando de 7 aves en una zona de pastizal con brezos aislados y muy rastroeros por el pastoreo (Diego García Manzanares).

Perdix perdix

Hasta finales del siglo pasado se localizaba en cimas montañosas desde La Demanda al Hayedo de Santiago. En la actualidad su población se encuentra en regresión, tanto en tamaño como en amplitud de su área de distribución.



CI: Todas las citas.

2015

- El 18.11 en Hoyos del Calvario, Viniegra de Abajo (WM1054), se levanta un bando de 7 aves en una zona de pastizal con brezos aislados y muy rastroeros por el pastoreo (Diego García Manzanares).

Codorniz común

Coturnix coturnix



Población estival común en zonas del valle del Ebro y media montaña de toda la región, siendo escasa en praderas de montaña; en todas estas zonas se aprecia también el paso de migrantes. Escasas observaciones invernales en el valle del Ebro, de las cuales alguna podría corresponder a sueltas cinéticas de codorniz japonesa (*Coturnix japonica*).

CI: Citas de interés.

Colimbo chico

Gavia stellata

Única cita:

1. Un ave joven entre el 15 y el 22.12.05 en el embalse de Leiva-Tormanos. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

CI: Todas las citas.

Colimbo grande

Gavia immer

Únicas citas:

1. Un ejemplar el 08.12.06 en Inestrillas. Ignacio Gámez, Diego Benavides y Sandra Vela (Gámez *et al.*, 2010).
2. Un ave entre el 27.12.06 y el 23.01.07 en el embalse de Mansilla (Lasheras y González, 2007).

CI: Todas las citas.

Zampullín picogruoso

Podilymbus podiceps


Divagante americano. Única cita:

1. Un ave entre el 19.02.2001 y el 20.09.2002 en el embalse de La Grajera y el río Ebro a su paso por Logroño (Gámez *et al.*, 2002; Gámez *et al.*, 2003).

CI: Todas las citas.

Zampullín común

Tachybaptus ruficollis




Nidificante disperso en bastantes humedales del valle del Ebro, desde pequeñas balsas a embalses y remansos del Ebro, apareciendo raro en humedales de montaña. Invernante y migrante regular.

CI: Citas de interés.

2013

- Ampliación área de distribución. El 30.07 en una charca próxima a la carretera a Villalba de Rioja, Haro (WN0915), se localizan 2 jóvenes

(Eugenio Montelío Barrio y Jesús Serradilla Rodríguez).

Somormujo lavanco*Podiceps cristatus*

Nidificante localizado en algunos humedales, tanto del valle del Ebro como de la montaña, aumentando su población durante la migración y el invierno.


CI: Concentraciones numerosas (> 50) y otras citas de interés.

Somormujo cuellirrojo*Podiceps grisegena*

Única cita:

1. Un ave entre el 05 y el 08.01.93 en El Recuenco, Calahorra (González, 1996); Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 1999). También el 08.01.93 en el embalse de El Perdiguero, Calahorra. Carlos Gutiérrez Expósito (Gámez *et al.*, 1999).

CI: Todas las citas.

Zampullín cuellinegro*Podiceps nigricollis*

Hasta 1992, parejas aisladas nidificaban de forma esporádica en humedales del valle del Ebro como El Perdiguero y El Recuenco de Calahorra y posiblemente también en El Salobral de Pradejón. Desde entonces son muy raras las observaciones en cualquier época del año, si bien pudieran ser más comunes las de migrantes o invernantes aislados. En 2012 y 2015 se comprueba de nuevo la reproducción con éxito de esta especie en La Rioja.

CI: Todas las citas.

2015

- Ampliación área de distribución. Reproducción segura. El 20.07 en la laguna de Hervías, Hervías (WN1100), se localiza una pareja con dos pollos. Durante los meses de agosto y septiembre se siguen viendo los 4 ejemplares. El 13.10 había uno en plumaje invernal (Ignacio Gámez, Javier Robres, Lidia Roncero, David Mazuelas, Óscar Gutiérrez, Pedro Alonso y Jesús Serradilla).

- Especie escasa. El 22.10 en el embalse de Leiva (VN9405), se observa un ave en plumaje invernal (Jesús Serradilla Rodríguez).

Pardela cenicienta

Calonectris diomedea



Única cita:

1. Un adulto de la subespecie atlántica (*C. d. borealis*), el 04.05.01, ingresa en CRFS de La Fombera. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2003).

CI: Todas las citas.

Cormorán grande

Phalacrocorax carbo



Ha existido algún intento de reproducción en un par de localidades riojanas con variado éxito, no siendo esto algo regular, aunque en 2015 ha criado de nuevo en La Rioja. Inverna sobre todo en el cauce del Ebro y humedales del valle de este río, penetrando en menor número en otros ríos y humedales de montaña donde resulta más frecuente en migración. Cada vez son más frecuentes las aves, generalmente inmaduros, que permanecen en La Rioja en los meses estivales.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

2015

- Reproducción segura. El 02.05 en el río Ebro, Gimileo (WN11), se localizan, durante un trayecto en kayak, 9 nidos en unos chopos, la mayoría ocupados (César M^a Aguilar Gómez).

Avetoro común*Botaurus stellaris*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D


invernantes raros y esporádicos.

CI: Citas de interés.

2015

- Lugar no habitual. El 22.04 en el río Tirón, Tormantos (VN9405), se observa un ejemplar entre la vegetación palustre (Eduardo Miera Lerena).

Escaso y localizado, aunque regular, durante las migraciones, con algunos

Avetorillo común*Ixobrychus minutus*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Recientemente se ha vuelto a comprobar su cría en La Grajera (Logroño) y El Recuenco (Calahorra), donde se conocían citas antiguas de reproducción. Se trata, en cualquier caso, de una especie muy escasa. Quizás algo más común en migración.

CI: Todas las citas.

2014



- Especie escasa. El 07.06 en el embalse de La Grajera, Logroño (WM4099), se observa en dos ocasiones un macho volando junto al carrizo (Eduardo Ayala y Luis Ayala).

2015

- Reproducción segura. Durante los meses de junio y julio en la balsa de El Recuenco, Calahorra (WM8880), se observa repetidamente una pareja aquerenciada en el humedal y aportando material al nido, aunque no llegó a comprobarse su éxito reproductor (Ignacio Gámez Carmona).

Martinete común

Nycticorax nycticorax



2013

- Invernada. El 15.02 en el soto de La Sabuquera, Logroño (WN4702), se ven 4 aves posadas en un sauce de la orilla del río Ebro. Durante todo el invierno se ha observado un ejemplar en el mismo sauce (Eduardo Ayala Santibáñez). El 26.02 se localiza un adulto posado en la orilla del río Ebro, frente al embarcadero (Jesús Serradilla Rodríguez).

2014

- Observación invernada. El 26.01 en el parque de La Ribera, Logroño (WN4702), se ven, entre dos luces, 2 aves volando río arriba, desde el palacio de Congresos hasta la zona de la presa de la minicentral, donde se pierden de vista. El 05.02 se observa un adulto en la orilla del Ebro, junto al puente de la autovía, al atardecer (Jesús Serradilla Rodríguez).

2014-15

- Invernada. Durante el invierno 14-15 en Logroño (WN4502/WN4702) se hace el seguimiento de una pequeña población invernante compuesta por un máximo de 15 ejemplares: 7 adultos, 2 subadultos y 6 jóvenes. Las aves tienen querencia por dos posaderos donde pasan el día, uno al lado del puente de la circunvalación, en la margen izquierda del río Ebro y otro en el talud del parque de La Concordia, también al lado del Ebro. Los adultos de este posadero también utilizan los sauces y fresnos de la isla de la minicentral. El 15.03 sólo permanece un adulto en la isla de la minicentral (Jesús Serradilla Rodríguez).

2015

- Invernada. El 03.12 en el parque del Ebro, Logroño (WN4502/WN4702), se observa un adulto y un joven posados en la orilla del río Ebro, al lado de puente de piedra ya anochecido. El 28.12 se cuentan 8 aves (6 adultos y 2 jóvenes) en el posadero al lado de la circunvalación (Jesús Serradilla Rodríguez).

Aunque cría en La Grajera y El Recuenco, en época reproductora, puede ser visto por todo el valle del Ebro, siendo menos frecuente en la mitad occidental. En migración se le observa más disperso en cualquier humedal del valle y en los principales de la sierra. Desde el invierno 2012/13 se conoce un pequeño grupo invernante en el río Ebro a su paso por Logroño.

CI: Citas de interés.


Garcilla cangrejera*Ardeola ralloides*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

el paso postnupcial.

CI: Todas las citas.

Migrante escaso durante el paso pre-nupcial y con raras observaciones en

Garcilla bueyera*Bubulcus ibis*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

dra Sáenz).

Reproductor regular desde los años 2004 y 2005 en La Grajera y El Recuenco respectivamente, dando lugar a observaciones en la mitad oriental del valle del Ebro. Invernantes escasos en la misma zona.

CI: Citas de interés.

2013

- Observación invernal. El 11.12 en el embalse de Leiva-Tormantos (VN9405), se observan 3 ejemplares (Ignacio Gámez, Javier Robres y Sandra Sáenz).

Garceta dimorfa*Egretta gularis*

Divagante. Única cita:

1. Un adulto entre el 14 y el 16.06.11 en los sotos de Alfaro, Alfaro. Pilar Azpiroz, Fernando Pavón, Bruno Iglesias e Ignacio Gámez (Gámez *et al.*, 2013).



CI: Todas las citas.

2014

- Rareza. El 31.07 en el embalse de Mansilla, Mansilla de la Sierra (WM06), se observa un adulto (Ivana Lasheras Llorente).

Garceta común

Egretta garzetta




Reproductor regular desde 2002 en La Grajera y desde 2004 en El Recuenco, respectivamente. En migración aparece más dispersa por todo el valle, existiendo regulares, aunque escasas, observaciones invernales en el Ebro y zonas cercanas a él.

CI: Citas de interés.

Garceta grande

Egretta alba



Especie con observaciones regulares todo el año, siendo más frecuente en migración y en invierno, sobre todo en el valle del Ebro y en el curso bajo de sus principales afluentes. Presenta una evolución positiva en los últimos años.



CI: Concentraciones numerosas (> 20) y otras citas de interés.

2013

- Concentración numerosa. El 26.12 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se localiza un grupo de 23 aves en la barra de grava (Jesús Serradilla Rodríguez).

Garza real

Ardea cinerea



Nidificante regular en varios humedales de La Rioja Baja, en el embalse de Leiva-Tormantos y puntualmente en el Ebro. También regular, pero más escasa en invierno y algo más común en migración.

CI: Citas de interés.

2013

- Ampliación área de distribución. El 26.04 en el Salobral, Pradejón



(WM7886), se localizan 3-4 parejas nidificando (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

2014

- Lugar de nidificación. El 02.04 en el Salobral, Pradejón (WM7886), se observan varios ejemplares incubando en el carrizal. Se encuentra un mínimo de 3 nidos (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

Garza imperial

Ardea purpurea



2013

- Localidad de cría. Durante la temporada de cría en el Salobral, Pradejón (WM7886), se comprueba la reproducción de la especie (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

2014

- Localidad de cría. El 02.04 en el Salobral, Pradejón (WM7886), se ven, al menos, 4 ejemplares en el carrizal y se oyen pollos pequeños en algunos puntos (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

- Últimas observaciones. Entre el 11 y el 14.10 en el parque del Ebro, Logroño (WN4502), se localiza un joven posado entre la vegetación palustre de la orilla del río Ebro próxima al embarcadero (Jesús Serradilla Rodríguez).

2015


- Fecha inusual. Entre el 07 y el 10.11 en la ribera del río Ebro, Agoncillo (WN50), se observa un ejemplar (Javier Pinedo).

Salvo las colonias reproductoras de El Recuenco en Calahorra y de La Grajera en Logroño, el resto de la población nidificante se distribuye en parejas aisladas a lo largo del cauce del Ebro, entre Fuenmayor y Alfaro, así como en los tramos bajos del Leza, Cidacos y Alhama y ciertos carrizales de la mitad oriental del valle del Ebro. Algunas aves se observan también en migración.

CI: Citas de interés.

Cigüeña negra

Ciconia nigra



Regular, aunque escaso, migrante en ambos pasos, más común durante la migración otoñal. Existen esporádicas observaciones en verano.

CI: Concentraciones numerosas (> 10 ejemplares), estivales y otras citas de interés.

2014

- Últimas observaciones. El 31.10 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se observa un adulto que llega volando, se posa en la barra de grava y se queda descansando (Jesús Serradilla Rodríguez).


2015

- Concentración numerosa. El 12.03 en Cofín, Alfaro (WM97), se ve un bando de 13 ejemplares ciclando para dirigirse al norte (Ignacio Gámez, Nacho Esquisábel, Ricardo Zaldívar y Elena Herrero).

- Últimas observaciones. El 24.10 en Manantiales, Hormilla (WM1997), se localiza un adulto ciclando muy bajo sobre la autovía (Óscar Zuazo Velasco).

Cigüeña blanca

Ciconia ciconia



Nidificante común en todo el valle del Ebro y muy frecuente en migración, siendo escasa en invierno. Las parejas históricas de localidades de media montaña han ido desapareciendo mientras las del valle se han incrementado y agregado en colonias cada vez mayores.

CI: Citas de interés.

Morito común

Plegadis falcinellus

Única cita:

1. Tres aves en la laguna de Hervías el 17.05.95 (Calvo *et al.*, 1996).

CI: Todas las citas.

2013

- Raza. El 11.10 sobre el casco urbano de Villamediana de Iregua (WM4797), se observa un bando de 12 ejemplares en vuelo migratorio desplazándose hacia el oeste (Javier Robres, Ignacio Gámez y Sandra Sáenz).

Espátula común*Platalea leucorodia*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante escaso, aunque regular, con observaciones mayoritarias duran-

te el paso postnupcial.

CI: Citas de interés.

2013

- Últimas observaciones. Paso postnupcial. El 07.10 en el embalse de Leiva-Tormantos (WN9405), se ven 11 ejemplares, uno de ellos con anillas de colores (Ignacio Gámez, Javier Robres y Sandra Sáenz).

2014

- Últimas observaciones. Paso prenupcial. El 04.05 desde el mirador de La Nava, Alfaro (XM0472), se observa un adulto con anillas de colores, alimentándose en el río Ebro. El ave fue anillada como pollo el 08.06.11 en Onderdijk, Holanda (César M^a Aguilar, Jesús Ángel Ucha, Javier Robres, Óscar Gutiérrez y Jesús Serradilla).

- Últimas observaciones. Paso postnupcial. El 01.11 en los sotos de Alfaro (XM0472), se ve un joven (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

2015

- Primeras observaciones. Paso postnupcial. El 17 y 18.08 en el embalse de Leiva-Tormantos (WN9405), permanece un joven en la cola del mismo (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Concentración migratoria. El 02.09 en el embalse de Leiva-Tormantos (WN9405), se observa un bando de 17 aves, 14 adultos y 3 jóvenes, descansando primero y alimentándose después, en la cola del mismo (Jesús Serradilla Rodríguez). El 04.09 había 19 ejemplares, uno de ellos, adulto, con anilla ADBH en la pata derecha. Fue anillado como pollo en 04.05.12 en Îlot de Besson, Grande Camargue, Francia (Jesús Serradilla Rodríguez y Pedro Alonso Alonso).

- Últimas observaciones. Paso postnupcial. El 13.10 en el embalse de Leiva-Tormantos (WN9405), se ven 3 aves en la cola del mismo. Una de ellas llevaba anillas de colores (Jesús Serradilla Rodríguez).

Flamenco común*Phoenicopterus ruber*

Únicas citas:



1. Un inmaduro el 11.10.91 en el embalse de la Grajera, Logroño (Gámez, 1993a).

2. Un ejemplar el 07.05.06 en una balsa de Alfaro. Asociación Izate (Gámez *et al.*, 2010).

CI: Todas las citas.

Abejero europeo

Pernis apivorus





Nidificante escaso en bosques de montaña de toda la región, sobre todo del SO, con parejas aisladas en Obarenes y Sierra La Hez. Mucho más común en migración, principalmente en la postnupcial, en cualquier punto de La Rioja.

CI: Concentraciones numerosas (> 25) y otras citas de interés.

Elanio común

Elanus caeruleus



Especie escasa con nidificación esporádica en otoño-invierno coincidiendo con los años en los que hay abundancia de topillos. La primera reproducción conocida en La Rioja tuvo lugar en 2004.

CI: Citas de reproducción y otras citas de interés.

2013

- Especie escasa. Entre el 26.01 y el 11.02, entre Sotés y Navarrete (WM39), permanece un adulto (Óscar Gutiérrez).

re, Javier Robres, Ignacio Gámez y Jesús Serradilla).

- Especie escasa. El 03.09 en el alto de S. Antón, Alesón (WM2695), se observa un adulto en vuelo sobre la carretera N-120 (Jesús Vicente Nalda Sáenz-Torre).

- Especie escasa. Entre el 02 y el 18.12 en La Laguna y Los Ausejos, Albeite (WM59), se realizan diferentes observaciones de una pareja primero a la que se ve copulando en una ocasión y, posteriormente, de un único ejemplar a partir del 05.12 muy aquerenciado en la zona (Javier Robres, Ignacio Gámez y Eduardo Ruíz).

2013-14

- Especie escasa. Entre el 11.12 y el 15.02 en San Moral, Briones (WN10), se llevan a cabo varias observaciones de una pareja muy aquerenciada en

una zona de almendros. Se llega a ver a los adultos realizando defensa del territorio frente a milanos reales (11.12) y un adulto posado junto al nido (15.02). Hay otras observaciones de un único ejemplar (Ignacio Gámez, Javier Robres, Sandra Sáenz y Eugenio Montelío).

2014


- Especie escasa. El 15.01 en Alesón (WM2594), se observa un adulto posado en un cable del tendido telefónico comiendo una presa (Jesús Serradilla Rodríguez).
- Especie escasa. El 02.11 en Hormilla (WM19), se localiza un ave volando sobre viñedos y cultivos de regadío (Óscar Gutiérrez Jiménez y Lidia Roncero Crespo).
- Especie escasa. Entre el 03.11 y el 05.12 en San Moral, Briones (WN10), se comprueba la reproducción de una pareja que saca adelante a 2 pollos (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).
- Especie escasa. El 06 y 07.11 en Los Ausejos, Alberite (WM59), se localiza un adulto, el primer día cazando una presa y el segundo acosando a una calzada (Sandra Vela Serrano y Javier Robres Cabezón).
- Especie escasa. El 31.12 en Ventosa (WM3095) se observa un ejemplar posado junto a la autovía a la altura del cruce a esa población (Lidia Roncero, David Mazuelas y Óscar Gutiérrez).

2015

- Especie escasa. Entre el 21.01 y el 16.02 entre Alberite y Lardero (WM49), permanece un adulto (Mario Vega Solana e Ignacio Gámez Carmona).
- Especie escasa. El 27.02 en la carretera Entrena-Navarrete, Navarrete (WM39), se localiza un adulto en un bosque de cañas (Ignacio Gámez, Sandra Vela, Javier Robres y Sandra Sáenz).
- Especie escasa. El 20.03 en La Hoz, Quel (WM8066), se observa un ejemplar aparentemente adulto (Jesús Ángel Ucha Turumbay).
- Especie escasa. El 24.04 en Campo Viejo, El Villar de Arnedo (WM78) se ve un ejemplar en dos ocasiones en vuelo de caza y haciendo cernidos (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).
- Especie escasa. El 06.06 en La Apodaca, Alberite (WM4995), se observa un adulto (Ignacio Gámez Carmona).

Milano negro

Milvus migrans



observan 2 aves (Jesús Serradilla Rodríguez).

Población nidificante común en sotos y bosquetes del valle del Ebro. También se observan no pocas aves en migración, pudiendo entonces presentarse en la montaña.



CI: Concentraciones numerosas (> 50), invernada y otras citas de interés.

2014

- Observación invernada. El 27 y 29.01 en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Nájera (WM2198), se localiza un ejemplar. El 03.02 se

Milano real

Milvus milvus



mado la población nidificante que posiblemente sea inferior a las 5 parejas.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

2013-14

- Invernada. El censo de invernantes en los dormideros conocidos de La Rioja Alta arrojó un número de 627 aves (Jesús Serradilla Rodríguez y Eugenio Montelío Barrio).

2014

- Nidificación probable. El 07.03 en una zona forestal entre Matute y Tobía (WM1582), se observa una pareja haciendo picados y agarres de patas en el aire (César M^a Aguilar Gómez). No se vuelven a ver los ejemplares, pero el

22.06 a 7 km al NE, en Riograsa, Baños de Río Tobía (WM1989), se observa un adulto volando (José Pinillos Martínez) que bien podría corresponder a un ejemplar de la pareja o a un individuo estival. No obstante, el AOR 2009-12 recoge una cita el 29.07.12 de un juvenil en la zona (WM1682) por lo que probablemente haya una pareja establecida en algún lugar del piedemonte de Matute.

2015

- Dormidero. El 08.02 en Entrena (WM3994) se localiza un dormidero en una chopera con 70 milanos. Este dormidero no se conocía de censos anteriores. El 14.02 se observa en él un ave con marca alar NA [C39] que fue anillado como pollo en Thuringia, Alemania, el 9.06.14. En el dormidero y alrededores había 48 aves (Jesús Serradilla Rodríguez).

Pigargo europeo

Haliaeetus albicilla

Divagante accidental. Única cita:

- Un inmaduro, al menos, entre el 15.12.04 y el 24.01.05 en la laguna de las Cañas de Viana (Navarra) y los sotos del Ebro en Logroño y Agoncillo. Ignacio Gámez Carmona y Jesús Serradilla Rodríguez (Gámez *et al.*, 2010).

CI: Todas la citas.

Quebrantahuesos

Gypaetus barbatus

Ejemplares aislados, normalmente jóvenes o inmaduros, se observan anualmente en la montaña en dispersión desde el Pirineo y, tras el inicio del programa de reintroducción andaluz, algún ejemplar procedente de Cazorra (Jaén). Se debió extinguir como reproductor en La Rioja hacia mediados del siglo XX.

CI: Todas las citas.

2013

- Especie escasa. El 24.09 en Vistalegre, Albelda de Iregua (WM4291), se observa un adulto en vuelo en dirección SE junto a la carretera N-111 (Jesús Nalda Sáenz-Torre).

2014

- Especie escasa. El 26.02 desde el mirador del Leza, Soto de Cameros (WM48), se ve un ejemplar de 4-5 años volando alto y desapareciendo hacia el S-SO (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

2013-15

- Especie escasa. Durante estos tres años, en una amplia área comprendida entre el Pico de Urbión y Peñaescalera, correspondiente a los términos

municipales de Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo y Brieva de Cameros, se ha comprobado la presencia casi permanente de quebrantahuesos en La Rioja, con observaciones de ejemplares aislados y, en ocasiones, de 2 y hasta 3 ejemplares a la vez. Estas mismas aves también se han visto ocasionalmente en localidades riojanas próximas como Torrecilla en Cameros, El Rasillo, Ortigosa de Cameros, Canales de La Sierra, Mansilla de La Sierra, Ventrosa o Anguiano, y localidades sorianas como Montenegro de Cameros, Vinuesa o Neila, sobre todo cuando la nieve cubría los lugares que habitualmente frecuentaban, por encima de los 1.500 m. de altitud.


Se ha constatado la presencia en esa zona de ejemplares procedentes del Pirineo Aragonés (sin marcas o anillas identificativas o con las propias de las aves con este origen) como es el caso de “Cenarbe”, un ave nacida antes de 2009 y localizada a lo largo de 2015, y otros 3 ejemplares más, al menos, de identidad desconocida, presentes entre 2013 y 2015. También se han observado aves procedentes del programa de reintroducción de la especie en las sierras de Segura y Cazorla (Andalucía) como pollos nacidos en cautividad, en este caso todas con emisor, marcas alares (decoloraciones) y anillas, como “Quiteria”, un ejemplar nacido en 2010, que pasó largas temporadas en Urbión con desplazamientos al Pirineo y regresos a La Rioja y que se encontró muerta en 2015 en la zona riojana habitual por causas desconocidas; “Guadalquivir”, un ave nacida en 2013, que en su viaje desde Andalucía al Pirineo cruzó brevemente el extremo oriental de La Rioja (Aguilar del Río Alhama, Cervera del Río Alhama y Alfaro) en 2014 y “Vera”, otro ejemplar nacido en 2013 que al año siguiente, en dispersión desde Andalucía, llegó en junio desde Ayllón (Burgos-Guadalajara) a la Demanda riojana y tras permanecer unos días entre esta sierra, el Jubera, Cameros, Cebollera y Urbión salió de La Rioja hacia Somosierra (Madrid-Guadalajara) a mediados de julio.

Las observaciones de quebrantahuesos en La Rioja durante 2013, 2014 y 2015 han tenido lugar prácticamente durante todos los meses del año, si bien la mayoría de ellas y las estancias más largas conocidas, se han concentrado en el periodo anual comprendido entre los meses de marzo y octubre. Seguramente esto sea así porque es en esta época cuando mayor disponibilidad de alimento hay en la zona habitual de presencia de la especie ya que quedan al descubierto, tras el deshielo, los cadáveres de grandes mamíferos silvestres, tienen lugar los nacimientos de las crías de estas mismas especies o por la presencia de la abundante cabaña ganadera que aprovecha los pastos de montaña esos meses. También se conocen casos comprobados de aves que han alternado estancias entre la sierra riojana de Urbión y el Pirineo Aragonés, con traslados sucesivos desde una región a otra, como ha sido el caso de “Quiteria” y de “Cenarbe” (Ivana Lasheras, Diego García, Ignacio Gámez, Javier Robres, Sandra Vela, Enrique Villa, Juan Ignacio Ibáñez, Carlos González, Álvaro Sáenz, Miguel A. Elvira, Sergio Mikolta, Arturo Pascual, Luis Lopo, Miguel Ruíz, José Beltrán de la Ascensión, Juan Luis Hernández, César M^a Aguilar y Álvaro Camiña).

Alimoche común

Neophron percnopterus

Blanquillo



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

En 1985 se obtuvo el mayor número de parejas conocido en La Rioja, 35 censadas y 40-50 estimadas. Desde finales de esa década y principios de la de los 90, la especie ha sufrido una fuerte regresión que parece haberse detenido, estabilizándose su población en torno a los 15-20 territorios, varios de ellos compartidos con provincias limítrofes. Los territorios se localizan en Montes Obarenes, cortados fluviales del río Ebro, cortados de media montaña en el contacto Sierra-

Valle y, algunos, en la Sierra más húmeda. También se observan escasos migrantes procedentes de regiones cercanas.

CI: Citas de interés.

2013-15

- Cita curiosa. El 20.03 en el valle del Ebro, cortados de Aradón, Alcandredre (WM69), se observa un ejemplar con un emisor de geolocalización por satélite. El 07.05 se volvió a ver formando parte de una pareja que sacó adelante un pollo. En la segunda quincena de agosto se localizó la pareja posada en un chopo que usaba de dormitorio y se pudo leer la anilla del ejemplar radiomarcado. Resultó ser un ave equipada con emisor y anillada (1R6) en junio de 2004 como macho de 2º año en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). El macho inverna ese año y en 2005 en el sur de Hodh ech Chargui (Mauritania), casi en la frontera con Mali. En 2014 la pareja sacó adelante un pollo y en 2015, dos (Ignacio Gámez, Javier Robres, César M^a Aguilar y Carlos Gutiérrez).



2014

- Población reproductora. A lo largo del año la D.G. de Medio Natural llevó a cabo un censo de la población nidificante hallando 16 territorios ocupados por parejas y uno por un adulto solitario. La ubicación precisa de los territorios permite completar el mapa que se usa como referencia en el AOR en las siguientes cuadrículas UTM: VN92 (cría probable), WM27 (cría segura) y WM94 (cría segura) (César M^a Aguilar Gómez).

- Últimas observaciones. El 23.09 en Ojacastro (VM9691), se observa un adulto volando alto (César M^a Aguilar Gómez).

Buitre leonado

Gyps fulvus



llevó a cabo un censo de la población nidificante que aportó 1128 parejas, que suponen un incremento considerable respecto al censo anterior (639-707 parejas en 2007) y la mayor cifra conocida en La Rioja. La especie mantiene su distribución previa y amplía su área de nidificación a dos nuevas zonas: el Alto Najerilla y el Alto Iregua. La ubicación precisa de los nidos permite completar el mapa que se usa de referencia en el AOR en las siguientes cuadrículas de cría segura: VN92, WN02, WM06, WM05, WM16, WM26, WM36 y WM46 (César M^a Aguilar Gómez).

Nidificante común con el grueso de su población asentada en los cortados del contacto Sierra-Valle a lo largo de los afluentes del Ebro, desde el Oja hasta el Alhama-Linares, además de poblaciones en los Montes Obarenes-Sierra de Cantabria y algunos núcleos aislados en cortados del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2014

- Población reproductora. A lo largo del año la D.G. de Medio Natural

Buitre moteado

Gyps rueppellii


Única cita:

1. Un ave de 2º año calendario el 29.09.2007 en Rastraculos, Viniegra de Arriba. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Buitre negro

Aegypius monachus



Especie escasa pero regular que se observa sobre todo durante la primavera y el verano. Se trata generalmente de jóvenes en dispersión que aprovechan el aumento temporal de carroñas debido al mayor número de cabezas de ganado en la montaña. Muy raro en el valle del Ebro.

CI: Citas invernales y otras citas de interés.

2013-14

- Lugar no habitual. Entre el 17.10.13 y el 23.06.14 en el vertedero de residuos sólidos urbanos y alrededores, Nájera (WM29) se realizan diversas

observaciones de un joven (Ignacio Fermín Pascual, José María Fernández, Pedro Alonso y Jesús Serradilla).

2014

- Lugar no habitual. El 18.04 en La Cañada, Alfaro (WM9263), se localiza un joven del año anterior volando con 6 buitres leonados, atraídos posiblemente por la carroña de conejos atropellados (Ignacio Gámez Carmona).

- Lugar no habitual. El 31.07 en el embalse de Leiva-Tormantos (VN9405) se observa un ejemplar, aparentemente adulto, volando junto a 2 buitres leonados (Itziar Gutiérrez Uranga).



2015

- Lugar no habitual. El 10.05 en Santa Eulalia Somera (WM6673), se ve un ave en vuelo (David Mazuelas Benito y Óscar Gutiérrez Jiménez).

- Lugar no habitual. El 18.05 en Carbonera, Bergasa (WM77), se observa un ejemplar (Jesús Ángel Ucha Turumbay y José Ignacio Pérez Sáenz).

Culebrera europea

Circaetus gallicus





Población nidificante dispersa por toda la región, principalmente en zonas arboladas con grandes áreas abiertas de media montaña. Migrante común en cualquier localidad riojana.

CI: Citas de interés.

Aguilucho lagunero occidental

Circus aeruginosus





Aunque desapareció como reproductor a finales de la década de los ochenta, actualmente la población nidificante ha aumentado hasta superar las 100 parejas. Se distribuye por humedales, carrizales y algunas zonas de cereal del valle del Ebro, sobre todo de la mitad oriental, mientras que en invierno y en migración, más abundante, puede observarse más repartido.

CI: Concentraciones numerosas (> 30) y otras citas de interés.

Aguilucho pálido

Circus cyaneus



Nidificante disperso por laderas desarboladas de la montaña riojana, sobre todo de la mitad occidental. Es más común en migración e invierno, sobre todo en zonas bajas.

CI: Concentraciones numerosas (> 10) y otras citas de interés.

Aguilucho papialbo

Circus macrourus

Única cita:

1. Un joven el 28.04.11 en el carrizal de Cofín, Alfaro. Ignacio Gámez Carmona y Sandra Vela Serrano (Gámez *et al.*, 2013).


CI: Todas las citas.

2013

• Rareza. El 05.04 en las graveras de Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), se ve un macho adulto hostigado por una corneja (Óscar Zuazo

Velasco).

Aguilucho cenizo




E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Circus pygargus

Población nidificante actual concentrada en cultivos cerealistas de La Rioja Alta, habiendo sufrido una regresión muy fuerte en la última década en la mitad oriental de la región. Se comporta como una especie estival con llegada también de migrantes, pudiendo observarse entonces en cualquier localidad.

CI: Citas de interés.

Azor común



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Accipiter gentilis

Población reproductora distribuida por zonas forestales de la región. En migración e invierno llegan ejemplares europeos que con frecuencia se asientan en el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Gavilán común




Accipiter nisus

Población reproductora dispersa por zonas arboladas de toda La Rioja. En migración e invierno llegan muchas aves europeas que se localizan principalmente en el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Busardo ratonero



Buteo buteo

Común y disperso nidificante por toda la región, escaseando en el sureste y abundando más en la mitad occidental. En migración e invierno llegan aves europeas que se establecen principalmente en el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Busardo moro

Buteo rufinus

Primeras citas para La Rioja:

CI: Todas las citas.

2013

- Rareza. El 27.08 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observa un ejemplar de gran tamaño y vuelo lento que hace varios cernidos. Se asigna a la subespecie europea *B. r. rufinus* (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

2015

- Rareza. El 19.11 en Cuzcurrita de Río Tirón (WN01), se localiza y fotografía un ave (Roberto Herrero Eguía).

Busardo calzado

Buteo lagopus

Únicas citas:

1. El 05.10.81 un ave en Recajo, Logroño (Nalda, 1982).
2. El 20.11.88 un ejemplar en Ausejo. Ignacio Gámez Carmona (González, 1996).

CI: Todas las citas.

Águila moteada

Aquila clanga

Única cita:

1. El 27.01.03 un adulto en Gimileo. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2003).

CI: Todas las citas.

2015

- Rareza. El 24.09 en el embalse de Pajares, Lumbreras (WM3359), se observa un individuo juvenil sobrevolando las aguas del embalse y posteriormente descansando sobre un poste (Jesús Vicente Nalda Sáenz-Torre).

Águila imperial ibérica


Aquila adalberti

Divagante accidental. Únicas citas:

1. El 20.08.89 un ave en Viniegra de Arriba (Camiña, 1989).
2. El 01 y 02.05.08 un ave de segundo año calendario en Rigüelo, Alfaro. Óscar Gutiérrez, Javier Robres, Anabel Caro, Diego Benavides y José M^a González (Gámez *et al.*, 2010).

CI: Todas las citas.

Águila real



A lo largo del año la D.G. de medio Natural llevó a cabo un censo de la población nidificante que aportó 29 territorios frente a los 32 de 2008. No obstante, cada vez más parejas, especialmente en la Sierra, crían sobre árboles y pueden estar pasando desapercibidas por la dificultad que entraña su localización. La ubicación precisa de los nidos permite completar el mapa que se usa como referencia en el AOR en las siguientes cuadrículas de cría segura: WM08, VM96 y WM88 (César M^a Aguilar Gómez).

Aquila chrysaetos


Población reproductora distribuida por zonas de media montaña del Centro y Este de la región principalmente. Los ejemplares no reproductores se pueden ver en cualquier localidad, llegando a establecerse temporalmente en zonas bajas favorables con abundantes presas.

CI: Citas de interés.

2014

- Población reproductora. A lo

Águila calzada



Aquila pennata

Población estival y nidificante distribuida por zonas arboladas de toda la región, más abundante en el valle del Ebro. Común en migración, cuando se puede observar en cualquier localidad y presencia rara en invierno.

CI: Citas invernales y otras citas de interés.

2013

• Observación invernal. El 01.02 en el polígono Cantabria, Logroño (WN4703), se ve un ejemplar volando sobre la circunvalación (Javier Robres Cabezón).

• Primeras observaciones. El 15.03 en S. Martín de Berberana, Agoncillo (WM69), se observa un ave de fase oscura. Posteriormente, volando sobre la circunvalación, otra de fase clara (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

- Primeras observaciones. El 15.03 frente a Santa Cruz (Andosilla), en Calahorra (WM88), se ve un ejemplar de fase oscura (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

2014

- Primeras observaciones. El 15.03 en Alcanadre (WM79), se observa un ave de morfo oscuro (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

- Últimas observaciones. El 08.11 en Los Ausejos, Alberite (WM59), se localiza un ejemplar en vuelo (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

Águila perdicera

Aquila fasciata

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Población residente muy escasa en cortados rocosos de la Comunidad.

Los jóvenes se dispersan fuera de la región y algunos pueden llegar desde zonas cercanas.

CI: Citas de interés.

Águila pescadora

Pandion haliaetus

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Migrante regular pero escaso en ambos pasos, pudiendo observarse

individuos aislados casi en cualquier localidad.

CI: Citas fuera del periodo de migración y otras citas de interés.

2013



- Primeras observaciones. Paso postnupcial. El 08.08 en las Cáscaras de Cofín, Alfaro (WM97) se observa un adulto posado en una torreta. Al día siguiente se vuelve a localizar en la misma zona (Jesús Ángel Ucha, Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

2014

- Primeras observaciones. Paso postnupcial. El 30.07 en las Cáscaras de Cofín, Alfaro (WM97) se ve un adulto cerca de la balsa de la Heinz (Ignacio Gámez, Javier Robres y Sandra Vela).

Cernícalo primilla

Falco naumanni





CI: Concentraciones numerosas (> 20) y otras citas de interés.

Especie desaparecida como reproductora de La Rioja en los años cincuenta o sesenta del pasado siglo. Actualmente se conocen dos localidades de cría, cuyas colonias tienen su origen en el proyecto de reintroducción de la especie iniciado en 1998 por el Gobierno de La Rioja. Numerosos ejemplares, generalmente jóvenes, visitan la Comunidad regularmente a finales del verano en dispersión posgenerativa, con seguridad desde otras regiones (Gámez, 2004).

Cernícalo vulgar

Falco tinnunculus



Común y disperso por toda La Rioja, abundando más en el valle del Ebro. Llegan algunos invernantes a zonas bajas y no pocos migrantes.

CI: Citas de interés.

Cernícalo patirrojo

Falco vespertinus

Divagante accidental. Únicas citas:

1. Un ave el 06.10.92 en La Rad de Murillo de Río Leza. Ignacio Gámez (González, 1996).

2. Numerosas observaciones de ejemplares entre el 30.04 y el 07.06.08 en Murillo de Río Leza, El Villar de Arnedo, Pradejón, Arnedo y Alfaro. Eduardo Ayala y otros (Gámez *et al.*, 2010).


3. Un macho el 05.04.10 en El Villar de Arnedo. Javier Álvarez Remírez (Gámez *et al.*, 2013).

4. Entre 1 y 3 ejemplares (2 adultos y 1 subadulto) entre el 18 y el 23.05.12 en Hervías y Bañares. Javier Robres, Jonatan Hernández, Ignacio Gámez y Sandra Vela (Gámez *et al.*, 2013).

5. Un macho subadulto el 20 y 21.05.12, en Bañares. Iván Sarabia y Tomás Crespo (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Esmerejón





Falco columbarius

Invernante escaso en todo el valle del Ebro, siendo raro en el resto donde tan sólo se ve algún migrante.

CI: Citas fuera del periodo regular y otras citas de interés.

Alcotán europeo



Falco subbuteo

Población estival y nidificante poco numerosa, dispersa por arboledas y masas forestales cercanas a zonas abiertas de toda la región, sobre todo del valle del Ebro y media montaña. Se observan también frecuentes migrantes. Al menos, desde el año 2004, se tiene constancia de la presencia regular de grupos que pueden llegar hasta los 50 ejemplares en los alrededores de Santurde de Rioja. Estas concentraciones se forman, según los años, desde primeros de mayo hasta mediados de

junio para alimentarse de insectos en vuelo.

CI: Citas fuera del periodo regular y otras citas de interés.

2014

- Concentración numerosa. El 08.06 en Santurde de Rioja (WM09), se cuentan 20 aves alimentándose en vuelo (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

2015

- Concentración numerosa. El 27.05 en Santurde de Rioja (WM09), se observan 5 ejemplares alimentándose en vuelo en un vistazo rápido de la misma zona de concentración de años anteriores (César M^a Aguilar Gómez).

Halcón de Eleonora

Falco eleonorae

Única cita:

1. Un inmaduro el 10.09.97 en Sajazarra. Ignacio Gámez (Gámez *et al.*, 1999).

CI: Todas las citas.

Halcón sacre

Falco cherrug

Divagante accidental. Únicas citas:

1. Un ave el 05 y el 08.03.05 en Murillo de Río Leza. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

2. Un ejemplar el 27.01.10 en Herramélluri. Sebastián Lara Álvarez (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

2014

• Escape de cautividad. El 25.11 procedente de Calahorra (WM88), ingresa un ejemplar con pihuelas en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).



Halcón peregrino

Falco peregrinus

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Población reproductora sedentaria distribuida por toda la región. También llegan algunos migrantes e invernantes, estos últimos localizados preferentemente en el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Rascón europeo*Rallus aquaticus*

Población reproductora dispersa por muy diversos humedales del valle del Ebro, sobre todo de su mitad oriental, llegando a estas zonas también algunos invernantes y migrantes.

CI: Citas de interés.


Polluela pintoja*Porzana porzana*

Migrante muy escasa y más rara invernante, con observaciones dispersas por unos pocos humedales del valle del Ebro.

CI: Todas las citas.

2015

- Especie escasa. El 10.04 en la laguna de Hervías (WN1100), se oye un ejemplar cantando. El día anterior se observaron 2 polluelas en el mismo lugar que probablemente eran de la misma especie (José Félix Arenzana, Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).


Polluela bastarda*Porzana parva*

Migrante muy escaso y desapercibido, con observaciones en sólo unos pocos humedales del valle del Ebro.

CI: Todas las citas.

Polluela chica

Porzana pusilla



Población reproductora muy escasa y localizada, con presencia comprobada sólo en El Recuenco (Calahorra), San Martín de Berberana (Agoncillo) y La Grajera (Logroño). Se comporta como estival con algún posible migrante.

CI: Todas las citas.





Guión de codornices

Crex crex

Ocasional. Únicas citas:



1. Un ave el 28.03.89 en San Martín de Berberana, Agoncillo. Ignacio Gámez (González, 1996).
2. Otro individuo el 02.10.92 en Recajo, Agoncillo. Ignacio Gámez (González, 1996).
3. Un ejemplar el 09.09.93 en la balsa de Beriaín, Calahorra. Ignacio Gámez (González, 1996).
4. Un ave el 06.05.06 en La Rad de Murillo de Río Leza. Ignacio Gámez (Gámez *et al.*, 2010).
5. Un ejemplar el 02.04.10 en Logroño. Javier Robres Cabezón (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Gallineta común*Gallinula chloropus*

Población reproductora que distribuye de forma muy dispersa casi por cualquier humedal de la región, sobre todo del valle del Ebro y en su mitad oriental. Llegan también migrantes e invernantes.

CI: Citas de interés.

Calamón común*Porphyrio porphyrio*

Primera cita para La Rioja.

CI: Todas las citas.

2014

- Rareza. Cría segura. Entre el 24 y el 28.04 en la balsa de El Recuenco, Calahorra (WM8880), se localiza una pareja en la zona de la garcera. El macho emite reclamos con frecuencia, adopta una postura de cortejo cuando se acerca a la hembra y defiende el territorio. El 24.06 se ven 2 adultos y 3 pollos de unos 15 días de edad. Los



adultos cortan y pelan espadañas y alimentan con trocitos a los pollos. El 21.09 se observan 2 adultos y un joven, el 11.10 los 2 adultos y otras 2 aves, posiblemente jóvenes y el 30.10 un adulto y otros 2 ejemplares de los que, al menos uno, es un joven del año (Ignacio Gámez Carmona y Jesús Ángel Ucha Turumbay).

2015

- Rareza. El 03.01 en El Recuenco, Calahorra (WM8880), se observan dos individuos al borde del carrizal. Uno de ellos porta una carpa de mediano tamaño pinzada por la cola. Cuando el otro individuo intenta arrebatársela se escabulle en el interior del carrizal (Maite Aldonza Sáenz y Fco. Javier Nalda Sáenz-Torre).

Focha común

Fulica atra




Población reproductora poco numerosa y localizada en algunos humedales, cada vez más escasa, que efectúa movimientos invernales de diverso alcance. A esta población se le suman migrantes y sobre todo invernantes.

CI: Citas de interés.

Grulla común

Grus grus



Migrante común, sobre todo en otoño, casi por cualquier localidad de La Rioja, pero con observaciones concentradas en collados de montaña. No pocas observaciones invernales producidas por fugas de tempero desde zonas de invernada norteñas o precoz migración prenupcial.



CI: Sedimentación migratoria (> 20) y otras citas de interés.

2015

- Primeras observaciones. El 02.10 en el embalse de Leiva-Tormantos (VN9405), se ven 2 aves que salen volando de la cola del mismo (Óscar Zuazo Velasco).

Sisón común

Tetrax tetrax



Población nidificante muy reducida y localizada en la mitad oriental del valle del Ebro, por cultivos de secano con abundante barbecho y terrenos incultos. En las zonas de cría se comporta como estival, dispersándose posteriormente. En migración llegan aves procedentes de otras regiones, teniendo entonces lugar observaciones en todo el valle del Ebro. Son raras las observaciones invernales.

CI: Citas invernales y otras citas de interés.

2013

- Especie escasa. El 12.09 en La Rad de Barbarrés, Murillo de Río Leza (WM5895), se observan 13 aves (Javier Robres Cabezón).

2014

- Especie escasa. El 08.09 en la Senda el Coche, Cidamón (WN1001), se ve un ejemplar en un rastrojo que daba la impresión de cojear un poco (Óscar Zuazo Velasco).

Avutarda común

Otis tarda

Ocasionalmente, fuera de la época reproductora, se observan ejemplares aislados o pequeños grupos en zonas apropiadas del valle del Ebro y zonas cerealistas de La Rioja Alta.

CI: Todas las citas.

2013

- Especie escasa. El 14.06 en Mojones Altos, Villalobar de Rioja (WN0105), se observa un ejemplar (Ramón Arambarri Bengoa).
- Especie escasa. El 03.08 en La Rad de Barbarrés, Murillo de Río Leza (WM59), se ve una hembra (Ignacio Gámez Carmona).

2014

- Especie escasa. El 20.08 en la Senda el Sol, Bañares (WN0604), se localiza un ave volando bajo en dirección a San Torcuato (Óscar Zuazo Velasco).

2015

- Especie escasa. El 12.09, alejándose en dirección hacia el Monte Cantabria, Logroño (WN40), se observan, a la altura de la laguna de Las Cañas, 2 ejemplares en vuelo que provenían del NE (Jose María González Perujo y José Carlos Palacios).

Ostrero euroasiático

Haematopus ostralegus


Únicas citas:

1. 7 aves el 29.03.98 en el embalse de El Perdiguero (Calahorra). Santiago Peña López (Gámez *et al.*, 2002).
2. Un adulto entre el 16 y el 26.04.03 en el embalse de Leiva-Tormantos. Ignacio Tejedor de la Asunción, Ignacio Gámez y José Pinillos (Gámez *et al.*, 2003).

CI: Todas las citas.

Cigüeñuela común

Himantopus bimantopus



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Estival nidificante, se reproduce de forma regular desde 1988 en algunos humedales de La Rioja en función de las condiciones hidrológicas del momento. No pocas aves se observan en migración, en este caso, de forma más dispersa por el valle del Ebro.

CI: Concentraciones numerosas (> 30) y otras citas de interés.

2014

- Cría segura. El 19.07 en la laguna Mateo, San Asensio (WN2106), se ven

20 aves, entre ellas 3 polladas grandes (Ignacio Gámez Carmona).

2015

- Cría segura. El 05.07 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observan 50 ejemplares, 8 de ellos pollos (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).

- Concentración numerosa. El 20.07 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se cuentan 100 aves, de ellas 30 son jóvenes (Ignacio Gámez Carmona).

Avoceta común

Recurvirostra avosetta

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Especie poco común, aunque migrante regular, presente en escaso

número de humedales del valle del Ebro, donde sólo raramente se observan invernantes.


CI: Citas invernales y otras citas de interés.

2013

- Primeras observaciones. Paso postnupcial. El 22 y 23.08 en el embalse de Pajares, Lumbreras (WM3357), se localiza un bando de 30 aves descansando en distintos lugares de la orilla en la cola del mismo (Pedro Mari López, Miguel Ángel Pérez y Ángel López).

Alcaraván común*Burbinus oedicnemus*

Terliz, Aterliz



Carmona y Javier Robres Cabezón).

2014

- Ampliación área de distribución. Cría segura. En junio en Herramélluri (WN00), se encuentra un nido con 3 huevos en un labrado. Posteriormente se ven los adultos (Eduardo Miera Lerena).

- Concentración numerosa. El 15.10 en Rifondo, Calahorra (WM8782), se ve un bando de 54 aves (Ignacio Gámez Carmona y Jesús M^a García García).

2015

- Ampliación área de distribución. Cría segura. En primavera, en Herramélluri (VN90), se localiza una puesta (Lidia Roncero, David Mazuelas y Óscar Gutiérrez).

Canastera común*Glareola pratincola*

Únicas citas:

1. Un ave en mayo de 2008 en Cofín, Alfaro. Diego Benavides Madariaga (Gámez *et al.*, 2010).

2. Un adulto el 18.04.11 en Caracarros, Villalobar de Rioja. Óscar Zuazo Velasco (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Nidificante disperso, escaso y localizado en zonas favorables del valle del Ebro, sobre todo de su mitad oriental. Escasos migrantes y una pequeña población invernante en el valle.


CI: Citas de interés.

2013

- Concentración numerosa. El 24.09 en Rigüelo, Alfaro (WM96), se cuentan unos 100 ejemplares. El 28 y 29.09 había 150 aves (Ignacio Gámez

Chorlitejo chico

Charadrius dubius



Población nidificante localizada en orillas pedregosas de ríos, humedales y áreas encharcadas del valle del Ebro, principalmente de su mitad oriental. También se observan migrantes en estas localidades y más raramente en humedales de la sierra. Alguna rara cita invernal.

CI: Citas invernales y otras citas de interés.

2013

• Primeras observaciones. El 08.03 en la balsa de Oribe, Arnedo (WM7778), se observan 2 aves (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

2013-14


• Observación invernal. Entre el 26.12 y el 08.01 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), permanecen 4 aves en plumaje invernal en la barra de grava del río Ebro (Jesús Serradilla Rodríguez y Eugenio Montelío Barrio).

2014

• Últimas observaciones. El 31.10 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se ven 3 ejemplares (Jesús Serradilla Rodríguez).

Chorlitejo grande

Charadrius hiaticula



Migrante regular pero bastante escaso en humedales de todo el valle del Ebro y más raro en los de la sierra, con muy escasas observaciones invernales en zonas bajas.

CI: Citas de interés.

Chorlitejo patinegro

Charadrius alexandrinus

Divagante accidental. Únicas citas:

1. Un ave el 04.05.97 en los arrozales de Alfaro. Ignacio Gámez y Jesús M^a García (Gámez *et al.*, 1999).

2. Un joven el 29.09.12 en el embalse de Leiva-Tormantos. Jesús Serradilla Rodríguez (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Chorlito carambolo*Charadrius morinellus*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante postnupcial escaso en localidades esteparias muy concretas del extremo oriental del valle del Ebro riojano, con observaciones aisladas de montaña, en otras localidades o fuera de la época citada. Por transformación del hábitat, desde 2008 no existen citas en Rigüelo, Alfaro, donde su observación postnupcial era regular.

CI: Todas las citas.

2013

- Especie escasa. El 12.09 en Murillo de Río Leza (WM59), se ven 5 ejemplares (Javier Robres Cabezón).

Chorlito dorado europeo*Pluvialis apricaria*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Invernante o migrante escaso en zonas apropiadas del valle del Ebro, con frecuencia acompañando los bandos de avefría europea.

CI: Concentraciones numerosas (> 50) y otras citas de interés.

2013

- Concentración numerosa. El 14.01 en Cofín, Alfaro (WM96), se observan 50 aves (Ignacio Gámez Carmona y Sandra Vela Serrano).
- Concentración numerosa. El 23 y 24.02 en La Laguna, Alberite (WM59), se cuentan 200 ejemplares en dos grupos de 150 y 50 aves (Ignacio Gámez Carmona).
- Últimas observaciones, paso prenupcial. El 10.05 en Pilas, Ochánduri (WN0106), se localiza un adulto en plumaje nupcial posado en una finca encharcada (Óscar Zuazo Velasco).

Chorlito gris*Pluvialis squatarola*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Ejemplares aislados se observan esporádicamente en migración en algunos humedales del valle del Ebro.

CI: Todas las citas.

2013

- Especie escasa. El 27.04 en Estanquillas, Alfaro (WM96), se ven 12 adultos en plumaje nupcial (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

- Especie escasa. El 28.04 en la balsa de Santa Cruz, Alfaro (WM9968), se observan 3 ejemplares (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).

- Especie escasa. El 04.05 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se ven 3 aves junto a otros límícolas (Javier Robres, Óscar Gutiérrez y Jesús Serradilla).

- Especie escasa. El 20.05 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observa un ejemplar en plumaje nupcial (Óscar Zuazo Velasco).

2014

- Especie escasa. El 10 y 11.11 en el embalse de Leiva-Tormantos (VN9405), se localiza un ave posada en la orilla de la cola del embalse que aún tiene playa (Óscar Zuazo Velasco).

Avefría sociable

Vanellus gregarius

Divagante accidental. Única cita:


1. Un adulto entre el 21 y el 24.09.00 en los arrozales de Cofín, Alfaro. Ignacio Gámez Carmona y Luis Lopo Carramiñana. (Gámez *et al.*, 2002)

CI: Todas las citas.

Avefría europea

Vanellus vanellus

Quince



Principalmente se trata de un invernante común y de un migrante no escaso, que abunda sobre todo con olas de frío y temporales nortehños, apareciendo en cantidades muy variables. Se localiza en todo el valle del Ebro y más raramente en zonas cultivadas y pastizales de la sierra. Se conoce la esporádica reproducción de alguna pareja.

CI: Concentraciones numerosas (>500) y otras citas de interés.

2013

- Concentración numerosa. El 09.02 en Cofín, Alfaro (WM97), se cuentan 1.045 aves (Ignacio Gámez Carmona y Sandra Vela Serrano).

- Localidad de cría probable. El 09.05 en las balsas de Cofín, Alfaro (WM9772), se ve una pareja cerca de la granja. El macho está continuamente ejecutando vuelos de cielo (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres Cabezón).

- Localidad de cría segura. El 25.06 en El Vivar, Alfaro (WM96), se localiza una pareja de adultos con un volantón en unos encharcamientos temporales salinos (Ignacio Gámez Carmona).

- Observación estival. El 25.06 en Las Lagunas, Murillo de Río Leza (WM5394), se observa un bando de 14 aves, entre ellas, 8 jóvenes del año, posiblemente desplazado de otra zona (Ignacio Gámez Carmona).

- Observación estival. El 07.07 en Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), se ve un bando de 27 ejemplares donde hay juveniles y adultos (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

2014

- Localidad de cría probable. El 03.07 en Villarejo de Rioja (WM1091), se observan 2 ejemplares junto a un campo de patatas que defendían el territorio frente a unas cornejas (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

- Observación estival. El 16.06 en Caracarros, Bañares (WN0400), se ven 4 ejemplares en una finca labrada (Óscar Zuazo Velasco).

2015

- Localidad de cría segura. El 13.07 en La Maja, Pradejón (WM78), se localiza un adulto y un pollo del año (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

- Localidad de cría segura. El 05.07 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se ven 2 adultos y 3 pollos. El 20.07 hay 10 aves, de las que 6 son jóvenes (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).

Correlimos gordo

Calidris canutus

Divagante accidental. Únicas citas:

1. Un ave el 04.05.97 en Alfaro. Ignacio Gámez y Jesús M^a García (Gámez *et al.*, 1999).

2. Un adulto el 13.06.00 en los arrozales de Cofín, Alfaro. Ignacio Gámez Carmona. (Gámez *et al.*, 2002).

3. Ocho adultos el 14.05.08 en los arrozales de Cofín, Alfaro. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

4. Ocho adultos el 04.05.10 en el Lago, Herramélluri. Óscar Zuazo Velasco (Gámez *et al.*, 2013).

5. Dos aves el 05.05.10 en La Navajarica, Alfaro. Eugenio Montelío Barrio (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

2013

- Rareza. El 04.05 en la balsa de Oribe, Arnedo (WM7778), se localiza un ejemplar en plumaje invernal (Javier Robres, Óscar Gutiérrez y Jesús Serradilla).

• Rareza. El 04.05 en El Lago, Herramélluri (WN0005) se observa un ave en plumaje estival (Javier Robres, Óscar Gutiérrez y Jesús Serradilla).

Correlimos tridáctilo

Calidris alba

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante muy escaso en algunos humedales del valle del Ebro, tanto en el paso primaveral como en el otoñal.

CI: Todas las citas.

2013

• Especie escasa. El 25.05 en la charca de Santa Cruz, Alfaro (WM9968), se localizan 7 ejemplares en plumaje nupcial y de transición alimentándose por las praderas inundadas junto a otros limícolas (David Mazuelas Benito y Óscar Gutiérrez Jiménez).

2014

• Especie escasa. El 13.05 en Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), se observan 7 aves alimentándose en la gravera (Óscar Zuazo Velasco).

Correlimos menudo

Calidris minuta

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Regular, pero poco frecuente, durante la migración en humedales del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2015

• Fecha inusual. Entre el 23 y el 25.11 en El Lago, Herramélluri (WN0005), permanece un ejemplar junto a 3 correlimos comunes (Óscar Zuazo Velasco).

Correlimos de Temminck

Calidris temminckii

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante muy escaso en algunos humedales del valle del Ebro tanto en el paso primaveral como sobre todo el otoñal.

CI: Todas las citas.

2014

• Rareza. El 04.05 en las gaveras de Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), se localiza un ave (Óscar Gutiérrez, César M^a Aguilar, Jesús Ángel Ucha, Javier Robres y Jesús Serradilla).

2015

- Raraza. El 23 y 24.08 en el embalse de Leiva-Tormantos (VN9405), se ve un ejemplar alimentándose sobre el limo en la cola del mismo (Itziar Gutiérrez Uranga).

Correlimos pectoral

Calidris melanotos

Divagante accidental con muy raras observaciones en el paso otoñal.

CI: Todas las citas.

Correlimos zarapitín

Calidris ferruginea

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante escaso en humedales del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2013

- Últimas observaciones. Paso postnupcial. El 07.10 en el embalse de Leiva-Tormantos (VN9405), se observan 3 aves (Ignacio Gámez, Javier Robres y Sandra Sáenz).

Correlimos común

Calidris alpina

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante regular en humedales del valle del Ebro, con sólo ocasionales observaciones invernales en estas localidades.

CI: Citas de interés.

2015

- Fecha inusual. Entre el 23 y el 25.11 en El Lago, Herramélluri (WN0005), permanecen 3 ejemplares y un correlimos menudo (Óscar Zuazo Velasco).

Correlimos canelo

Tryngites subruficollis

Divagante accidental. Única cita:

1. Un joven el 16 y 17.09.11 en el embalse de Leiva. Óscar Zuazo Velasco (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Combatiente

Philomachus pugnax



Migrante regular pero poco frecuente en humedales del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Agachadiza chica

Lymnocyptes minimus



Observaciones muy escasas de migrantes y algún invernante en humedales del valle del Ebro.

CI: Todas las citas.

Agachadiza común

Gallinago gallinago




Especie común en migración y más escasa en invierno en localidades del valle, siendo poco frecuentes las observaciones en humedales de la sierra.

CI: Citas de interés.


Chocha perdiz

Scolopax rusticola



La población nidificante, actualmente poco conocida, es escasa y localizada, distribuida por zonas forestales bien conservadas de la sierra, sobre todo del suroeste. La mayor parte de las observaciones corresponden a invernantes y migrantes, presentes también en sotos y bosquetes del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.



Aguja colinegra*Limosa limosa*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante escaso, aunque regular, en humedales del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2013

- Fecha inusual. El 09.06 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observa un bando de 14 aves. El 14.06 aún permanece una (Ignacio Gámez Carmona y Sandra Vela Serrano).

2014

- Fecha inusual. El 03.07 en los antiguos arrozales de Cofín, Alfaro (WM97), se ve un ejemplar (Sandra Vela Serrano).

Aguja colipinta*Limosa lapponica*

Única cita:

1. Un ave el 11.09.07 en el embalse de Leiva. Jesús Serradilla Rodríguez. (Serradilla, 2007a).

CI: Todas las citas.

2013

- Rareza. El 28.04 en la charca de Santa Cruz, Alfaro (WM9968), se localizan 4 ejemplares (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).
- Rareza. El 02.05 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observa un bando de unas 30 aves agrupadas en la parte sur (Óscar Zuazo Velasco).
- Rareza. El 04.05 en Cofín, Alfaro (WM97), se ve un ejemplar en las viejas tablas de arroz inundadas (Javier Robres, Óscar Gutiérrez y Jesús Serradilla).

2014

- Rareza. El 02.05 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se cuentan 25 aves (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).
- Rareza. El 05.05 en Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), se localiza un ejemplar alimentándose en la gravera (Óscar Zuazo Velasco).
- Rareza. El 31.07 en la laguna Mateo, San Asensio (WM2106), se ve un ave (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

Zarapito trinador

Numenius phaeopus

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante escaso en humedales del valle del Ebro con alguna rara obser-

vación en la sierra.

CI: Citas fuera del periodo regular de migración prenupcial y otras citas de interés.

Zarapito real

Numenius arquata

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D


Migrante poco frecuente en humedales del valle del Ebro con raras

observaciones invernales en los mismos.

CI: Todas las citas.

Andarríos chico

Actitis hypoleucos



Población reproductora localizada principalmente a lo largo de todo el río Ebro y en riberas de la mitad occidental, no sólo del valle del Ebro, sino también de algunos ríos de montaña. Resulta mucho más frecuente en migración en todo tipo de humedales y escaso invernante.

CI: Concentraciones numerosas (> 40) y otras citas de interés.

2014

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

• Concentración numerosa. El 14.08 en el embalse de La Grajera, Logroño (WM4099), se cuentan 50 aves (Diego Benavides Madariaga).

Andarríos grande

Tringa ocbropus

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Principalmente se trata de un migrante común y regular en humedales del valle del Ebro y raro en los de la sierra, con observaciones de

veraneantes no reproductores e invernantes.

CI: Citas de interés.

Archibebe oscuro*Tringa erythropus*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante escaso en humedales del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2013

- Concentración numerosa. El 27.04 sobre el polígono Cantabria, Logroño (WN4802), se observa un bando de unas 20 aves procedente de la cercana laguna de Las Cañas (Óscar Gutiérrez Jiménez).

Archibebe claro*Tringa nebularia*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante regular pero poco frecuente, con observaciones en los dos pasos migratorios, siempre en humedales del valle.

CI: Citas de interés.

2013

- Observación invernal. El 26.02 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se ven 5 ejemplares (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

- Concentración numerosa. El 04.05 en el lago de Herramélluri (WN0005), se observan 30-40 aves junto a otros limícolas (Javier Robres, Óscar Gutiérrez y Jesús Serradilla).

2014

- Últimas observaciones. Paso prenupcial. El 20.05 en Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), se localiza un ejemplar en la gravera (Óscar Zuazo Velasco).

- Últimas observaciones. Paso postnupcial. El 31.10 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se ven 5 aves en la orilla del río Ebro (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Observación invernal. El 08.11 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se observa un ejemplar (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

2015

- Últimas observaciones. Paso prenupcial. El 26.05 en laguna de Roturas, Santo Domingo de la Calzada (WM0797), se ven 3 aves junto a varias cigüeñuelas (Óscar Zuazo Velasco).

- Primeras observaciones. Paso postnupcial. El 07.08 en el embalse de Leiva-Tormantos (VN9405), se observan tres ejemplares al atardecer (Jesús Serradilla Rodríguez).

Archibebe fino

Tringa stagnatilis

Primera cita para La Rioja.

CI: Todas las citas.

2013

• Rareza. El 04.05 en el lago de Herramélluri (WN0005), se localizan 2 aves junto a otros limícolas entre la vegetación del humedal, uno de ellos cojo (Javier Robres, Óscar Gutiérrez y Jesús Serradilla).

Andarríos bastardo

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Tringa glareola

Migrante poco común en los humedales del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2014

• Primeras observaciones. Paso postnupcial. El 19.07 en la laguna Mateo, San Asensio (WM2106), se ven 2 ejemplares (Ignacio Gámez Carmona).

Archibebe común

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Tringa totanus

Migrante regular en humedales del valle del Ebro con raras observaciones en los de la sierra.

CI: Citas de interés.

2013

• Últimas observaciones. Paso prenupcial. El 24.05 en Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0302), se localiza un ave en las charcas (Óscar Zuazo Velasco).

2015

• Primeras observaciones. Paso postnupcial. El 28.07 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observan 2 aves jóvenes (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

• Primeras observaciones. Paso postnupcial. El 28.07 en la laguna de Hervías (WN1100), se ve un ejemplar (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

Vuelvepiedras común*Arenaria interpres*

Únicas citas:

1. Tres aves el 09 y 10.05.91 en el Salobral, Pradejón. Ignacio Gámez (Gámez, 1993b).
2. Un adulto en mayo de 1994 en el Salobral, Pradejón. Ignacio Gámez (González, 1996).
3. Dos adultos en los arrozales de Alfaro el 07.05.97. Jesús M^a García (Gámez *et al.*, 1999).
4. Un ejemplar el 31.07.93 en El Salobral de Pradejón. Andrés Ruiz Bastida (Gámez *et al.*, 2002).
5. Dos adultos el 04.09.07 en el embalse de Leiva-Tormantos. Jesús Serradilla Rodríguez (Serradilla, 2007b).

CI: Todas las citas.

2013

- Rareza. El 28.04 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se observa un ave (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

Falaropo picogrueso*Phalaropus fulicarius*

Únicas citas:

1. Un joven el 03.09.90 en el Salobral de Pradejón. Ignacio Gámez (Gámez, 1990).
2. Un joven el 17.10.97 en la balsa de Oribe, Arnedo. Carlos Gutiérrez (Gámez *et al.*, 1999).
3. Un ave el 10.11.05 en el parque del Ebro, Logroño. Jesús Serradilla y Pedro M^a López (Serradilla & López, 2006).

CI: Todas las citas.

2014

- Rareza. El 15.02 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se ve un adulto alimentándose en el lago (Óscar Zuazo Velasco).

Págalo rabero*Stercorarius longicaudus*

Única cita:

1. Un joven el 26.08.93 en Igea. Ignacio Gámez y Luis Lopo (Gámez *et al.*, 1997).

CI: Todas las citas.

Págalo grande

Stercorarius skua



Primera cita para La Rioja.

CI: Todas las citas.

2015

• Rareza. El 20.01 en la LR-115, Rincón de Soto (WM9577), se recoge un ejemplar con erosiones leves en el ala izquierda y en un estado de desnutrición fuerte. Ingresa el 21.01 en el CRFS “La Fombera” (CRFS “La Fombera”).

Gaviota reidora



Chroicocephalus ridibundus

Ejemplares aislados pueden verse en cualquier mes del año, si bien resultan más frecuentes en migración o durante el invierno. En 2015 se comprueba su reproducción en La Rioja.

CI: Concentraciones numerosas (> 100) y otras citas de interés.

2014

• Migración. El 23.02 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se observa el paso de 2.500 aves en una hora. En determinado momento hay posadas alrededor de 1.400 (Ignacio Gámez Carmona).

• Concentración numerosa. El 02.03 en La Barca de Azagra, Calahorra (WM88), se ve un bando de 162 ejemplares (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

2015

• Localidad de cría segura. El 05.07 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se localizan 2 adultos y un pollo (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).

Gaviota cabecinegra

Larus melanocephalus

Única cita:

1. Un ave de segundo año calendario el 21.06.12 en el embalse de Leiva-Tormantos. Sandra Vela Serrano (Gámez at al., 2013).

CI: Todas las citas.

Gaviota de Audouin*Larus audouinii*

Única cita:

1. Un ave de primer año entre el 07 y el 22.08.11 en el embalse de El Perdiguero, Calahorra. Ignacio Gámez, Sandra Vela, Javier Robres, Jesús Ángel Ucha, Óscar Gutiérrez y Lidia Roncero (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Gaviota cana*Larus canus*

Única cita:

1. Un adulto el 24.12.03 en el parque del Ebro, Logroño. Pedro M^a López, Jesús Serradilla, Fernando Ruiz y Maite Aldonza (López *et al.*, 2004).

CI: Todas las citas.

Gaviota sombría*Larus fuscus*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante escaso pero regular en el valle del Ebro, con escasas observa-

ciones invernales.

CI: Citas de interés.

2013


- Últimas observaciones. Paso prenupcial. El 21.03 en el embalse de La Grajera, Logroño (WM4099), se observan 2 adultos (Óscar Gutiérrez Jiménez).

2014

- Concentración numerosa. El 14.02 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se cuentan 84 ejemplares (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).


Gaviota patiamarilla

Larus michahellis



Migrante e invernante regular, aunque poco abundante, en el tercio oriental del valle del Ebro. Algunas aves permanecen en la zona durante el verano.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.



Gaviota tridáctila

Rissa tridactyla


Única cita:

1. Un ave en plumaje invernal el 21.02.09 en el río Ebro, Logroño. Jesús Serradilla Rodríguez (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Gaviota enana

Hydrocoloeus minutus



Especie de aparición sólo ocasional con observaciones de aves aisladas durante los pasos migratorios y el invierno.

CI: Todas las citas.

Pagaza piconegra

Gelochelidon nilotica

Migrante muy escaso principalmente en el paso prenupcial.

CI: Todas las citas.

2015

• Raraza. El 20.07 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observan 2 ejemplares (Ignacio Gámez Carmona).

Charrán patinegro*Sterna sandvicensis*

Únicas citas:

1. Un adulto el 03.01.06 en el embalse de Leiva-Tormantos. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).
2. Dos adultos y un juvenil el 21.06.12 en el embalse de Leiva-Tormantos. Sandra Vela Serrano (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Charrán común*Sterna hirundo*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Migrante escaso en ambos pasos.

CI: Todas las citas.

2013

- Especie escasa. El 05.11 en Turruncún, Arnedo (WM76), se observa un ejemplar en vuelo migratorio sorteando los cerros hacia el sur (Javier Robres Cabezón).

2014

- Especie escasa. El 20.09 en el soto de La Nava, Alfaro (XM0472), se ve un juvenil (Ignacio Gámez Carmona).

2015

- Especie escasa. El 26.07 en el embalse de Leiva-Tormantos (VN9405), se localizan 3 aves (Itziar Gutiérrez Uranga).

Charrán ártico*Sterna paradisaea*

Única cita:

1. Un ave el 02.06.90 entre San Adrián y Calahorra (Astrain *et al.*, 1990).

CI: Todas las citas.

Charrancito común*Sternula albifrons*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Únicas citas:

1. Un adulto el 07.08.91 en el embalse de La Grajera, Logroño. (Gámez, 1993c).

2. Un ave el 10.06.00 en La Grajera, Logroño. Luis Lopo Carramiñana

(Gámez *et al.*, 2002).

3. Dos adultos el 02.06.01 en el parque del Ebro, Logroño. Pedro M^a López Lázaro y Jesús Serradilla Rodríguez (Gámez *et al.*, 2003).

4. Un adulto el 08.07.02 en el parque del Ebro, Logroño. Jesús Serradilla Rodríguez (Gámez *et al.*, 2003).

5. Otro adulto el 05.10.03 en el embalse de Leiva-Tormantos. Javier Rodríguez Cuadra (Gámez *et al.*, 2003).

CI: Todas las citas.

Fumarel cariblanco

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Chlidonias hybrida

Migrante escaso en los humedales

del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2013

- Especie escasa. El 20.05 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se ve un adulto volando. A ratos se posa entre la vegetación (Óscar Zuazo Velasco).

- Especie escasa. El 07.05 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se cuentan, al menos, 11 aves entre las que vuelan y están posadas entre la vegetación (Óscar Zuazo Velasco).

- Especie escasa. El 09.06 en El Lago, Herramélluri (WN0005), se observan 4 ejemplares. Uno el 14.06 (Ignacio Gámez Carmona y Sandra Vela Serrano).

Fumarel común

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Chlidonias niger

Migrante escaso pero regular en

humedales del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2013

- Primeras observaciones. Paso prenupcial. El 04.04 en el embalse de El Recuenco, Calahorra (WM8880) se ven 2 aves (Sandra Vela Serrano y Javier Robres Cabezón).

- Últimas observaciones. Paso prenupcial. Entre el 29 y el 31.05 en el embalse de El Perdiguero, Calahorra (WM8482) permanecen 4 ejemplares (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

Fumarel aliblanco

Cblidonias leucopterus



Divagante accidental. Únicas citas:

1. Dos adultos en plumaje nupcial y un inmaduro el 12.05.95 en el embalse de Leiva. Ignacio Gámez (Gámez *et al.*, 1999).

2. Un juvenil entre el 06 y el 08.09.12 en La Grajera, Logroño. Sandra Vela, Javier Robres y Eugenio Montelío (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Ganga ortega



Pterocles orientalis

Desde la década de los años 90 se conocían pequeños núcleos reproductores dispersos por localidades favorables de la mitad oriental del valle de Ebro que se han mantenido hasta mediados de la década del 2000. Sin embargo, a partir de entonces, se ha detectado un fuerte declive de la población nidificante y las observaciones en época reproductora son cada vez más escasas. Las aves nidificantes se comportan como dispersivas y, pasado el periodo de cría, forman agregaciones con otras aves de regiones cercanas a las que se incorporan, en ocasiones, ejemplares de ganga ibérica. La presencia de estos grupos y su tamaño es cada vez menor, situación que ha ido paralela a la pérdida de calidad de hábitat de los medios agrarios y esteparios riojanos.

CI: Todas las citas.

2013

- Especie escasa. El 05.04 en Camproviejo, El Villar de Arnedo (WM78), se cuentan 7 aves en dos bandos, uno de 5 y otro de 2 ejemplares (Sandra Vela Serrano).

- Especie escasa. El 18.07 en la Rad de Barbarés, Murillo de Río Leza (WM96), se ve un ave. El 03.08 se observa un macho y una hembra. El 11.08, se localizan 4 ejemplares. El 12.09 se localiza un bando de 9 aves y el 17.09 se ven otras 2 volando que posteriormente se levantan de una finca labrada (Ignacio Gámez, Javier Robres y Sandra Vela).

- Especie escasa. El 14.09 en Rihuelo-Cofín, Alfaro (WM97), se observa un grupo de 4 ejemplares que se levanta de una balsa para el ganado. El 24.09 se ven 9 (2 y 7) en la balsa de La Cañada. El 28.09 se vuelven a contar 7 y el

29.09, 17 ejemplares (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).

2014

- Especie escasa. El 22.03 en la Rad de Murillo de Río Leza (WM96) se ve un macho volando (Daniel Mógica).


- Especie escasa. El 05.05 en Campo Viejo, El Villar de Arnedo (WM78) se observan 4 aves en una finca. En dos ocasiones se escuchan ejemplares de la especie sin llegar a verlos (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

- Especie escasa. El 13.09 en la Rad de Murillo de Río Leza (WM96) se localiza un solitario pollo de 12-15 días. Se intenta encontrar más pollos o adultos sin éxito (Javier Robres Cabezón).

2015

- Población reproductora. A lo largo del año 2015 la D.G. de Medio Natural llevó a cabo un censo de la población de gangas (ibérica y ortega) nidificantes que ha permitido constatar un drástico declive de la ganga ortega en La Rioja, con poblaciones reproductoras ya sólo en 3 zonas (3 cuadrículas UTM 10x10 Km): El Villar de Arnedo (WM78), Aldeanueva de Ebro (WM87) y Alfaro (WM97), estimando un total de 10-14 aves (5-7 parejas). El declive ha sido muy elevado dado que en el censo SEO 2005 se estimaron 70-130 aves distribuidas en 8 cuadrículas (César M^a Aguilar Gómez).

Ganga ibérica



Pterocles alchata

Desde la década de los años 90 se conocía una población nidificante muy escasa y localizada en Alfaro, en el extremo oriental del valle del Ebro. Sin embargo, en 2015 una evaluación exhaustiva de la población nidificante ha permitido ampliar el área de distribución a una nueva localidad, Aldeanueva de Ebro, y aumentar el número de parejas reproductoras conocidas. Las aves nidificantes se comportan como dispersivas y, pasado el periodo de

cría, forman agregaciones con otras aves de regiones cercanas a las que se incorporan, en ocasiones, ejemplares de ganga ortega. La presencia de estos grupos y su tamaño es cada vez menor, situación que ha ido paralela a la pérdida de calidad de hábitat de los medios agrarios y esteparios riojanos.

CI: Concentraciones numerosas (>20) y otras citas de interés.

2013

- Especie escasa. El 03.01 en Rihuelo, Alfaro (WM96), se observan varios

bandos de entre 13 y 85 ejemplares. Se estima un mínimo de entre 100-120 aves, aquerenciadas siempre en los alrededores del corral. El 07.01 se levanta un gran bando de 150 ejemplares en un rastrojo (Javier Robres, Sandra Vela e Ignacio Gámez).

- Especie escasa. El 06.03 en Cáscaras de Cofín, Alfaro (WM97), se ven 2 aves cruzando la LR-285 (Javier Robres Cabezón).

2015


- Población reproductora. A lo largo del año 2015 la D.G. de Medio Natural llevó a cabo un censo de la población de gangas (ibérica y ortega) nidificantes que ha permitido conocer mejor el área de ocupación y los efectivos en época reproductora que son mayores de lo previamente estimado. Se comprueba la presencia de aves reproductoras en un paraje del municipio de Aldeanueva de Ebro y con ello se amplía el área de distribución a la cuadrícula WM87. La estima de la población reproductora, incluyendo las zonas de Alfaro y Aldeanueva de Ebro, es de 44-52 aves (22-26 parejas) (César M^a Aguilar Gómez).

- Especie escasa. El 18.11 en Rihuelo, Alfaro (WM96), se localiza un bando de unos 30 ejemplares volando constantemente a escasa altura en una zona cultivada de secano (Eugenio Montelío Barrio).

- Especie escasa. El 27.11 en Rihuelo, Alfaro (WM96), se ve un bando de 24 aves aquerenciado en una finca frente a los corrales (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

- Especie escasa. El 30.12 en Rihuelo, Alfaro (WM96), se observa un bando de 27 ejemplares volando mientras se circula por la LR-385. Finalmente se posan en una finca (Javier Robres Cabezón).

Paloma bravía





E F M A M J J A S O N D

Columba livia

Los ejemplares estrictamente salvajes de esta especie han desaparecido de La Rioja. Toda la población actual se considera procedente de palomas domésticas. El mapa hace referencia a la población silvestre ya desaparecida.

CI: Citas de interés.

Paloma zurita





Columba oenas

Población nidificante, aunque cada vez menos numerosa, en todo el valle del Ebro, sobre todo en su mitad oriental. Se pueden ver aves en migración e invernantes en el valle.

CI: Citas de interés.



Paloma torcaz



Columba palumbus



Además de abundar por toda la región, principalmente durante los pasos migratorios, existe también una importante población reproductora distribuida por sotos y bosques del valle del Ebro, a la que se le unen no pocos invernantes. Es cada vez más abundante en zonas verdes de núcleos urbanos.

CI: Citas de interés.

Tórtola turca*Streptopelia decaocto*

Desde su aparición en La Rioja a principios de los años ochenta en el extremo oriental del valle del Ebro, esta especie ha colonizado ya núcleos urbanos, zonas ajardinadas y huertas próximas de toda la zona baja de la región.

CI: Citas de interés.

Tórtola europea*Streptopelia turtur*



Población nidificante no numerosa distribuida en zonas de altitud media y baja de toda la región. En migración se observa más frecuente y en casi toda La Rioja. Es apreciable el descenso de su población en la última década.

CI: Citas de interés.

2013

- Primeras observaciones. El 08.04 en Cofín, Alfaro (WM96), se ve un ejemplar (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).

Críalo europeo





Clamator glandarius

Reproductor regular, aunque escaso, en la mitad oriental de La Rioja y raras parejas aisladas en el valle en la occidental, con una sola observación de montaña, seguramente de un ave en migración.

CI: Citas de interés.

Cuco común



Cuculus canorus

Común y disperso por toda la región. Muchas aves se observan también en migración.

CI: Citas de interés.


2013

- Primeras observaciones. El 21.03 en La Grajera, Logroño (WM4099), se observa un ave en vuelo (Óscar Gutiérrez Jiménez).

- Primeras observaciones. El 27.03 en Santa Coloma (WM2889), se escucha el canto de un ejemplar en el reboillar (Jesús Serradilla Rodríguez).

Lechuza común

Tyto alba




Especie en declive en los últimos años. Nidifica en cualquier época del año en zonas apropiadas de toda La Rioja, sobre todo cerca de núcleos habitados, campos cultivados, viejas arboledas, roquedos y construcciones aisladas. Algunos escasos ejemplares llegan como invernantes y migrantes al valle del Ebro, siendo raros los pertenecientes a la forma “gutatta”, más norteños, de los que, no obstante, hay confirmada alguna observación.

CI: Citas de interés.

Autillo europeo

Otus scops





Común como ave estival en todo el valle del Ebro, escaseando según ascendemos de altitud y llegando a faltar en gran parte de la montaña. No pocas aves nos visitan en migración. Frecuenta proximidades de zonas habitadas y huertas cercanas, arboledas viejas y sotos.

CI: Citas de interés.

Búho real

Bubo bubo



La población riojana está repartida principalmente por el valle del Ebro y el sudeste de la región, con parejas aisladas en el interior montañoso. Falta prácticamente de las zonas más forestales de la mitad occidental y del sur de la región.



CI: Citas de interés.

2010

- Lugar no habitual. El 23.06 en San Andrés, Lumbreras (WM3760), se recoge un ejemplar atropellado que ingresa en La Fombera (CRFS “La Fombera”).



Mochuelo común

Athene noctua




Nidificante regular en todas las zonas bajas de La Rioja, más común en el tercio este y más escaso en el extremo occidental. Ha sufrido una disminución de su población en la última década. Frecuenta proximidades de zonas habitadas, campos de cultivo, barrancos, yasas y zonas arboladas aclaradas pero añosas.

CI: Citas de interés.

Cáرابو común*Strix aluco*

Nidificante en toda la región excepto zonas bajas de la mitad oriental. Abunda especialmente en zonas forestales de la mitad occidental y parece ser cada vez más común en núcleos habitados.


CI: Citas de interés.

Búho chico*Asio otus*

Especie poco común, con parejas reproductoras dispersas por todo el valle del Ebro y la media montaña. Algunos ejemplares llegan en migración e invierno. Frecuenta zonas arboladas no extensas, cercanas a espacios cultivados.

CI: Citas de interés.

Búho campestre



5) y otras citas de interés.


Asio flammeus

Invernante regular poco numeroso, algo más común como migrante, presente sobre todo en zonas cultivadas de los valles, principalmente de la mitad occidental. Con ocasión de temporadas con explosiones demográficas de roedores (principalmente *Microtus*), nos visitan muchos más ejemplares, pudiendo tener lugar entonces incluso reproducciones aisladas.

CI: Concentraciones numerosas (>

Chotacabras europeo



Caprimulgus europaeus



Gallinaciega

Común como nidificante en toda la región, algo menos frecuente en zonas cultivadas. Frecuenta laderas con abundante matorral, no excesivamente arboladas, bosques aclarados, sotos, etc.

CI: Citas de interés.

Vencejo común*Apus apus*

Hocete, Nocete

Numeroso en toda la región, nidificando en ciudades y pueblos de toda ella, si bien abunda más en el valle del Ebro. Bastantes aves migrantes. Se le observa sobrevolando cualquier punto de La Rioja mientras se alimenta en vuelo. Las observaciones de aves tempranas y tardías podrían dar lugar a confusión con ejemplares de vencejo pálido.

CI: Citas de interés.

2013

- Primeras observaciones. El 09.04 en Sierra Mala, Igea (WM8359), se ve un ave (Eugenio Montelío Barrio).
- Primeras observaciones. El 11.04 en el parque del Ebro, Logroño (WM4502), se localiza un ejemplar entre un grupo de vencejos reales (Jesús Serradilla Rodríguez).

2014

- Primeras observaciones. El 08.04 en el parque del Ebro, Logroño (WM4502), se observa un ave entre un grupo de vencejos reales (Jesús Serradilla Rodríguez).

2015

- Primeras observaciones. El 13.04 en el parque del Ebro, Logroño (WM4502), se ven, al menos, 2 aves (Jesús Serradilla Rodríguez).



Vencejo pálido*Apus pallidus*

Accidental. Única cita:

1. Un ave el 12.03.04 alrededor de la iglesia de Santiago, Logroño. Jesús Serradilla Rodríguez (Serradilla, 2004).

CI: Todas las citas.

Vencejo real



Apus melba

Población nidificante escasa, distribuida por zonas bajas de las cuencas del Najerilla, Iregua, Leza, Jubera, Cidacos y Alhama, así como en el valle del Ebro, nidificando tanto en edificaciones de pueblos y ciudades como en roquedos. Se le puede observar en cualquier punto de La Rioja alimentándose.

CI: Citas de interés.

2013

- Últimas observaciones. El 13.11 en la iglesia de Santiago, Logroño (WM4502), entra a dormir un ave. El 8.11 había un bando de 25 sobre el parque del Ebro (Jesús Serradilla Rodríguez).

2014

- Primeras observaciones. El 09.03 sobre el parque del Ebro, Logroño (WM4502), se observan 3 ejemplares al atardecer (Jesús Serradilla Rodríguez).



- Ampliación área de distribución. El 09.05 sobre el basurero de Nájera (WM2198), se observan 3-4 aves en vuelo. El 18.06 sobre Nájera, se ven 6-8 ejemplares en vuelo de formación. El 23.09 vuelan sobre los cortados del Najerilla, en Nájera, 6-8 aves al oscurecer. El 10.10 se encuentra la ubicación de la colonia en la iglesia de Uruñuela (David Lacanal y Jesús Serradilla Rodríguez).

- Últimas observaciones. El 16.11 en la iglesia de Santiago, Logroño (WM4502), entran a dormir 2 aves. El 13.11 se contaron 9-11 aves en vuelo de formación que posteriormente van entrando a dormir en las grietas del muro de la iglesia (Jesús Serradilla Rodríguez).

2015

- Ampliación área de distribución. El 15.08 en Nájera (WN2296), se ven 2 ejemplares entrando y saliendo continuamente del contrapeso de una grúa de construcción instalada en un solar de la calle Samaniego (Eugenio Montelío Barrio).

Martín pescador común





Alcedo atthis

Parejas dispersas por casi todos los ríos de cierto caudal de La Rioja, sobre todo en sus tramos bajo y medio, escaseando cuanto más al este. Resulta más común en invierno y sobre todo durante las migraciones, ocupando entonces también balsas, canales, embalses, etc.

CI: Citas de interés.

Abejaruco europeo

Merops apiaster



Picabejero

Población nidificante frecuente en toda la mitad oriental del valle del Ebro y el sudeste, escaseando hacia el extremo occidental y faltando en las montañas y bosques del oeste. En migración es bastante común, pudiendo observarse entonces en toda la región, incluso en zonas de montaña.

CI: Citas de interés.

2013

- Últimas observaciones. El 13.09 en el parque de La Ribera, Logroño (WN4602), se observa por última vez un bando de unas 60 aves en un dormitorio situado en unos chopos en la orilla del río Ebro (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Fecha inusual. El 08 y 15.11 en la carretera de El Cortijo, Logroño (WN4303), se localiza un adulto posado en un cable del tendido eléctrico (Jesús Nalda Sáenz-Torre).

Carraca europea

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Coracias garrulus

Migrante raro, con observaciones

anuales en el paso prenupcial.

CI: Todas las citas salvo el paso regular primaveral.

2013

- Especie escasa. El 04.06 en los Llanos de la Barca, Alfaro (XM0670), se ve un adulto aquerenciado que se posa en cables y estacas de un emparrado (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

- Especie escasa. El 17.06 en Planas Bajas, Alfaro (XM07), se recoge un adulto herido en una zona de viñedos (Ignacio Gámez Carmona).


2014

- Especie escasa. Entre el 09 y el 18.08 en el Monte, Zarratón (WN0002), permanece un ejemplar en una zona de rastrojos próxima a la carretera (Óscar Zuazo Velasco).

- Especie escasa. El 10.08 en la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos de Zarratón (WN1205), se observa un individuo posado sobre un cable del tendido eléctrico que discurre junto a la carretera. Desde ahí otea los campos de alrededor y se lanza al suelo donde captura presas, para volver seguidamente al posadero (Anabel Caro, Maite Aldonza y Fco. Javier Nalda).

- Especie escasa. El 04.09 en El Tajadal, Grávalos (WM7663), se observa un joven posado en un cable en la carretera LR-123 desde donde hacia pequeños lances de caza en los campos próximos (Eugenio Montelío Barrio).

Abubilla



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Upupa epops

Población estival y nidificante bastante común, abundando más en el valle del Ebro y en la mitad oriental, mientras que escasea en la montaña o falta por completo en las zonas altas o muy forestadas, siendo común también en migración. Ocasionales observaciones invernales circunscritas a La Rioja Baja. Frecuenta zonas cultivadas, en producción o abandonadas, sotos y arboledas no densas.

CI: Citas invernales y otras citas de interés.



2013

- Primeras observaciones. El 25.02 en Nájera (WM2296), se ve un ejemplar (Pedro Alonso Alonso).
- Observación invernal. El 04.12 en la ermita del Pilar, Alfaro (XM0172), se ve un adulto cruzar volando la carretera N-232 (Jesús Nalda Sáenz-Torre).

2015

- Lugar no habitual. El 14.05 en Mojón Alto, Ortigosa-Villoslada de Cameros (WM26), se oye el canto de un ave a 1650 m de altitud cerca de la torre de vigilancia de incendios. El 15.05 se localiza un ejemplar en el puerto de Peña Hincada, Brieva de Cameros (Pedro Mari López Lázaro e Ignacio Gómez Miguel).

Torcecuello euroasiático





Jynx torquilla

Nidificante disperso por todos los valles riojanos, frecuentando sotos, frutales y arbolado disperso, pero eludiendo el interior de grandes masas forestales, zonas áridas y cimas montañosas. Muchas aves se observan en migración y existen escasas observaciones invernales.

CI: Citas invernales y otras citas de interés.

Pito real





Picus viridis

Nidificante común por toda La Rioja, desde el valle del Ebro a la montaña, si bien resulta más frecuente en valles con arbolado disperso, sotos, frutales y bosquetes.

CI: Citas de interés.

Pico picapinos





Dendrocopos major

Numeroso en zonas forestales o arboladas de toda La Rioja.

CI: Citas de interés.

Pico menor



Dendrocopos minor

Población reducida y localizada dispersa por sotos naturales y viejas arboladas de casi toda la ribera del Ebro y tramos bajos de sus afluentes. Nidificante puntual en áreas forestales no ripícolas.

CI: Citas de interés.

2014

- Ampliación área de distribución. El 12.02 en Daroca de Rioja (WM3491), se localiza un macho que reclama en

una pequeña aliseda con chopos en el río de Daroca (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Ampliación área de distribución. El 12.03 en Cárdenas (WM1991), se observa un macho reclamando y tamborileando en una chopera y retazos de bosque de ribera del río Cárdenas (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Lugar no habitual. El 10.10 en el barranco de Las Fuentes, Anguiano (WM1878), se escucha el reclamo de un ejemplar en los chopos (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Lugar no habitual. El 24.10 en el Alto de Pieza Frades, Villanueva de Cameros (WM2769) se escucha el reclamo de un ave en un rebollar aclarado con escaso sotobosque (Pedro Mari López Lázaro).

2015

- Ampliación área de distribución. El 20.02 en Baños de Río Tobía (WM2088), se localiza un macho emitiendo reclamo entre las choperas del río Najerilla (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Lugar no habitual. El 20.02 en Anguiano (WM1982), se escucha el reclamo de un ejemplar en las choperas del río Najerilla (Jesús Serradilla Rodríguez).

Alondra ricotí



Chersophilus duponti

Accidental. Única cita:

1. Un ave el 10.05.86 en Alcanadre. M.C. Domingo y J.V. Nalda (Domingo *et al.*, 1987).

CI: Todas las citas.

Calandria común





Melanocorypha calandra

Común en las zonas cerealistas del valle del Ebro. Nomadea en invierno por todas las localidades favorables.

CI: Citas de interés.

Terrera común

Calandrella brachydactyla



Aloya


Nidificante en cultivos de secano, zonas incultas o eriales de todo el valle del Ebro, principalmente de la mitad oriental.

CI: Citas de interés.

2014

- Lugar no habitual. El 23.05 en Ras-traculos, Viniegra de Arriba (WM15), se observa un ejemplar en la pista a corta distancia (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

Terrera marismeña





Calandrella rufescens

Especie reproductora, con una reducidísima población nidificante de unas pocas parejas repartida en tres núcleos, que se comporta como dispersiva fuera de la época de nidificación.

CI: Todas las citas.

Cogujada común

Galerida cristata





Cujá, Aloya

Común en cualquier área cultivada de los valles riojanos y zonas áridas del este y sudeste.

CI: Citas de interés.

Cogujada montesina

Galerida theklae





Aloya

Relativamente común en laderas pedregosas, de matorral bajo o cultivos abandonados de media montaña en la mitad oriental riojana.

CI: Citas de interés.

Alondra totovía

Lullula arborea





Aloya

Común en zonas de matorral, arbolado disperso, bordes de bosque, etc., de la montaña riojana, faltando en los fondos de valle donde sin embargo se puede observar en migración e invierno.

CI: Citas de interés.

Alondra común

Alauda arvensis



Aloya

Nidificante común en zonas desarrolladas y de escasa pendiente, tanto del valle del Ebro como de la montaña, desde llanuras salitrosas y cultivos cerealistas, a eriales y pastizales subalpinos. Es más numerosa en la mitad occidental, casi desapareciendo en las zonas áridas del este. Abunda sobre todo en migración e invierno.

CI: Citas de interés.

Alondra cornuda

Eremophila alpestris



Divagante accidental. Únicas citas:

1. Grupo de 10 aves el 21.01.83 en Recajo (Logroño). José M^a González Perujo (González, 1996).

2. Un ejemplar el 12.05.99 en el collado Gatón, Ezcaray. Alejandro Onrubia (Gámez *et al.*, 2003).



CI: Todas las citas.

Avión zapador



- Primeras observaciones. El 07.03 en las lagunas de La Maja, Arnedo (WM78), se observa 2 aves (Diego Benavides Madariaga y Óscar Gutiérrez Jiménez).

Avión roquero



Riparia riparia

Colonias reproductoras, no numerosas, repartidas por el cauce del Ebro y zonas bajas de otros ríos. Frecuente en migración.

CI: Colonias mayores de 100 parejas y otras citas de interés.

2013


- Primeras observaciones. El 19.02 en la Estanca-Perdiguero, Calahorra (WM8482), se ve un bando de 15 ejemplares (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

Ptyonoprogne rupestris

Colonias reproductoras no escasas repartidas por cortados rocosos de toda la región, más frecuentes en zonas de media montaña. Algunas parejas aisladas crían en edificios y puentes. La mayoría de las aves desaparecen en invierno o descienden a zonas más bajas.

CI: Citas de interés.

Golondrina común



Hirundo rustica


Nidificante común en zonas habitadas de toda la región, frecuentando éstas y los cultivos cercanos. Frecuente en migración en cualquier lugar.

CI: Citas de interés.

2013

- Fecha no habitual. El 19.11 sobre la Circunvalación Sur de Calahorra (WM88), se observa un ave (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

Golondrina dáurica



Cecropis daurica

Población nidificante reducida en la mitad oriental de la región, con una única localidad de cría conocida en La Rioja Alta. Además de las pocas parejas estivales y nidificantes, pueden observarse escasos migrantes.

CI: Ampliación de área de distribución y otras citas de interés.

2013

- Primeras observaciones. El 11.03 sobre el río Najerilla, Nájera (WM2195), se localiza un ejemplar en un bando mixto con aviones roqueros, golondrinas y aviones comunes (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Primeras observaciones. El 20.03 sobre el Río Alhama, Aguilar del Río Alhama (WM8650), se ven 2 aves volando en la carretera a San Felices (Ignacio Gámez, Javier Robres, Fernando Cirac, Eduardo Fabeiro y Michel Marín).

2015

- Localidad no habitual. El 20.04 en el casco urbano de Murillo de Río Leza (WM5594), se localiza un ejemplar posado en un cable del tendido eléctrico (Ignacio Gámez Carmona).


- Lugar no habitual. El 26.04 en la laguna de Hervías (WN1100), se observa un macho y una hembra posados y cantando en el emparrado de

una viña junto a una concentración de varios cientos de hirundínidos (golondrina común, avión zapador y común) (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

Avión común

Delichon urbica

Garrigüelo



E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D

Frecuente en cualquier zona habitada de La Rioja, con sólo contadas y pequeñas colonias reproductoras en cortados naturales. Común en migración.

CI: Citas de interés.

2013

- Primeras observaciones. El 07.03 en Las Siete Cuevas, Nájera (WM2195), se localiza un ave en un bando de aviones roqueros (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Concentración numerosa. El 25.08 en la ermita de Aradón, Alcanadre (WM6795), se observan unas 12.000 aves posadas en los cortados fluviales junto a la ermita (Ignacio Gámez Carmona).

- Últimas observaciones. Entre el 31.10 y el 06.11 en Nájera (WM2296), se ve regularmente un ejemplar con un bando de aviones roqueros soleándose en el silo (Jesús Serradilla Rodríguez).

2014

- Primeras observaciones. El 24.02 en el embalse de La Molineta, Alfaro (XM0396), se observan 2 aves (Jesús Serradilla Rodríguez).

- Primeras observaciones. El 05.03 sobre el puente de Los Soldados, Nájera (WM2195), se ven 2 aves volando con aviones roqueros (Jesús Serradilla Rodríguez).



2015

- Primeras observaciones. El 23.02 en Varea, Logroño (WN4801), se observa un ejemplar (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

- Primeras observaciones. El 25.02 en Nájera (WM2296), se localiza un ave volando entre un grupo de aviones roqueros (Jesús Serradilla Rodríguez).

Bisbita campestre

Anthus campestris



Frecuenta áreas cultivadas, eriales, pastizales secos y laderas desarboladas de toda La Rioja. No demasiado frecuente en los pasos.



CI: Citas de interés.

2015

- Ampliación área de distribución. El 16.05 en Anguiano (WM17), se localizan sendas aves en zonas de aulagar ralo, una próxima a los cortados de caliza y otra en el barrio de Eras. El 09.06 se ven y se oyen cantar tres machos en el cordal de Valdeloshaces, en una zona de pastizal de montaña con brecina (Jesús Serradilla Rodríguez).

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis




Población estival reproductora distribuida en zonas de arbolado disperso y bordes boscosos de toda la montaña riojana. En migración se observa también en el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Bisbita pratense

Anthus pratensis



Común en rastrojos, pastizales y orillas de humedales de zonas medias y bajas durante todo el invierno, observándosele casi en cualquier localidad durante la migración.

CI: Citas de interés.

2013

- Primeras observaciones. El 15.09 siguiendo la pista del puerto de Montenegro a Rastraculos, Viniegra de Arriba (WM1659/WM1760/WM1257), se observan 2, 3 y 1 ejemplares, respectivamente, en los prados y brezales (Jesús Serradilla Rodríguez y Javier Robres Cabezón).

- Primeras observaciones. El 17.09 en Haro (WN1015), se localizan 3 aves en unos rastrojos próximos a una charca (Eugenio Montelío Barrio y Jesús Serradilla Rodríguez).

2014


- Primeras observaciones. El 28.09 en el Serradero, Castroviejo (WM28), se escucha el reclamo de 2 aves (Jesús Serradilla Rodríguez).

Bisbita gorgirrojo*Anthus cervinus*

Divagante accidental. Únicas citas:

1. Un ave el 30.09.92 en El Salobral de Pradejón (González, 1996).
2. Un ejemplar el 08.10.00 en los arrozales de Cofín, Alfaro. Carlos Gutiérrez Expósito (Gámez *et al.*, 2002).
3. Tres aves el 18.09.01 en Cofín, Alfaro. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2003).
4. Un adulto el 16.02.12 en el río Linares, Cervera del Río Alhama. Ignacio Gámez Carmona.

CI: Todas las citas.

Bisbita alpino


E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Anthus spinoletta

Nidificante común en pastizales de montaña de La Demanda, Urbión y Cebollera de donde desaparece en invierno. Durante esta estación es común en todo el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Lavandera boyera



tuales y otras citas de interés.

2014

- Observación invernala. El 31.01 en las graveras de Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0203), se observa un ave entre las lavanderas blancas (Óscar Zuazo Velasco).

2015

- Primeras observaciones. El 24.03 en las graveras de Caracarros, Villalobar de Rioja (WN0203), se localiza un ejemplar junto a numerosas lavanderas blancas (Óscar Zuazo Velasco).



Motacilla flava

Población nidificante, perteneciente a *M.f. iberiae*, estival en zonas cultivadas asociadas a acequias de La Rioja Alta y mucho más localizada en humedales de todo el valle del Ebro. En migración se la observa más dispersa por todo el valle, siendo entonces posible observar individuos de otras subespecies, principalmente *M.f. flava* y *M.f. flavissima*.

CI: Citas de subespecies no habi-

Lavandera cascadeña

Motacilla cinerea



Andarríos Amarillo

Común y dispersa por casi toda la región, abundando más en la mitad occidental, frecuentando las proximidades de ríos, arroyos y otros cursos de agua, pero afincándose también en zonas urbanas, resultando más escasa en la mitad oriental. En migración e invierno llegan aves europeas, siendo entonces más frecuente.


CI: Citas de interés.

2013

- Lugar de cría no habitual. El 15.06 en la calle Duquesa de la Victoria, Logroño (WM40), se observa por primera vez la presencia de una pareja de aves alimentándose en el patio interior de un edificio. Un mes después apa-

rece un pollo volantón y para el final del verano ya no se vuelven a ver (Daniel Mógica Sánchez).

Lavandera blanca




Motacilla alba

Andarríos

Frecuente en toda la región, sobre todo asociada a núcleos rurales y urbanos, así como a cultivos cercanos, regadíos, tierras recién labradas, etc. Se observan aves europeas en migración e invierno, sobre todo en el valle del Ebro, aquí incluso los menos numerosos individuos de la subespecie británica *M. a. yarrellii*.

CI: Citas de interés.



Mirlo-acuático europeo

Cinclus cinclus

Población sólo localmente frecuente, distribuida durante la nidificación por el curso medio y alto de los ríos riojanos. En invierno algunas aves descienden al curso bajo.

CI: Citas de interés.

2013

- Localidad no habitual. Entre el 16.11 y el 10.12 en el paseo de La Florida, Logroño (WM4602), permanece

un ave en el entorno de la presa de la minicentral (Pedro Mari López Lázaro y Daniel Mógica Sánchez).

- Localidad no habitual. El 19.12 en el casco urbano de Alfaro (XM0370), se ve un ejemplar volando sobre el río Alhama (Pedro Mari López Lázaro).

2014



- Localidad no habitual. El 04 y 05.11 en el Soto de Los Americanos, Logroño (WN50), se observa un ejemplar en uno de los brazos del río Ebro (César M^a Aguilar Gómez).

2015

- Localidad no habitual. Entre el 08 y el 13.12 en el paseo de La Florida,

Logroño (WM4602), permanece un ave en el entorno de la presa de la mini-central (Pedro Mari López Lázaro).

Chochín común




Troglodytes troglodytes

Hornero, Caracolillo

Numeroso como nidificante en toda la región, falta sólo en las zonas áridas del este, abundando sobre todo en los valles occidentales.

CI: Citas de interés.




Acentor común

Prunella modularis

Común en toda la montaña riojana y más escaso en el extremo occidental del valle del Ebro, faltando como reproductor en el resto del valle y en el cuadrante sudeste. En invierno y migración se puede observar en cualquier localidad de La Rioja por la llegada de aves europeas, descendiendo al valle no pocas indígenas. Durante la reproducción frecuenta zonas con abundante matorral de brezo, boj, retamas, etc., así como matas de escaramujos, zarzales y enebros, entre otras.

CI: Citas de interés.

Acentor alpino



interés.

2013

- Observación estival. El 15.08 en Rastraculos, Viniegra de Arriba (WM1258), se ven 3 ejemplares en vuelo junto a la antena (Ignacio Gámez, Sandra Vela y Javier Robres).

2015

- Concentración numerosa. El 06.12 en el cerro Peñalba, Tobía-Matute (WM1581), se localiza un bando de 35-40 aves (Jesús Serradilla Rodríguez).



Prunella collaris

Población reproductora actualmente desconocida. Los datos de reproducción en las cotas más altas de las sierras de Cebollera y Urbión, no han vuelto a comprobarse desde hace dos décadas. En invierno, cuando se observan aves en cotas más bajas procedentes de otras regiones, tienen preferencia por cimas rocosas, pedregales de montaña y roquedos bajos.

CI: Citas estivales y otras citas de

Petirrojo europeo

Erithacus rubecula



le ve en cualquier lugar con un mínimo de vegetación arbustiva o arbórea.



CI: Citas de interés.

Pichente

Muy común invernante y migrante en todas las localidades de La Rioja, mientras que como reproductor falta de la mitad oriental del valle del Ebro y en el sudeste, siendo numeroso en el oeste y la sierra. Frecuenta como nidificante zonas forestales con claros, zonas cultivadas con matorral, setos y arbolado disperso, laderas de matorral arboladas, riberas de ríos y arroyos, cercanías de núcleos habitados, etc., mientras que en invierno se

Ruiseñor común

Luscinia megarhynchos



Nidificante frecuente en toda la región, faltando en cotas elevadas del sur y sudoeste, abundando más en el valle del Ebro y la mitad oriental. Migrante común en cualquier localidad. Frecuenta espesuras de sotobosque de todo tipo, especialmente las cercanas a cursos de agua de cualquier tamaño.

CI: Citas de interés.

Ruiseñor pechiazul

Luscinia svecica



Se le observa sobre todo como migrante, principalmente en el paso postnupcial en humedales del valle del Ebro. Existe una cita de una pareja con un macho cantor en junio y julio de 1996 en Lumbreras (Ceña, 1997). Desde entonces no se ha vuelto a encontrar en época de nidificación. También existe un pequeño número de invernantes muy localizados en, al menos, algunos tamarizales y acequias de Pradejón y Alfaro.



CI: Todas las citas fuera del periodo migratorio.

2014

- Observación invernal. El 27.12 en El Prado, Ochánduri (VN9708), sale un ave del carrizo en el arroyo del Piojo (Óscar Zuazo Velasco).



Colirrojo tizón*Phoenicurus ochrurus*

Rabirrubia, Culirroyo




Nidificante frecuente distribuido por toda la región, con individuos que descienden de altitud en invierno y con llegada de migrantes e invernantes al valle del Ebro. Habita en roquedos y cortados de todo tipo, así como ruinas, aldeas, ciudades, etc.

CI: Citas de interés.

Colirrojo real*Phoenicurus phoenicurus*

Migrante no numeroso por toda La Rioja y nidificante muy escaso y localizado, con parejas aisladas en masas forestales maduras de la mitad occidental de la sierra, desde el Oja al Leza, principalmente en robledales húmedos.

CI: Citas de interés.

Tarabilla nortea*Saxicola rubetra*

Especie común en las migraciones, más abundante en la postnupcial, principalmente en el valle del Ebro. Parejas aisladas nidificaron en algunas localidades del extremo occidental de La Rioja, aunque actualmente no hay evidencias de cría segura en las mismas.


CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

2013

- Últimas observaciones. El 17.10 en la Rad de Murillo de Río Leza (WM59), se localiza un ejemplar (Ignacio Gámez Carmona).

Tarabilla europea

Saxicola rubicola




Especie común nidificante en toda la región, desde el valle del Ebro a la montaña, frecuentando laderas de matorral, linderos, acequias, cultivos de regadío, etc. En invierno y en migración llegan algunos individuos de latitudes más norteñas.

CI: Citas de interés.

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

Losera, Ruiblanca





Numerosa en migración por zonas abiertas de toda la región, mientras que la población nidificante se reproduce en zonas despejadas, desde barbechos labrados del valle a pedregales de las cimas montañosas, faltando de las zonas forestales. En los últimos años se ha detectado un acusado declive de la población que se distribuía por el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

2014

- Primeras observaciones. El 09.03 en La Vilrraza, Cidamón (WN1001), se observa un macho en una finca que se estaba labrando (Óscar Zuazo Velasco).
- Últimas observaciones. El 01.11 en la Rad de Murillo de Río Leza (WM59), se ve un ejemplar (Ignacio Gámez Carmona).

Collalba rubia*Oenanthe hispanica*

La población nidificante se distribuye por el valle del Ebro, salvo en la mayor parte de su mitad occidental, así como por las zonas más secas y áridas del este y sudeste. Es común en saladares, tamarizales ralos, tomillares, romerales, viñedos, etc. Posibles migrantes desde regiones cercanas.

CI: Citas de interés.

2013

- Primeras observaciones. El 31.03 en San Martín de Berberana, Agoncillo (WM6397), se localiza un macho (Javier Robres Cabezón e Ignacio Gámez Carmona).

2014



- Primeras observaciones. El 21.03 en La Degollada, Calahorra (WM88), se ve un ejemplar (Jesús Ángel Ucha Turumbay).
- Lugar no habitual. El 05.07 en las afueras de Santo Domingo de la Calzada (WM0497), se observa un macho (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

2015

- Primeras observaciones. El 09.04 en El Tornazal, Arnedo (WM7779), se ve un macho posado en el borde de un camino, en una zona agrícola de secano (Eugenio Montelío Barrio).

Collalba negra*Oenanthe leucura*

Calderero





Nidificante y sedentaria repartida por zonas áridas y pedregosas o rocosas de la mitad oriental del valle del Ebro y el sudeste.

CI: Citas de interés.

Roquero rojo

Monticola saxatilis





Nidificante estival distribuido por zonas rocosas y pedregosas de toda la montaña riojana y muy localizado en el valle del Ebro. Observaciones escasas en migración.

CI: Citas de interés.

Roquero solitario

Monticola solitarius




Población reproductora escasa y dispersa por cortados rocosos de toda la región, a excepción de las montañas del cuadrante suroccidental. Localmente común.

CI: Citas de interés.

Mirlo capiblanco

Turdus torquatus





Bastante escaso en migración, con observaciones principalmente en zonas de montaña con pastizal, abundante matorral y arbolado disperso. Algunas aisladas parejas se localizaron en época de reproducción en Cebo-llera y Urbión a finales del s.XX, aunque actualmente no hay evidencias de cría segura en las mismas.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.


Mirlo común*Turdus merula*

Torda




Población residente numerosa repartida por toda la región, desde el valle del Ebro a la montaña, si bien resulta más abundante en la mitad occidental, frecuentando praderas, huertas, frutales, navas, etc., con abundante matorral y arbolado disperso en zonas frescas. Regularmente llegan bastantes migrantes e invernantes.

CI: Citas de interés.

Zorzal real*Turdus pilaris*

Invernante no numeroso en zonas de montaña con abundante matorral y arbolado disperso en pastizales, o bien en el valle del Ebro, en viñas, frutales y olivares. Los invernantes de la montaña descienden al valle con ocasión de grandes nevadas.

CI: Concentraciones numerosas (> 100) y otras citas de interés.

Zorzal común*Turdus philomelos*


Nidificante frecuente en toda la mitad occidental y sur de La Rioja, faltando como reproductor en la mitad oriental del valle del Ebro y en el sudeste, salvo raras parejas aisladas en sotos del Ebro. Migrante e invernante numeroso en cualquier localidad, sobre todo del valle.

CI: Citas de interés.

Zorzal alirrojo

Turdus iliacus

Pardigüela





Ave de paso no escasa e invernante común, principalmente en el valle del Ebro y más escaso en la montaña, no faltando algunas aves en cotas altas.

CI: Citas de interés.

Zorzal charlo

Turdus viscivorus

Charra, Charla, Guión de Tordas





Población nidificante numerosa en toda la sierra riojana, en cualquier tipo de zona arbolada y muy raras parejas en el valle. Llegan también bastantes aves en migración y en invierno, siendo entonces más común en zonas bajas.

CI: Citas de interés.



Cetia ruiñeñor

Cettia cetti




Común en todos los valles riojanos y sobre todo en el del Ebro, llegando también migrantes a zonas bajas. Frecuenta siempre espesuras ribereñas.

CI: Citas de interés.

Cisticola buitrón*Cisticola juncidis*

Población nidificante no escasa pero localizada en zonas de regadío de todo el valle del Ebro, sobre todo en su mitad oriental, habitando en cultivos de cereal, herbazales, eriales herbosos altos, etc.

CI: Citas de interés.

Buscarla pintoja*Locustella naevia*

Migrante poco numeroso en el valle del Ebro. Existe la cita de un volantón en las hoces de Foncea el año 2.000.

CI: Citas fuera del periodo de paso regular y otras citas de interés.

Buscarla unicolor*Locustella luscinioides*



Única cita:

1. Un ave el 08.05.11 en el río Cidacos, Santa Eulalia Somera. David Mazuelas y Óscar Gutiérrez (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Zarcero bereber

Iduna opaca



Observaciones muy escasas en época de reproducción en el valle del Ebro oriental, frecuentando riberas salinas.

CI: Todas las citas.

2014

- Especie escasa. El 14.06 en la yasa Estaquillas-Cabezo Aguilar, Pradejón (WM7986), se escucha repetidamente un ejemplar cantando entre el tamarizal-carrizal. El 06.07 en el mismo lugar se oye también cantar a

un ave y se la ve fugazmente (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

- Especie escasa. El 19.06 en La Degollada, Calahorra (WM88), se ve un ave (Jesús Ángel Ucha Turumbay y Gabriel Furguieue Stabile).

Carricerín cejudo

Acrocephalus paludicola


Divagante accidental. Única cita:

1. Dos aves entre el 19 y el 22.09.80 en el embalse de La Grajera, Logroño. Luis Lopo y Fco. Javier Nalda (Lopo *et al.*, 1981).

CI: Todas las citas.

Carricerín común

Acrocephalus schoenobaenus



No escaso durante los dos pasos migratorios en humedales del valle



del Ebro.

CI: Citas de interés.

2013

- Primeras observaciones, paso postnupcial. El 30.07 en una charca próxima a la carretera de Villalba, Haro (WN0915), se localizan, al menos, 5 aves en el carrizal del humedal (Eugenio Montelío Barrio y Jesús Serradilla Rodríguez).

Carricero común





Acrocephalus scirpaceus

Población nidificante localizada en zonas palustres de todo el valle del Ebro, observándose aquí también no pocos migrantes.

CI: Citas de interés.



Carricero tordal



Acrocephalus arundinaceus

Común en humedales de todo el valle de Ebro, sobre todo de su mitad oriental, con frecuentes migrantes en estas localidades.

CI: Citas de interés.





Zarcero políglota

Hippolais polyglotta

Nidificante frecuente en gran parte de la región que, si bien abunda más en zonas bajas, no resulta tampoco escaso en vallejitos de montaña. En migración se le observa casi en cualquier lugar. Fundamentalmente frecuente zarzales.

CI: Citas de interés.

Curruca rabilarga





Sylvia undata

Estrepero, Zarre, Zurrapastor

Nidificante común y localmente numeroso en toda La Rioja, especialmente en laderas de matorral de media montaña, escaseando más en el valle del Ebro y en las cimas montañosas, siendo más frecuente en la mitad oriental. Algunas aves descienden de altitud en invierno.

CI: Citas de interés.





Curruca tomillera

Sylvia conspicillata

Nidificante común, con parejas y pequeños núcleos reproductores dispersos en zonas áridas del valle del Ebro y del cuadrante sudeste, ascendiendo por la media montaña seca donde sólo es localmente común. Frecuenta aulagares, eriales y saladares con matorral ralo y bajo.

CI: Citas de interés.





Curruca carrasqueña

Sylvia cantillans

Población nidificante no demasiado numerosa, distribuida por carrascales, coscojares y otras formaciones de matorral mediterráneo de toda la región, principalmente del valle del Ebro y media montaña, abundando más en la mitad oriental y el sudeste.

CI: Citas de interés.



localiza un macho y una hembra que

Curruca cabecinegra



Sylvia melanocephala

Especie común y residente en todas las zonas cubiertas de matorral mediterráneo del valle del Ebro, piedemonte del noroeste y la montaña oriental.

CI: Citas de interés.

2015

- Ampliación área distribución. El 26.05 en Anguiano (WM1879), se reclama insistentemente en un espinal (Jesús Serradilla Rodríguez).



El 04.06 en Nido del Cuervo, Hornillos de Cameros (WM5072), se observan 2 ejemplares, al menos uno de ellos macho adulto, cantando en una zona de montaña con pastizales y presencia de rosales silvestres y majuelos. Uno de los individuos está cantando activamente. La zona está a 1.330 m.s.n.m. (Eugenio Montelío Barrio).

Curruca mirlona

Sylvia hortensis

Nidificante localizado y disperso en zonas medias y bajas de casi toda La Rioja, faltando en la sierra más lluviosa. Ocupa sobre todo zonas arboladas con abundante matorral de los bordes del valle y ocasionalmente en sotos ribereños.



CI: Citas de interés.

2013

- Ampliación área de distribución.



2015

• Ampliación área de distribución. El 09.06 en el camino viejo a Valvanera, Anguiano (WM1177), se oye el canto de un macho al que se localiza posteriormente en un espinillo albar. El ave estaba en una solana a 1.400 m (Jesús Serradilla Rodríguez).

Curruca zarcera*Sylvia communis*

Frecuente principalmente en migración casi en cualquier localidad de La Rioja. Como reproductora no es escasa en valles de la mitad occidental, pero muy localizada en la oriental. Frecuenta zonas con arbolado disperso pero denso matorral de vallejos y arroyos.

CI: Citas de interés.

Curruca mosquitera*Sylvia borin*

Población reproductora distribuida por valles de toda la región, sobre todo de la mitad occidental y sotos del Ebro. Es numerosa en migración casi en cualquier localidad. Frecuenta zonas arboladas frescas con abundante sotobosque.

CI: Citas de interés.



2013

• Últimas observaciones. El 12.10 en Varea, Logroño (WN4801), se observa un ave que se posa en un chopo tras alimentarse en una higuera próxima (Jesús Serradilla Rodríguez).

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

Moralica





Especie abundante, nidificante en toda la región, a la que se le unen en migración e invierno numerosos individuos europeos. Frecuenta casi cualquier zona arbolada y con espeso estrato arbustivo, también zonas con frutales, olivares, humedales, parques, etc.

CI: Citas de interés.

Mosquitero papialbo

Phylloscopus bonelli



Nidificante común en toda la región, salvo en la mitad oriental del valle del Ebro. Frecuenta zonas arboladas con abundante sotobosque, desde carrascales a robledales e incluso pinares maduros de media montaña.

CI: Citas de interés.

Mosquitero silbador



Phylloscopus sibilatrix

Solo conocido a través de bibliografía (González, 1996) en donde se le cita como migrante escaso.

CI: Todas las citas.

Mosquitero común*Phylloscopus collybita*

Recache, Pipiiyo



Población nidificante poco conocida, probablemente escasa y localizada en zonas forestales de montaña, principalmente de la mitad occidental. Numeroso como migrante e invernante por la llegada de ejemplares europeos. Entoces se distribuye por toda La Rioja, aunque es más abundante en el valle del Ebro.



CI: Citas de interés.

2014

- Posible localidad de cría. El 07.05 en Río Molina, Ocón (WM6681), se escucha un ejemplar cantando junto a un arroyo con presencia de matorral espinoso próximo a un rebollar mixto, a 975 m. El 20.06 se vuelve a escuchar otro ejemplar en la misma zona (Eugenio Montelío Barrio).
- Posible localidad de cría. El 16.05 en el camino a Valvanera, Tobía (WM1280), se escucha un macho cantando en un rebollar a 950 m (Jesús Serradilla Rodríguez).

2014-15

- Posible localidad de cría. El 16.05.14 en el barranco del Cristo, Anguiano (WM1076), se escucha un macho cantando en un espino albar de una ladera con encinas a 1.200 m. El 20.06.15 se escuchan 2 machos cantando en el mismo barranco (Jesús Serradilla Rodríguez).

Mosquitero ibérico*Phylloscopus ibericus*

Nidificante común en toda La Rioja, más escaso en la mitad oriental del valle del Ebro y el sudeste. Frecuenta áreas arboladas con abundante sotobosque, desde sotos a masas forestales de diversas especies


CI: Citas de interés.

2015

- Primeras observaciones. El 11.03 en La Fombera, Logroño (WN4801) se escucha un ejemplar cantando (Javier Robres Cabezón).

Mosquitero musical

Phylloscopus trochilus





especialmente del valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Migrante numeroso en ambos pasos en cualquier localidad, espe-

Reyezuelo sencillo

Regulus regulus





Nidificante común, algo localizado, en áreas forestales de montaña desde La Demanda al Hayedo de Santiago, llegando hasta los altos de San Millán, Moncalvillo, Almarza y Ajamil. En invierno algunas aves descienden de altitud llegando, pocas, hasta el valle del Ebro, donde quizás invernan también algunas aves europeas.

CI: Citas de interés.

Reyezuelo listado

Regulus ignicapilla





Nidificante común en toda la montaña riojana, normalmente en cotas inferiores a *R. regulus*, faltando en la mitad oriental del valle del Ebro, donde sin embargo aparece en invierno.

CI: Citas de interés.

Papamoscas gris*Muscicapa striata*

Tanasio francés




recorrido por el sendero próximo al río Tirón. Uno de ellos cebaba a un joven con un gusano grande en la rama de un árbol (Eugenio Montelío Barrio y Jesús Serradilla Rodríguez).

2014

- Últimas observaciones. El 14.10 en el parque del Ebro, Logroño (WN4502) se observa un ave en un sauce puntiseco del soto inundable, desde el que cazaba insectos (Jesús Serradilla Rodríguez).

Papamoscas cerrojillo*Ficedula hypoleuca*

Aletilla, Tanasio, Atletica



Población estival y nidificante escasa y localizada, con parejas dispersas repartidas por los valles del piedemonte serrano y sotos del valle. Como ave de paso es sin embargo frecuente, sobre todo a finales de verano, casi en cualquier localidad.

CI: Citas de interés.

2013

- Ampliación área de distribución. El 30.07 en El Viano, Haro (WN1014), se localizan varios ejemplares en un

recorrido por el sendero próximo al río Tirón. Uno de ellos cebaba a un joven con un gusano grande en la rama de un árbol (Eugenio Montelío Barrio y Jesús Serradilla Rodríguez).

2014

- Últimas observaciones. El 14.10 en el parque del Ebro, Logroño (WN4502) se observa un ave en un sauce puntiseco del soto inundable, desde el que cazaba insectos (Jesús Serradilla Rodríguez).

Numeroso como ave de paso en toda La Rioja, resultando mucho más escaso como nidificante cuando se distribuye, de forma dispersa, en bosques de montaña. En migración se le observa en cualquier localidad.


CI: Citas de interés.

2015

- Últimas observaciones. El 23.10 en el parque de La Ribera, Logroño (WN4602) se ve un ejemplar (Jesús Serradilla Rodríguez).

Bigotudo

Panurus biarmicus



Nidificante escaso y localizado en algunos humedales del valle del Ebro. Fuera de la época de reproducción se comporta como dispersivo, teniendo lugar escasísimas observaciones aisladas en otros humedales.

CI: Citas de interés.

2013

- Localidad de cría. El 26.04 en El Salobral, Pradejón (WM88), se ve un ave (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

- Localidad de cría. El 19.05 en El Salobral, Pradejón (WM88), se captura para anillamiento científico una pareja. La hembra mostraba placa incubatriz y el macho protuberancia cloacal desarrollada (Lidia Roncero, David Mazuelas, Jorge Ezquerro y Óscar Gutiérrez).

2014

- Localidad de cría. El 16.04 en El Salobral, Pradejón (WM88), se observa un macho en el carrizal (Ignacio Gámez Carmona y Sandra Vela Serrano).

2015



- Lugar no habitual. El 09.01 en San Martín de Berberana, Agoncillo (WM6397), se ve un ejemplar en vuelo seguramente procedente del carrizal que desaparece hacia el soto (Javier Robres Cabezón).

- Localidad de cría. El 18.04 en El Salobral, Pradejón (WM88), se localizan 3-4 parejas (Ignacio Gámez Carmona).

- Localidad de cría. El 18.04 en El Recuenco, Calahorra (WM8880), se ven 2 parejas, una de ellas construyendo un nido (Ignacio Gámez Carmona).



Mito común*Aegithalos caudatus*

Rabú, Rabudo



Nidificante no escaso en toda la región, tanto en la montaña como en el valle del Ebro, en cualquier zona arbolada con abundante sotobosque, siendo más frecuente en la mitad occidental y el sur. En invierno muchas aves se desplazan a los valles.

CI: Citas de interés.



Carbonero palustre*Poecile palustris*

Nidificante no numeroso distribuido por zonas forestales de la sierra, desde La Demanda a Enciso, con núcleos aislados en Sierra de Cantabria, Moncalvillo o el Hayedo de Poyales. Algunas aves descienden algo de altitud en invierno, no llegando normalmente al valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Herrerillo capuchino

Lophophanes cristatus





Población reducida, sólo localmente común, localizada en zonas forestales de la montaña riojana, faltando en el tercio oriental. Ocupa desde Obarenes y Toloño, hasta Sierra La Hez, Poyales y Alcarama. Puede descender de cota durante el invierno.

CI: Citas de interés.

Carbonero garrapinos

Periparus ater





Común en zonas boscosas, especialmente de coníferas, de toda la montaña riojana, así como pinares aislados de zonas bajas, faltando casi completamente en el valle del Ebro, donde sin embargo pueden observarse invernantes que descienden de altitud en esta época.

CI: Citas de interés.

Herrerillo común*Cyanistes caeruleus*

Coronilla





Nidificante numeroso en toda la región salvo en gran parte de la mitad oriental del valle del Ebro donde resulta escaso, faltando en las zonas áridas de esta zona y el sudeste. Resulta más numeroso en el oeste y en la media montaña, pudiendo observarse en invierno en cualquier localidad, descendiendo muchas aves a los valles.

CI: Citas de interés.

Carbonero común*Parus major*

Chichipán, Chichimbú





Común nidificante en toda la región, especialmente en la mitad occidental. Frecuenta cualquier zona arbolada.

CI: Citas de interés.

Trepador azul

Sitta europaea




Nidificante común en áreas forestales de montaña de toda La Rioja, desde La Demanda al Hayedo de Poyales, con núcleos más aislados en Obarenes y Sierra La Hez.

CI: Citas de interés.

Treparriscos

Tichodroma muraria



Invernante muy escaso, aunque regular, en La Rioja. Se observa acueñenciado en roquedos del piedemonte de la mayoría de los valles riojanos, tratándose de aves sin duda procedentes de las montañas cantábricas o pirenaicas.

CI: Todas las citas.

2013

- Especie escasa. El 20.02 en el barranco Macareno, Aguilar del Río Alhama (WM84), se localiza un ave (Ignacio Gámez Carmona).



2014

- Especie escasa. El 10.02 en el mirador de Viguera (WM38), se observa en dos ocasiones un ejemplar a lo largo de la mañana en dos lugares separados casi un km (Islallana) por lo que pudiera tratarse de 2 individuos diferentes (César M^a Aguilar Gómez).

2015



- Especie escasa. El 06.03 en el barranco Pozo Largo, Cervera del Río Alhama (WM84), se observa un macho en plumaje nupcial en los cortados (Javier Robres Cabezón).

- Especie escasa. El 01.11 en las peñas de Tobía, Tobía (WM1582), se ve un ave volando sobre el cortado (César M^a Aguilar Gómez).

Agateador euroasiático*Certhia familiaris*

Población reducida en altas zonas forestales de La Demanda, Urbión, Cebollera y alto Leza, habitando principalmente en umbrías de hayedos maduros.



CI: Citas de interés.

Agateador europeo*Certhia brachydactyla*

Nidificante en todas las zonas arboladas de la región, desde los sotos del Ebro a los hayedos de la sierra.

CI: Citas de interés.

Pájaro-moscón europeo



Remiz pendulinus

Población nidificante dispersa por tramos bajos de los principales ríos de La Rioja, sobre todo del Ebro. Asciede como reproductor hasta Nájera, Nalda, Murillo de Río Leza, Ventas Blancas, Arnedo, Aguilar del Río Alhama y Valdegutur. Algunas aves llegan como migrantes e invernantes.



CI: Citas de interés.

2014

- Recuperación ave anillada. El 21.04 en Anhalt-Bitterfeld (Alemania), se recupera un ave anillada en Alfaro (WM97) el 23.12.12 a 1.493 km de distancia y 484 días después (Lidia Roncero, David Mazuelas y Óscar Gutiérrez).

Oropéndola europea



Oriolus oriolus



Martín Toledo

Nidificante no escaso en sotos ribereños de toda La Rioja, con sólo parejas aisladas en bosques y otras zonas arboladas. En migración se la puede observar en hábitats poco favorables para la especie, como cultivos, matorrales, etc.

CI: Citas de interés.



2013

• Lugar no habitual. El 04 y el 26.06 en el barranco de La Canejada, Cervera del Río Alhama (WM85), se observan sendas aves (Jesús Ángel Ucha Turumbay).

2014

• Lugar no habitual. El 11.07 en El Aprisco, Santo Domingo de la Calzada (WN0400), se encuentra un macho adulto atropellado (Javier Robres Cabezón).



Alcaudón dorsirrojo

Lanius collurio

Se distribuye como nidificante por toda la montaña riojana, habitando zonas abiertas con abundante matorral espinoso y arbolado disperso, resultando más frecuente en el tercio occidental; parejas aisladas en el piedemonte. En migración no pocas aves se observan en el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

Alcaudón real



CI: Citas de interés.



Lanius meridionalis

Picapuelco Guión

Especie con fuerte regresión demográfica en los últimos años, con parejas aisladas que se reproducen especialmente en el valle del Ebro, principalmente en la mitad oriental. Frecuenta zonas cultivadas con ribazos o laderas de matorral y arbolado disperso. Algunos ejemplares, seguramente procedentes de regiones cercanas, pueden observarse en migración y durante el invierno.

Alcaudón común

Lanius senator



almendros de una pieza abandonada (Jesús Serradilla Rodríguez).

Picapuelco


Población dispersa por todo el valle del Ebro y media montaña riojana, abundando más en la mitad oriental. Se comporta como estival y frecuenta zonas cultivadas arboladas, laderas de matorral alto, carrascales y tamarizales.

CI: Citas de interés.

2015

- Lugar no habitual. El 06.06 en Badarán (WM1789), se ve un macho volando que se posa en uno de los

Arrendajo euroasiático



Garrulus glandarius

Reproductor bastante común en zonas forestales de montaña de toda La Rioja, con núcleos aislados en bosques de zonas más bajas.

Citas de interés.

Rabilargo ibérico



Cyanopica cookii

Presencia ocasional de ejemplares procedentes de regiones cercanas.

CI: Todas las citas.

Urraca común*Pica pica*

Picaraza



Especie ampliamente distribuida sobre todo en el valle del Ebro, faltando sólo en zonas forestales de montaña. Su población, anteriormente numerosa, ha sufrido un acusado declive en los últimos años en las zonas rurales.

CI: Citas de interés.

Chova piquigualda*Pyrrhocorax graculus*

Únicas citas:

1. Un ave el 25.03.79 en Torrecilla en Cameros. José M^a González Perujo (González, 1996).
2. Un ejemplar el 01.05.80 en Trevijano. Fco. Javier Nalda y Jesús Vicente Nalda (Gámez *et al.*, 2002).
3. Un ave el 09.03.95 en Viguera. José M^a González Perujo (González, 1996).
4. Dos ejemplares el 24.03.01 en los corrales de Valdegutur, Cervera del Río Alhama. Javier Larumbe (Gámez *et al.*, 2003).


CI: Todas las citas.

2013

- Rareza. El 21.04 en Torrecilla de Cameros (WM37), se observan 2 ejemplares en vuelo mientras emiten su característico reclamo (Lidia Roncero y Lorena Mompel).

Chova piquirroja

Pyrhocorax pyrrhocorax



Población nidificante no numerosa dispersa por cortados rocosos de toda La Rioja, con parejas también, cada vez más escasas, en corrales abandonados y ruinas de la mitad oriental del valle del Ebro y del sudeste. Durante el invierno, buena parte de las aves se reúnen en bandos y pasan esta época en localidades favorables del valle, a donde pueden llegar individuos procedentes de regiones cercanas.


CI: Concentraciones numerosas (> 80) y otras citas de interés.

2013

- Concentración numerosa. El 31.01 en la laguna de Hervías (WN1100), se ve un bando de 204 aves (Ignacio Gámez Carmona).
- Concentración numerosa. El 23 y 24.02 en Cantamilanos, Murillo de Río Leza (WM5294), se cuentan 270 ejemplares en una pseudoestepa con cereal y regadío (Ignacio Gámez Carmona).

Grajilla occidental

Corvus monedula



Especie escasa en todo el valle del Ebro que prácticamente ha desaparecido de su mitad occidental. Se distribuye por zonas cultivadas, extensas áreas desarboladas y las localidades más áridas. Algunos ejemplares se observan en migración y se desconoce si nos visitan invernantes.

CI: Citas de interés.

Graja

Corvus frugilegus

Especie desaparecida recientemente de la que no existen citas desde el invierno 2010-11 a pasar de haberla buscado insistentemente. Invernaba de


forma regular en La Rioja hasta finales del s. XX, reduciéndose la población desde unas 600 aves en 1998 hasta los últimos 3 ó 4 ejemplares en el invierno de 2010-11. Su área de distribución comprendía parte de los términos municipales de Cuzcurrita de Río Tirón, Tirgo, Casalarreina, Cihuri, Anguciana, Haro, Gimileo y Briones. Esta área quedó reducida en 2010-11 a solo unas pocas fincas de Casalarreina.

CI: Todas las citas.

Corneja negra

Corvus corone

Grajo





Nidificante común por toda la región, sobre todo en bosques y zonas cultivadas del valle del Ebro o cerca del mismo.

CI: Citas de interés.

Cuervo grande

Corvus corax





Nidificante en zonas apropiadas de toda La Rioja, principalmente en zonas rocosas de media y alta montaña, con parejas más dispersas en cortados fluviales, bosques y zonas cultivadas, nidificando no sólo en roquedos, sino también en grandes árboles, postes eléctricos, ruinas, etc.

CI: Citas de interés.

Estornino negro

Sturnus unicolor

Tordo





Población indígena abundante en cualquier zona habitada y cultivada de La Rioja, así como en sotos del Ebro.

CI: Citas de interés.

Estornino pinto


Sturnus vulgaris

Tordo Francés



Abundante durante el invierno y en migración en cualquier lugar del valle del Ebro. Existen contadas citas de reproducción en algunos sotos del río Ebro a principios de los 90 que no han vuelto a confirmarse.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

Gorrión común*Passer domesticus*

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Población abundante por todas las zonas habitadas y cultivadas de La Rioja.

CI: Citas de interés.

Gorrión moruno*Passer hispaniolensis*

Únicas citas:

1. Un macho adulto en julio y agosto de 2010 en Villarroya. Ignacio Gámez Carmona y Jesús Ángel Ucha Turumbay (Gámez *et al.*, 2013).

2. Un macho el 12.03.12 en Pradoviejo, Logroño. Eduardo Molina Carazo (Gámez *et al.*, 2013).

3. Un macho durante el mes de junio de 2012 en Villarroya. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2013).

4. Otro macho el 22.10.12 en el soto Doria, Rincón de Soto. Jesús Ángel Ucha Turumbay (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.



2014

- Rariza. El 10.05 en la balsa de Villarroya (WM7764), se observa un macho bebiendo (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

Gorrión molinero

Passer montanus

Molinero





Nidificante disperso por todo el valle del Ebro y el sureste de la región.

CI: Citas de interés.

Gorrión chillón

Petronia petronia

Paire, Chiri



Nidificante disperso por toda la región, sobre todo en el valle del Ebro y la mitad oriental, faltando sólo en zonas forestales. Frecuenta cortados y taludes terrosos, ruinas y corrales en el campo, eriales, laderas áridas, pedregales, etc.

CI: Citas de interés.

Gorrión alpino

Montifringilla nivalis

Únicas citas:

1. 3 ejemplares el 15.11.06 cerca de la laguna de Urbión, Viniegra de Arriba. Alejandro Onrubia (Gámez *et al.*, 2010).



2. Seis aves el 15.02.12 en las Peñas de Herce. Javier Robres Cabezón (Gámez *et al.*, 2013).

CI: Todas las citas.

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

Limarzuelo, nevero




Resulta sobre todo abundante en migración e invierno en cualquier localidad, pero además existe una importante población nidificante distribuida por zonas arboladas de toda La Rioja, faltando sólo en las más áridas y desarboladas del este.

CI: Citas de interés.

Pinzón real

Fringilla montifringilla





Invernante regular generalmente escaso, aunque algunos inviernos puede llegar a ser relativamente frecuente.

CI: Concentraciones numerosas (> 50) y otras citas de interés.

Serín verdecillo

Serinus serinus

Zirri-zirri, verdecilla





Reproductor numeroso por toda La Rioja, sobre todo en el valle del Ebro, llegando aquí también migrantes e invernantes.

CI: Citas de interés.

Verderón común

Chloris chloris

Verde, verdón





Reproductor por toda la región, con llegada también de migrantes e invernantes al valle del Ebro. Frecuenta cualquier tipo de arboleda cercana a zonas cultivadas.

CI: Citas de interés.

Verderón serrano

Carduelis citrinella



Población reproductora fluctuante, no escasa en pinares de montaña, desde La Demanda al Hayedo de Poyales. La mayoría de ejemplares, si no todos, desaparecen durante el invierno.

CI: Citas invernales y otras citas de interés.



2013

- Localidad no habitual. El 20.06 en Escurrello, Herce (WM6578), se observa un grupo de 5 ejemplares alimentándose en el suelo en un claro de un pinar de repoblación (*Pinus sylvestris*). En una zona próxima se detecta a otros 3 individuos en un ambiente similar (Eugenio Montelío Barrio).

Jilguero europeo

Carduelis carduelis

Cardelina, Golorito




Nidificante por toda La Rioja, muchas aves llegan también en migración e invierno.

CI: Citas de interés.

Jilguero lúgano

Carduelis spinus

Lucano, Luere, Tarín





Invernante y migrante común en zonas arboladas de toda la región, sobre todo del valle del Ebro, con preferencias por sotos ribereños. Aisladas parejas se reproducen de modo irregular en pinares de montaña.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

Pardillo común

Carduelis cannabina

Cañamero





Nidificante numeroso por toda la región, sobre todo en la mitad oriental, escaseando en el cuadrante sudoeste. Llegan muchos migrantes e invernantes. Durante la nidificación frecuenta linderos de campos cultivados, viñedos, laderas de matorral, eriales, etc., extendiéndose a rastrojos y otras zonas abiertas en invierno.

CI: Citas de interés.



Piquituerto común

Loxia curvirostra




Población reproductora fluctuante, generalmente distribuida por pinares de montaña en La Demanda, Urbión, Cebollera y Cameros y ya de forma aislada en pinares de zonas bajas, incluso en el extremo sudeste y valle del Ebro, extremo éste variable según los años.

CI: Citas de interés.

Camachuelo común*Pyrrhula pyrrhula*

Nidificante no escaso pero disperso por zonas forestales de montaña desde La Demanda a las áreas boscosas y más altas de Cornago, con núcleos aislados en Obarenes y Sierra La Hez. En invierno algunas aves descienden de altitud.

CI: Citas de interés.

Picogordo común*Coccothraustes coccothraustes*

Escaso en migración e invierno en sotos y arboledas del valle del Ebro, algo más común en bosques de montaña, siendo raras las observaciones en época de reproducción. Algunos inviernos se producen irrupciones de numerosos ejemplares.

CI: Citas de nidificación y otras citas de interés.

2013

- Concentración numerosa. El 11.01 junto a la ermita de Lomos de Orio, Villoslada de Cameros (WM25), se localiza un bando de más de 60 ejemplares alimentándose en el suelo. El 03.03 se observan 32 aves en el mismo lugar (Lidia Roncero, David Mazuelas y Óscar Gutiérrez).

2014

- Especie escasa. El 02.05 en Canto Hincado, Ortigosa (WM26), se ve un adulto (Ignacio Gámez Carmona).

2015

- Especie escasa. El 24.07 en Canto Hincado, Ortigosa (WM26), se ven 2 aves en un pinar (Ignacio Gámez Carmona, Javier Robres Cabezón y Sandra Vela Serrano).

Escribano nival

Plectrophenax nivalis

Únicas citas:



1. Un macho y una hembra el 07.01.02 en el monte Cantabria, Logroño. Jesús Vicente Nalda Sáenz-Torre (Gámez *et al.*, 2003).

2. Un macho el 31.12.06 en el Puerto de Montenegro, Viniegra de Arriba (WM16). Ivana Lasheras Llorente.

CI: Todas las citas.

Escribano cerillo

Emberiza citrinella





Nidificante disperso por toda la montaña riojana, faltando en el sudeste. Localizado en pastizales arbustivos con arbolado disperso de la mitad occidental serrana, también en linderos entre cultivos herbáceos. En invierno se puede observar en zonas más bajas.

CI: Citas de interés.

Escribano soteño

Emberiza cirulus

Chirlón





Presente como nidificante en toda la región, faltando en las cimas montañosas, en extensas zonas forestales y en áreas más áridas. Algunos individuos llegan a invernar al valle del Ebro.

CI: Citas de interés.



Escribano montesino*Emberiza cia*

Ulaquera, Nevero



Nidificante disperso por toda la región, a excepción del valle del Ebro, rehuyendo las extensas áreas forestales. En invierno muchas aves descienden de altitud y se ven en cultivos del valle.

CI: Citas de interés.

Escribano hortelano*Emberiza hortulana*

Nidificante escaso y localizado por zonas de valle del Ebro y media montaña de La Rioja. Se comporta como estival, observándose pocos migrantes. Habita laderas con matorral y arbustos dispersos, cultivos abandonados en pendiente, bordes de viñas, etc.


CI: Citas de interés.

Escribano palustre*Emberiza schoeniclus*

Invernante y migrante no escaso en el valle del Ebro, sobre todo cerca de zonas húmedas donde localmente puede abundar. Parejas aisladas se reproducían de forma irregular en el embalse de La Grajera de Logroño, lo cual ahora parece ya bastante improbable. Los ejemplares reproductores del valle del Ebro se adscriben a la subespecie iberoriental (*E. s. witherbyi*) y los invernantes a la nominal (*E. s. schoeniclus*).

CI: Citas en el periodo reproductor y otras citas de interés.

Escribano triguero



Emberiza calandra

Nidifica por zonas cultivadas de toda la región, abundando especialmente en el valle del Ebro.

CI: Citas de interés.

6. ESPECIES EXÓTICAS

Cisne negro

Cygnus atratus

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un ejemplar el 26.04.01 volando sobre el polígono "La Portalada", Logroño. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2003).

2. Un adulto el 01.01.02 en el embalse de La Grajera, Logroño. Pedro M^a López Lázaro y Jesús Serradilla Rodríguez (Gámez *et al.*, 2003).

3. Un adulto el 22.11.02, también en La Grajera, Logroño. Fco. Javier Nalda Sáenz-Torre (Gámez *et al.*, 2003).

4. Otro adulto el 20 y 21.03.03 en la laguna de Cihuri, Cihuri. Ignacio Gámez, Jorge Marzo y José A. Izquierdo (Gámez *et al.*, 2003).

2015

• Escape de cautividad. El 08.08 procedente de El Villar de Arnedo (WM78), ingresa un ejemplar joven en el CRFS de "La Fombera" (Ignacio Gámez Carmona).

Ganso del Nilo

Alopochen aegyptiacus

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un ave el 04.03.07 procedente de Autol ingresa en el CRFS de "La

Fombera". Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

2. Un ejemplar el 18.03.11 en la balsa de Piarrejas y el embalse de Mansilla, Mansilla de la Sierra. Juan José Molina Pérez (Gámez *et al.*, 2013).

Pato acollarado

Callonetta leucophrys

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Una hembra, al menos desde diciembre de 1994 a diciembre de 1997, en el río Ebro en Logroño. Ignacio Gámez (Gámez *et al.*, 1999).

2. Una hembra el 17.01.98 en la represa del Puente de Piedra de Logroño. Ignacio Gámez Carmona. Seguramente el mismo ejemplar citado anteriormente (Gámez *et al.*, 2002).

Pato joyuyo

Aix sponsa

Escape de cautividad. Primeras citas para La Rioja:

2013-14

- Escape de cautividad procedente probablemente de la colección de aves del Ayuntamiento de Logroño en los parques del Carmen y de La Ribera. El 28.11 bajo el puente de Piedra, Logroño (WN4502), se posa una hembra en el río Ebro junto a los azulones (Daniel Mógica Sánchez).

2014

- Escape de cautividad. El 17.03 en el estanque de La Fombera, Logroño (WN4801), se ve un macho (Ángel García).

Ánade picopinto

Anas poecilorhyncha

Escape de cautividad. Primera cita para La Rioja:

2013

- Escape de cautividad. El 20.05 en Zaco, Haro (WN12), se observa un ejemplar junto a otro con caracteres intermedios de *Anas platyrhynchos* (José María Fernández García y Nerea Ruiz de Azúa).

Ánade gargantillo

Anas bahamensis

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un adulto el 21.10.2003 en el soto de El Estajao, Alfaro. Ignacio Gámez

Carmona (Gámez *et al.*, 2003).


2. Diversas observaciones de un adulto, posiblemente el mismo ejemplar, entre el 24.11.04 y el 14.04.07 en el río Ebro y en La Grajera, Logroño. Jesús Serradilla y otros (Gámez *et al.*, 2010).

Codorniz japonesa

Coturnix japonica

Ejemplares de esta especie se liberan frecuentemente con fines cinegéticos en los cotos de caza del valle del Ebro, sin que lleguen a reproducirse ni a formar poblaciones estables.

Faisán vulgar



Phasianus colchicus

Introducido frecuentemente en cotos de caza de toda la región, especialmente del valle del Ebro, sin que en general lleguen a sobrevivir en libertad y a establecerse, salvo raros individuos que ocasionalmente pueden llegar a reproducirse de forma aislada.

Pelícano común

Pelecanus onocrotalus

Escape de cautividad. Única cita:

1. Un ave entre el 04.06 y el 01.08.91 aparece con frecuencia en la colonia de cigüeñas de la iglesia de S. Miguel de Alfaro (González, 1996).

Pelícano rosado

Pelecanus rufescens

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un ave el 09.10.90 en Murillo de Río Leza. Posteriormente el 14.10.90 se ve otra, posiblemente la misma, en el Soto de los Americanos de Logroño. Ignacio Gámez Carmona (Gámez, 1993d).

2. Un ejemplar el 15.07.04 en La Fombera, Logroño. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

Flamenco chileno

Phoenicopterus chilensis

Escape de cautividad. Primera cita para La Rioja:

2014-15

- Escape de cautividad. Entre el 29.12 y el 25.01 en La Grajera, Logroño (WM4099), permanece un ejemplar joven. El ave fue anillada el 21.07.14 en Zwillbrocker Venn Nature Reserve, Alemania, donde hay una población cautiva que puede dar lugar a escapes. Parece que llegó con un bando de flamencos y se quedó (Carlos Gutiérrez, Ricardo Zaldivár, Óscar Gutierrez, Javier Robres, Ignacio Gámez, Fco. Javier Nalda, Jesús Serradilla e Itziar Gutiérrez).

Busardo mixto

Parabuteo unicinctus

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un ave el 04.03.07 procedente de La Tapiada, Lardero, ingresa en el CRFS de "La Fombera". Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

2. Un macho adulto el 07.06.11 en La Somante, Navarrete. Ignacio Gámez Carmona y Sandra Vela Serrano (Gámez *et al.*, 2013).

2013

- Escape de cautividad. El 14.09 procedente del camino de la Harinera, Logroño (WN40), ingresa un ejemplar en el CRFS de "La Fombera" (Ignacio Gámez Carmona).

- Escape de cautividad. El 13.10 en el soto inundable del Ebro, Logroño (WN4502), se ve un ejemplar sin pigüelas alimentándose sólo (tiene el buche lleno). Lleva unos diez días por la zona (Ignacio Gámez, Javier Robres y Sandra Vela).

2015

- Escape de cautividad. El 14.11 procedente de Castañares de Rioja (WN00) ingresa un ejemplar adulto en el CRFS de "La Fombera" (Ignacio Gámez Carmona).

Busardo de cola roja

Buteo jamaicensis

Escape de cautividad. Única cita:

1. Un ejemplar el 13.09.06 procedente de La Torrecilla, Calahorra, ingre-

sa en el CRFS de “La Fombera”, Logroño. Fco. Javier Ochoa González (Gámez *et al.*, 2010).

Halcón reidor

Herpetotheres cachinnans

Especie neotropical escapada de cautividad. Única cita:

1. Un adulto el 23.05.97 en Valdeviquera, Agoncillo. Jesús Vicente Nalda Sáenz-Torre y Agustín Nalda Sáenz-Torre (Gámez *et al.*, 1999).

Tórtola rosigrís

Streptopelia risoria

Algunas pocas observaciones, siempre en la ciudad y alrededores de Logroño, de aves de la forma doméstica, sin duda escapadas de cautividad.

2013

• Escape de cautividad. El 11.10 en Alberite (WM4896), se observa un ejemplar posado en un cable entre 40-50 tórtolas turcas (Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón).

Cacatúa blanca

Cacatua alba

Escape de cautividad. Única cita:

1. Un ejemplar el 12.02.05, procedente del casco urbano de Logroño, ingresa en el CRFS de “La Fombera”. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

Cacatúa ninfa

Nymphicus hollandicus

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un macho el 30.08.06 en el parque de La Ribera, Logroño. Pedro M^a López Lázaro (Gámez *et al.*, 2010).

2. Un macho anillado entre el 22.09 y el 20.10.09 por el parque del Ebro y La Concordia, Logroño. Jesús Serradilla Rodríguez (Gámez *et al.*, 2013).

3. Un ejemplar el 20.09.11, procedente de Villamediana de Iregua, ingresa en el CRFS de “La Fombera”. Dirección General de Medio Natural La Rioja (Gámez *et al.*, 2013).

2014

• Escape de cautividad. El 04.08, procedente del casco urbano de Logro-

ño (WN40), ingresa una hembra adulta en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).

2015

- Escape de cautividad. El 22.02 procedente del casco urbano de Logroño (WN40), ingresa un ejemplar adulto en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).

- Escape de cautividad. El 18.11 procedente del casco urbano de Logroño (WN40), ingresa un ejemplar adulto en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).

Perico dorsirrojo

Psephotus haematonotus

Escape de cautividad. Única cita:

1. Un macho el 08.05.06 en el parque del Ebro, Logroño. Pedro M^a López Lázaro (Gámez *et al.*, 2010).

Periquito común

Melopsittacus undulatus

Ocasionalmente se observan ejemplares aislados, recientemente escapados de cautividad, sin que lleguen a establecerse.

Cotorra de Kramer

Psittacula krameri

Especie escapada de cautividad con un intento de reproducción conocido en Logroño en 2.001.

2015

- Escape de cautividad. El 01.06 procedente de Villamediana de Iregua (WM49), ingresa una hembra adulta en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).

Inseparable de Namibia

Agapornis roseicollis

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un ejemplar el 13.08.11 en el CRFS de “La Fombera”, Logroño. Ignacio Gámez Carmona y Javier Robres Cabezón (Gámez *et al.*, 2013).

2. Un ave el 10.10.11, procedente de Logroño, ingresa en el CRFS de “La

Fombera”. Dirección General de Medio Natural La Rioja (Gámez *et al.*, 2013).

Inseparable de Fischer

Agapornis fischeri

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un adulto el 19.03.01 en la calle Manzanera, Logroño. Pedro M^a López Lázaro (Gámez *et al.*, 2003).

2. Dos aves el 17.02.02 en el Parque del Cidacos, Calahorra. Agustina del Fresno Moreno (Gámez *et al.*, 2003).

3. Un ejemplar el 15.10.04, recogido en Lardero, ingresa en el CRFS de “La Fombera”. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2013).

2015

• Escape de cautividad. El 28.06 procedente de Las Norias, Logroño (WN4402), ingresa un ejemplar en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).

Lorito senegalés

Poicephalus senegallus

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un ave el 10 y 12.10.04 en los árboles de La Fombera, Logroño. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

2. Otro ejemplar el 16 y 20.05.07 en La Fombera, Logroño. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

Guacamayo azulamarillo

Ara ararauna

Escape de cautividad. Única cita:

1. Un ave el 04.03.06, procedente de Logroño, ingresa en el CRFS de “La Fombera”. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

Aratinga ñanday

Nandayus nenday

Ocasionales observaciones de aves escapadas de cautividad.

Loro barranquero

Cyanoliseus patagonus

Escape de cautividad. Única cita:

1. Un ejemplar el 27.04.08, procedente de Lardero, ingresa en el CRFS de “La Fombera”. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

2013

- Escape de cautividad. El 26.06 procedente del complejo deportivo de Cantabria, Logroño (WN40), ingresa un ejemplar adulto en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).

Cotorra argentina

Myiopsitta monachus

Especie escapada de cautividad de la que se conoce un intento de reproducción en los años 90.

2015

- Escape de cautividad. El 06.06 procedente del paraje El Campillo, Logroño (WN40), ingresa un ave en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).

Amazona harinosa

Amazona farinosa

Escape de cautividad. Única cita:

1. Un ejemplar el 19.06.07, procedente de Haro, ingresa en el CRFS de “La Fombera”. Ignacio Gámez Carmona (Gámez *et al.*, 2010).

Miná del Himalaya

Gracula religiosa

Escape de cautividad. Única cita:

1. Un adulto el 19.12.00 en Logroño. Jesús Vicente Nalda Sáenz-Torre. (Gámez *et al.*, 2002).

Gorrión de Java

Padda oryzivora

Escape de cautividad. Primera cita para La Rioja:

2014

- Escape de cautividad. El 27.07 procedente del casco urbano de Logroño (WN40), ingresa un ejemplar en el CRFS de “La Fombera” (Ignacio Gámez Carmona).

Diamante moteado de Australia

Taenopygia guttata

Escape de cautividad. Únicas citas:

1. Un ejemplar con anilla de cautividad el 04.06.98 en Huércanos. Luis Lopo Carramiñana. (Gámez *et al.*, 2002).
2. Un ave el 17.03.02 en Calahorra. Jesús Ángel Ucha, Alba Ucha y Agustina del Fresno (Gámez *et al.*, 2003).

Canario común

Serinus canaria

Ejemplares escapados de cautividad se observan ocasionalmente sin que lleguen a establecerse con éxito.

7. BIBLIOGRAFÍA

- ASTRAIN, C., BARBERÍA, M. y MUNILLA, A. (1990). Charrán ártico *Sterna paradisaea*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 37 (2), 341. SEO. Madrid.
- CALVO, J.M. y SERRADILLA, J. (1996). Avifauna de la laguna de Hervías (La Rioja), durante un periodo anual completo. *Zubía*, 14, 23-35. IER. Logroño.
- CAMIÑA, A. (1989). Águila imperial ibérica *Aquila adalberti*. Noticiario ornitológico. *Ardeola*, 36 (2), 243. SEO. Madrid.
- CEÑA, J. C. (1997). Pechiazul *Luscinia svecica*. Noticiario ornitológico. *Ardeola*. (44-2), 258. SEO. Madrid.
- DOMINGO, M. N. y NALDA, J. V. (1987). Alondra rícolí *Chersophilus duponti*. Noticiario Ornitológico *Ardeola*, 34 (2), 288. SEO. Madrid.
- GÁMEZ, I. (1990). Falaropo picogruoso *Phalaropus fulicarius*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40 (1), 339. SEO. Madrid.
- GÁMEZ, I. (1993) a. Flamenco común *Phoenicopterus ruber*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40 (1), 89. SEO. Madrid.
- GÁMEZ, I. (1993) b. Vuelvepiedras común *Arenaria interpres*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40 (1), 96. SEO. Madrid.
- GÁMEZ, I. (1993) c. Charrancito común *Sterna albifrons*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40 (1), 98. SEO. Madrid.
- GÁMEZ, I. (1993) d. Pelicano rosado *Pelecanus rufescens*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 40 (2), 181. SEO. Madrid.

- GÁMEZ, I. (2004). *Seguimiento de la población de Cernícalo Primilla Falco naumanni en La Rioja*. Informe Interno. Gobierno de La Rioja.
- GÁMEZ, I., AGUILAR, C. M^a., GUTIÉRREZ, C., LOPO, L. y SERRADILLA, J. (eds.), (1999). *Anuario Ornitológico de La Rioja. 1993-1997*. Ecologistas en Acción de La Rioja. 141 pp.
- GÁMEZ, I., AGUILAR, C. M^a., GUTIÉRREZ, C., LOPO, L. y SERRADILLA, J. (eds.), (2002). Anuario Ornitológico de La Rioja.1998-2000. *Zubía*, 20, 9-119. IER. Logroño.
- GÁMEZ, I., GONZÁLEZ, D., ONRUBIA, A. y otros. (2003). Zampullín picogruoso *Podilymbus podiceps*. Observación de aves raras en España. *Ardeola*, 50 (1), 125. SEO. Madrid.
- GÁMEZ, I. y LOPO, L. (1997). Págalo rabero *Stercorarius longicaudus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 44 (1), 131. SEO. Madrid.
- GÁMEZ, I., SERRADILLA, J., AGUILAR, C. M^a., ROBRES, F. J. y LOPO, L. (eds.), (2003). Anuario Ornitológico de La Rioja. 2001-2003. *Zubía Monográfico*, 15, 9-139. IER. Logroño.
- GÁMEZ, I., SERRADILLA, J., AGUILAR, C. M^a., ROBRES, F. J. y GUTIÉRREZ, O. (eds.), (2010). Anuario Ornitológico de La Rioja. 2004-2008. *Zubía Monográfico*, 21-22, 7-184. IER. Logroño.
- GÁMEZ, I., SERRADILLA, J., AGUILAR, C. M^a., ROBRES, F. J. y GUTIÉRREZ, O. (eds.), (2013). Anuario Ornitológico de La Rioja. 2009-2012. *Zubía*, 31, 7-198. IER. Logroño.
- GÓMEZ, J. L., RUIZOLALLA, J., NALDA, J. V. y NALDA, F. J. (1987). Porrón osculado *Bucephala clangula*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 34 (2), 279. SEO. Madrid.
- GONZÁLEZ, J. M. (1996). *Aves no reproductoras*. En CEÑA, A., CEÑA, J. C. y MOYA, I. *Fauna de La Rioja*. Fundación Caja de Ahorros de La Rioja. 1-245.
- GUTIÉRREZ, R., DE JUANA, E. y LORENZO, J. A. (2012). *Lista de las aves de España. Versión online 1.0: nombres castellano, científico e inglés*. SEO/BirdLife.
- LASHERAS, I. y GONZÁLEZ, C. (2007). Colimbo grande *Gavia immer*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 54 (1), 171. SEO. Madrid.
- LÓPEZ, P.M., SERRADILLA, J., RUIZ, F. y ALDONZA, M. (2004). Gaviota cana *Larus canus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola* 51 (1), 251. SEO. Madrid.
- LOPO, L., NALDA, F. J. (1981). Carricerín cejudo *Acrocephalus paludicola*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 28, 163. SEO. Madrid.
- MARTÍ, R. y DEL MORAL, J. C. (Eds.). (2003). *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. D. G. Conservación de la Naturaleza-SEO. Madrid.
- NALDA, J. V. (1982). Busardo calzado *Buteo lagopus*. Noticiario Ornitológico.

Ardeola. (29), 181. SEO. Madrid.

SERRADILLA, J. (2004). Vencejo pálido *Apus pallidus*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 51 (2), 554. SEO. Madrid.

SERRADILLA, J. (2007) a. Aguja colipinta *Limosa lapponica*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 54 (2), 397. SEO. Madrid.

SERRADILLA, J (2007) b. Vuelvepiedras común *Arenaria interpres*. Noticiario Ornitológico. *Ardeola* 54 (2), 398. SEO. Madrid.



01. Calamón común (*Porphyrio porphyrio*). Primera cita de reproducción para La Rioja, en la laguna de El Recuenco de Calahorra, en la primavera de 2014. Foto: Ignacio Gámez



02. Zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis*). En el año 2015 se comprueba la reproducción de esta especie en la laguna de Hervías. Foto: Ignacio Gámez



03. Barnacla canadiense grande (*Branta canadensis*). Se confirma en 2013 la reproducción de una pareja que saca adelante 5 pollos, en los sotos de La Nava, Alfaro. Foto: Ignacio Gámez



04. Gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*). Nueva cita para esta escasa especie en La Rioja. Ejemplar bebiendo agua en la balsa de Villarroya. Foto: Javier Robres



05. Aguja colipinta (*Limosa lapponica*). Se producen numerosas observaciones de este escaso migrante durante los años 2013 y 2014, del que previamente sólo se tenía registrada una cita. Foto: Ignacio Gámez



06. Joven de Flamenco chileno (*Phoenicopterus chilensis*). Entre el 29-12-2014 y el 20-01-2015 permanece en La Grajera (Logroño) un ejemplar joven de esta especie exótica, procedente de una colección asilvestrada de Alemania. Foto: Javier Robres.



07. Págallo grande (*Stercorarius skua*). Primera cita para La Rioja de esta ave marina que ingresó en el CRFS "La Fombera" el 20-01-2015, recogida en estado de desnutrición en Rincón de Soto. Se recuperó y fue liberada. Foto: Javier Robres



08. Avión común (*Delichon urbica*). Gran concentración de unas 12.000 aves el 25-08-2013 en los cortados fluviales de Alcanadre. Foto: Ignacio Gámez



09. Garceta dimorfa (*Egretta gularis*). Segunda cita para La Rioja de un ejemplar observado en el pantano de Mansilla. Foto: Ivana Las Heras

10. Macho joven de bigotudo (*Panurus biarmicus*). Se comprueba la reproducción de esta especie en El Salobral de Pradejón y El Recuenco de Calahorra. Foto: Ignacio Gámez



11. Busardo moro (*Buteo rufinus*). Primeras dos citas de esta rapaz para La Rioja: El 27-08-2013 en Herramélluri y el 19-11-2015 en Cuzcurrita de Río Tirón. Foto: Roberto Herrero.



12. Barnacla cariblanca (*Branta leucopsis*). Se observan 5 ejemplares el 02 y 04 de marzo de 2015 en Murillo de Río Leza. Foto: Ignacio Gámez.



13. Joven de elanio común (*Elanus caeruleus*). Rapaz escasa en La Rioja, con reproducciones esporádicas. Foto: Ignacio Gámez



14. Macho de porrón pardo (*Aythya nyroca*). Dos nuevas citas para La Rioja de esta escasa anátida. Foto: Ignacio Gámez



15. Tarro canelo (*Tadorna ferruginea*). Nueva cita para esta especie en los sotos de Alfaro. Foto: Ignacio Gámez



16. Avutarda común (*Otis tarda*). Nuevas observaciones para La Rioja de esta escasa ave. Foto: Ignacio gámez



17. Cisne vulgar (*Cignus olor*). Tres aves fotografiadas en la Laguna Mateo de San Asensio. Foto: Ignacio Gámez



18. Golondrina dáurica (*Cecropis daurica*). Ejemplar observado en la Laguna de Hervías. Foto: Javier Robres



19. Treparriscos (*Tichodroma muraria*). Nuevas citas en el presente anuario para este escaso aunque regular invernante. Foto: Javier Robres

SERRADILLA, J. y LÓPEZ, P.M. (2006). Falaropo picogrueso <i>Phalaropus fulicarius</i> . Noticiario Ornitológico. Ardeola 53 (1), 203. SEO. Madrid.	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	115
	<i>Acrocephalus paludicola</i>	114
	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	114
	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	115
	<i>Actitis hypoleucos</i>	68

8. ÍNDICE

A		<i>Aegithalos caudatus</i>	125
		<i>Aegyptius monachus</i>	42
Abejaruco europeo	89	Agachadiza chica	66
Abejero europeo	36	Agachadiza común	66
Abubilla	90	<i>Agapornis fischeri</i>	152
<i>Accipiter gentilis</i>	45	<i>Agapornis roseicollis</i>	151
<i>Accipiter nisus</i>	46	Agateador euroasiático	129
Acentor alpino	105	Agateador europeo	129
Acentor común	104	Águila calzada	48

Águila imperial ibérica	47	<i>Anas acuta</i>	20
Águila moteada	7, 47	<i>Anas bahamensis</i>	147
Águila perdicera	49	<i>Anas clypeata</i>	7, 9, 21
Águila pescadora	49	<i>Anas crecca</i>	19
Águila real	48	<i>Anas penelope</i>	18
Aguilucho cenizo	45	<i>Anas platyrhynchos</i>	20
Aguilucho lagunero		<i>Anas poecilorhyncha</i>	7, 8, 147
occidental	44	<i>Anas querquedula</i>	20
Aguilucho pálido	44	<i>Anas strepera</i>	7, 9, 19
Aguilucho papialbo	7, 44	Andarríos bastardo	70
Aguja colinegra	7, 67	Andarríos chico	68
Aguja colipinta	8, 67, 158	Andarríos grande	68
<i>Aix galericulata</i>	18	Ánsar campestre	16
<i>Aix sponsa</i>	7, 8, 147	Ánsar careto	16
<i>Alauda arvensis</i>	96	Ánsar común	16
Alcaraván común	59	<i>Anser albifrons</i>	16
Alcaudón común	132	<i>Anser anser</i>	16
Alcaudón dorsirrojo	131	<i>Anser fabalis</i>	16
Alcaudón real	131	<i>Anthus campestris</i>	100
<i>Alcedo atthis</i>	89	<i>Anthus cervinus</i>	101
Alcotán europeo	51	<i>Anthus pratensis</i>	100
<i>Alectoris rufa</i>	24	<i>Anthus spinoletta</i>	101
Alimoche común	41	<i>Anthus trivialis</i>	100
Alondra común	96	<i>Apus apus</i>	87
Alondra cornuda	96	<i>Apus melba</i>	88
Alondra ricotí	93	<i>Apus pallidus</i>	87
Alondra totovía	96	<i>Aquila adalberti</i>	47
<i>Alopochen aegyptiacus</i>	146	<i>Aquila clanga</i>	7, 47
<i>Amazona farinosa</i>	153	<i>Aquila chrysaetos</i>	48
Amazona harinosa	153	<i>Aquila fasciata</i>	49
Ánade azulón	20	<i>Aquila pennata</i>	48
Ánade friso	7, 19	<i>Ara ararauna</i>	152
Ánade gargantillo	147	Aratinga ñanday	152
Ánade picopinto	7, 147	Archibebe claro	69
Ánade rabudo	20	Archibebe común	70

Archibebe fino	7, 70	Bisbita alpino	101
Archibebe oscuro	69	Bisbita arbóreo	100
<i>Ardea cinerea</i>	32	Bisbita campestre	100
<i>Ardea purpurea</i>	33	Bisbita gorgirrojo	101
<i>Ardeola ralloides</i>	31	Bisbita pratense	100
<i>Arenaria interpres</i>	71	<i>Botaurus stellaris</i>	291
Arrendajo euroasiático	132	<i>Branta canadensis</i>	78,16,157
<i>Asio flammeus</i>	86	<i>Branta leucopsis</i>	17,161
<i>Asio otus</i>	85	<i>Bubo bubo</i>	84
<i>Athene noctua</i>	84	<i>Bubulcus ibis</i>	31
Autillo europeo	83	<i>Bucephala clangula</i>	24
Avefría europea	62	Búho campestre	86
Avefría sociable	62	Búho chico	85
Avetorillo común	8, 29	Búho real	84
Avetoro común	29	Buitre leonado	42
Avión común	99	Buitre moteado	42
Avión roquero	97	Buitre negro	42
Avión zapador	97	<i>Burbinus oedicephalus</i>	59
Avoceta común	58	Busardo calzado	47
Avutarda común	57, 163	Busardo de cola roja	149
<i>Aythya collaris</i>	7, 8, 22	Busardo mixto	149
<i>Aythya ferina</i>	22	Busardo moro	7, 46, 161
<i>Aythya fuligula</i>	23	Busardo ratonero	46
<i>Aythya marila</i>	24	Buscarla pintoja	113
<i>Aythya nyroca</i>	23, 162	Buscarla unicolor	113
Azor común	45, 159	<i>Buteo buteo</i>	46
B		<i>Buteo jamaicensis</i>	149
		<i>Buteo lagopus</i>	47
		<i>Buteo rufinus</i>	7, 8, 96, 161
Barnacla canadiense			
grande	7, 16, 157		
Barnacla cariblanca	17, 161	C	
Bigotudo	8, 124, 160	<i>Cacatua alba</i>	150

Cacatúa blanca	150	Cerceta carretona	20
Cacatúa ninfa	150	Cerceta común	19
<i>Calandrella</i>		Cerceta pardilla	21
<i>brachydactyla</i>	94	Cernícalo patirrojo	50
<i>Calandrella rufescens</i>	94	Cernícalo primilla	50
Calamón común	7, 55, 156	Cernícalo vulgar	50
Calandria común	93	<i>Certhia brachydactyla</i>	129
<i>Calidris alba</i>	64	<i>Certhia familiaris</i>	129
<i>Calidris alpina</i>	65	Cetia ruiseñor	112
<i>Calidris canutus</i>	63	<i>Cettia cetti</i>	112
<i>Calidris ferruginea</i>	65	<i>Charadrius alexandrinus</i>	60
<i>Calidris melanotos</i>	65	<i>Charadrius dubius</i>	60
<i>Calidris minuta</i>	64	<i>Charadrius hiaticula</i>	60
<i>Calidris temminckii</i>	64	<i>Charadrius morinellus</i>	61
<i>Calonectris diomedea</i>	28	Charrán ártico	75
<i>Callonetta leucophrys</i>	147	Charrán común	75
Camachuelo común	143	Charrán patinegro	75
Canario común	154	Charrancito común	75
Canastera común	59	<i>Chersophilus duponti</i>	93
<i>Caprimulgus europaeus</i>	86	<i>Chettusia gregaria</i>	xx
Cárabo común	85	<i>Chlidonias hybrida</i>	76
Carbonero común	127	<i>Chlidonias leucopterus</i>	77
Carbonero garrapinos	126	<i>Chlidonias niger</i>	76
Carbonero palustre	125	<i>Chloris chloris</i>	140
<i>Carduelis cannabina</i>	142	Chocha perdiz	66
<i>Carduelis carduelis</i>	141	Chochín común	104
<i>Carduelis citrinella</i>	140	Chorlito chico	60
<i>Carduelis spinus</i>	141	Chorlito grande	60
Carraca europea	90	Chorlito patinegro	60
Carricerín cejudo	114	Chorlito carambolo	61
Carricerín común	114	Chorlito dorado	
Carricero común	115	europeo	61
Carricero tordal	115	Chorlito gris	
<i>Cecropis daurica</i>	98, 164	Chotacabras europeo	61

Chova piquigualda	133	Collalba negra	109
Chova piquirroja	134	Collalba rubia	109
<i>Chroicocephalus</i>		Combatiente	66
<i>ridibundus</i>	7, 8, 72	<i>Coracias garrulus</i>	90
<i>Ciconia ciconia</i>	34	Cormorán grande	8, 28
<i>Ciconia nigra</i>	33	Corneja negra	135
Cigüeña blanca	34	Correlimos canelo	65
Cigüeña negra	33	Correlimos común	65
Cigüeñuela común	58	Correlimos de	
<i>Cinclus cinclus</i>	103	Temminck	64
<i>Circaetus gallicus</i>	43	Correlimos gordo	63
<i>Circus aeruginosus</i>	44	Correlimos menudo	64
<i>Circus cyaneus</i>	44	Correlimos pectoral	65
<i>Circus macrourus</i>	7, 44	Correlimos tridáctilo	64
<i>Circus pygargus</i>	45	Correlimos zarapitín	65
Cisne negro	146	<i>Corvus corax</i>	135
Cisne vulgar	15, 164	<i>Corvus corone</i>	135
Cisticola buitron	113	<i>Corvus frugilegus</i>	134
<i>Cisticola juncidis</i>	113	<i>Corvus monedula</i>	134
<i>Clamator glandarius</i>	82	Cotorra argentina	153
<i>Coccothraustes</i>		Cotorra de Kramer	151
<i>coccothraustes</i>	143	<i>Coturnix coturnix</i>	25
Codorniz común	25	<i>Coturnix japonica</i>	148
Codorniz japonesa	148	<i>Crex crex</i>	54
Cogujada común	95	Críalo europeo	82
Cogujada montesina	95	Cuco común	82
Colimbo chico	25	<i>Cuculus canorus</i>	82
Colimbo grande	26	Cuchara común	7, 21
Colirrojo real	107	Cuervo grande	135
Colirrojo tizón	107	Culebrera europea	43
<i>Columba livia</i>	79	Curruca cabecinegra	118
<i>Columba oenas</i>	80	Curruca capirotada	120
<i>Columba palumbus</i>	80	Curruca carrasqueña	117
Collalba gris	108	Curruca mirlona	119

Curruca mosquitera	119	<i>Erithacus rubecula</i>	105
Curruca rabilarga	116	Escribano cerillo	144
Curruca tomillera	117	Escribano hortelano	145
Curruca zarcera	119	Escribano montesino	145
<i>Cyanistes caeruleus</i>	127	Escribano nival	144
<i>Cyanoliseus patagonus</i>	152	Escribano palustre	145
<i>Cyanopica cookii</i>	132	Escribano soteño	144
<i>Cygnus atratus</i>	146	Escribano triguero	146
<i>Cygnus olor</i>	164	Esmerejón	51
		Espátula común	35
		Estornino negro	136
		Estornino pinto	136
D			
<i>Delichon urbica</i>	99, 159		
<i>Dendrocopos major</i>	92	F	
<i>Dendrocopos minor</i>	92		
Diamante moteado		Faisán vulgar	148
de Australia	154	Falaropo picogrueso	71
		<i>Falco columbarius</i>	51
		<i>Falco cherrug</i>	52
		<i>Falco eleonora</i>	52
		<i>Falco naumanni</i>	50
		<i>Falco peregrinus</i>	52
E		<i>Falco subbuteo</i>	51
<i>Egretta alba</i>	32	<i>Falco tinnunculus</i>	50
<i>Egretta garzetta</i>	32	<i>Falco vespertinus</i>	50
<i>Egretta gularis</i>	7, 31, 160	<i>Ficedula hypoleuca</i>	123
Elanio común	36, 162	Flamenco chileno	7, 149, 158
<i>Elanus caeruleus</i>	36, 162		
<i>Emberiza calandra</i>	146	Flamenco común	35
<i>Emberiza cia</i>	145	Focha común	56
<i>Emberiza cirrus</i>	144	<i>Fringilla coelebs</i>	139
<i>Emberiza citrinella</i>	144	<i>Fringilla montifringilla</i>	139
<i>Emberiza hortulana</i>	145	<i>Fulica atra</i>	56
<i>Emberiza schoeniclus</i>	145		
<i>Eremophila alpestris</i>	96		

Fumarel aliblanco	77	<i>Gelochelidon nilotica</i>	74
Fumarel cariblanco	76	<i>Glareola pratincola</i>	59
Fumarel común	76	Golondrina común	98
		Golondrina dáurica	98, 164
		Gorrión alpino	138
		Gorrión común	137
		Gorrión chillón	138
G		Gorrión de Java	7, 153
<i>Galerida theklae</i>	95	Gorrión molinero	138
<i>Galerida cristata</i>	95	Gorrión moruno	137, 157
<i>Gallinago gallinago</i>	66	<i>Gracula religiosa</i>	153
Gallineta común	55	Graja	134
<i>Gallinula chloropus</i>	55	Grajilla occidental	134
Ganga ibérica	78	Grulla común	56
Ganga ortega	77	<i>Grus grus</i>	56
Ganso del Nilo	146	Guacamayo	
Garceta común	32	azulamarillo	152
Garceta dimorfa	7, 31, 160	Guión de codornices	54
Garceta grande	32	<i>Gypaetus barbatus</i>	39
Garcilla bueyera	31	<i>Gyps fulvus</i>	42
Garcilla cangrejera	31	<i>Gyps rueppellii</i>	42
<i>Garrulus glandarius</i>	132		
Garza imperial	33	H	
Garza real	32		
<i>Gavia immer</i>	26	<i>Haematopus ostralegus</i>	57
<i>Gavia stellata</i>	25	Halcón de Eleonora	52
Gavilán común	46	Halcón peregrino	52
Gaviota cabecinegra	72	Halcón reidor	150
Gaviota cana	73	Halcón sacre	52
Gaviota de Audouin	73	<i>Haliaeetus albicilla</i>	39
Gaviota enana	74	<i>Herpetotheres</i>	
Gaviota patiamarilla	74	<i>cachinnans</i>	150
Gaviota reidora	7, 72	Herrerillo capuchino	126
Gaviota sombría	73		
Gaviota tridáctila	74		

Herrerillo común	127	Lechuza común	83
<i>Himantopus bimantopus</i>	58	<i>Limosa lapponica</i>	7, 8, 9, 67, 158
<i>Hippolais polyglotta</i>	116	<i>Limosa limosa</i>	67
<i>Hirundo rustica</i>	98	<i>Locustella luscinioides</i>	113
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	74	<i>Locustella naevia</i>	113
I		<i>Lophophanes cristatus</i>	126
<i>Iduna opaca</i>	114	Lorito senegalés	152
Inseparable de Fischer	152	Loro barranquero	152
Inseparable de		<i>Loxia curvirostra</i>	142
Namibia	151	<i>Lullula arborea</i>	96
<i>Ixobrychus minutus</i>	8, 9, 29	<i>Luscinia megarhynchos</i>	106
		<i>Luscinia svecica</i>	106
		<i>Lymnocyptes minimus</i>	66
J			
Jilguero europeo	141	M	
Jilguero lúgano	141	<i>Marmaronetta</i>	
<i>Jynx torquilla</i>	91	<i>angustirostris</i>	21
		Martín pescador	
L		común	89
<i>Lanius collurio</i>	131	Martinete común	8, 30
<i>Lanius meridionalis</i>	131	<i>Melanitta fusca</i>	24
<i>Lanius senator</i>	132	<i>Melanocorypha calandra</i>	93
<i>Larus audouinii</i>	73	<i>Melopsittacus undulatus</i>	151
<i>Larus canus</i>	73	<i>Merops apiaster</i>	89
<i>Larus fuscus</i>	73	Milano negro	38
<i>Larus melanocephalus</i>	72	Milano real	38
<i>Larus michabellis</i>	74	<i>Milvus migrans</i>	38
Lavandera blanca	103	<i>Milvus milvus</i>	38
Lavandera boyera	102	Miná del Himalaya	153
Lavandera cascadeña	102	Mirlo capiblanco	110
		Mirlo común	111

Mirlo-acuático europeo	103	<i>Oenanthe leucura</i>	109
Mito común	125	<i>Oenanthe oenanthe</i>	108
Mochuelo común	84	<i>Oriolus oriolus</i>	130
<i>Monticola saxatilis</i>	110	Oropéndola europea	130
<i>Monticola solitarius</i>	110	Ostrero euroasiático	57
<i>Montifringilla nivalis</i>	138	<i>Otis tarda</i>	57, 163
Morito común	7, 34	<i>Otus scops</i>	83
Mosquitero común	121		
Mosquitero ibérico	121	P	
Mosquitero musical	122		
Mosquitero papialbo	120	<i>Padda oryzivora</i>	7, 8, 153
Mosquitero silbador	120	Págalo grande	7, 72, 159
<i>Motacilla alba</i>	103	Págalo rabero	71
<i>Motacilla cinerea</i>	102	Pagaza piconegra	74
<i>Motacilla flava</i>	102	Pájaro-moscón	
<i>Muscicapa striata</i>	123	europeo	130
<i>Myiopsitta monachus</i>	153	Paloma bravía	79
		Paloma torcaz	80
N		Paloma zurita	80
		<i>Pandion haliaetus</i>	49
<i>Nandayus nenday</i>	152	<i>Panurus biarmicus</i>	8, 9, 124, 160
Negrón especulado	24	Papamoscas cerrojillo	123
<i>Neophron percnopterus</i>	41	Papamoscas gris	123
<i>Netta rufina</i>	21	<i>Parabuteo unicinctus</i>	149
<i>Numenius arquata</i>	68	Pardela cenicienta	28
<i>Numenius phaeopus</i>	68	Pardillo común	142
<i>Nycticorax nycticorax</i>	8, 9, 30	<i>Parus major</i>	127
<i>Nymphicus hollandicus</i>	150	<i>Passer domesticus</i>	137
		<i>Passer hispaniolensis</i>	137, 157
O		<i>Passer montanus</i>	138
		Pato acollarado	147
<i>Oenanthe hispanica</i>	109	Pato colorado	21

Pato joyuyo	7, 147	<i>Picus viridis</i>	91
Pato mandarín	18	Pigargo europeo	39
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	148	Pinzón real	139
<i>Pelecanus rufescens</i>	148	Pinzón vulgar	139
Pelícano común	148	Piquituerto común	142
Pelícano rosado	148	Pito real	91
<i>Perdix perdix</i>	25	<i>Platalea leucorodia</i>	35
Perdiz pardilla	25	<i>Plectrophenax nivalis</i>	144
Perdiz roja	24	<i>Plegadis falcinellus</i>	7, 8, 34
Perico dorsirrojo	151	<i>Pluvialis apricaria</i>	61
<i>Periparus ater</i>	126	<i>Pluvialis squatarola</i>	61
Periquito común	151	<i>Podiceps cristatus</i>	27
<i>Pernis apivorus</i>	36	<i>Podiceps grisegena</i>	27
Petirrojo europeo	105	<i>Podiceps nigricollis</i>	9, 27, 157
<i>Petronia petronia</i>	138	<i>Podilymbus podiceps</i>	26
<i>Phalacrocorax carbo</i>	8, 9, 28	<i>Poecile palustris</i>	125
<i>Phalaropus fulicarius</i>	71	<i>Poicephalus senegallus</i>	152
<i>Phasianus colchicus</i>	148	Polluela bastarda	53
<i>Philomachus pugnax</i>	66	Polluela chica	54
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	7, 8, 149	Polluela pintoja	53
	158	<i>Porphyrio porphyrio</i>	7, 8, 9, 55, 156
<i>Phoenicopterus ruber</i>	35	Porrón acollarado	7, 22
<i>Phoenicurus ochruros</i>	107	Porrón bastardo	24
<i>Phoenicurus</i>		Porrón europeo	22
<i>pboenicurus</i>	107	Porrón moñudo	23
<i>Phylloscopus bonelli</i>	120	Porrón osculado	24
<i>Phylloscopus collybita</i>	121	Porrón pardo	23, 162
<i>Phylloscopus ibericus</i>	121	<i>Porzana parva</i>	53
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	120	<i>Porzana porzana</i>	53
<i>Phylloscopus trochilus</i>	122	<i>Porzana pusilla</i>	54
<i>Pica pica</i>	133	<i>Prunella collaris</i>	105
Pico menor	92	<i>Prunella modularis</i>	104
Pico picapinos	92	<i>Psephotus haematonotus</i>	151
Picogordo común	143		

<i>Psittacula krameri</i>	151		
<i>Pterocles alcbata</i>	78	<i>Saxicola rubetra</i>	107
<i>Pterocles orientalis</i>	77	<i>Saxicola rubicola</i>	108
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	97	<i>Scolopax rusticola</i>	66
<i>Pyrrhonorax graculus</i>	133	Serín verdicillo	139
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax</i>	134	<i>Serinus canaria</i>	154
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	143	<i>Serinus serinus</i>	139
		Silbón europeo	18
		Sisón común	56
Q		<i>Sitta europaea</i>	128
Quebrantahuesos	39	Somormujo cuellirrojo	27
		Somormujo lavanco	27
		<i>Stercorarius longicaudus</i>	71
		<i>Stercorarius skua</i>	7, 8, 72, 159
R		<i>Sterna hirundo</i>	75
Rabilargo ibérico	132	<i>Sterna paradisaea</i>	75
<i>Rallus aquaticus</i>	53	<i>Sterna sandvicensis</i>	75
Rascón europeo	53	<i>Sternula albifrons</i>	75
<i>Recurvirostra avosetta</i>	58	<i>Streptopelia decaocto</i>	81
<i>Regulus ignicapilla</i>	122	<i>Streptopelia risoria</i>	150
<i>Regulus regulus</i>	122	<i>Streptopelia turtur</i>	81
<i>Remiz pendulinus</i>	130	<i>Strix aluco</i>	85
Reyezuelo listado	122	<i>Sturnus unicolor</i>	136
Reyezuelo sencillo	122	<i>Sturnus vulgaris</i>	136
<i>Riparia riparia</i>	97	<i>Sylvia atricapilla</i>	120
<i>Rissa tridactyla</i>	74	<i>Sylvia borin</i>	119
Roquero rojo	110	<i>Sylvia cantillans</i>	117
Roquero solitario	110	<i>Sylvia communis</i>	119
Ruiseñor común	106	<i>Sylvia conspicillata</i>	117
Ruiseñor pechiazul	106	<i>Sylvia hortensis</i>	118
		<i>Sylvia melanocephala</i>	118
		<i>Sylvia undata</i>	116
S			

		<i>Turdus torquatus</i>	110
		<i>Turdus viscivorus</i>	112
		<i>Tyto alba</i>	83
T			
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	26		
<i>Tadorna ferruginea</i>	17, 163		
<i>Tadorna tadorna</i>	7, 8, 18	U	
<i>Taenopygia guttata</i>	154	<i>Upupa epops</i>	90
Tarabilla europea	108	Urraca común	133
Tarabilla norteña	107		
Tarro blanco	7, 18	V	
Tarro canelo	17, 163	<i>Vanellus gregarius</i>	62
Terrera común	94	<i>Vanellus vanellus</i>	62
Terrera marismeña	94	Vencejo común	87
<i>Tetrax tetrax</i>	56	Vencejo pálido	87
<i>Tichodroma muraria</i>	128, 165	Vencejo real	88
Torcecuello		Verderón común	140
euroasiático	91	Verderón serrano	140
Tórtola europea	81	Vuelvepiedras común	71
Tórtola rosigrís	150		
Tórtola turca	81	Z	
Trepador azul	128	Zampullín común	26
Treparriscos	128, 165	Zampullín cuellinegro	8, 27, 156
<i>Tringa erythropus</i>	69	Zampullín picogruoso	26
<i>Tringa glareola</i>	70	Zarapito real	68
<i>Tringa nebularia</i>	69	Zarapito trinador	68
<i>Tringa ochropus</i>	68	Zarcero bereber	114
<i>Tringa stagnatilis</i>	7, 8, 70	Zarcero políglota	116
<i>Tringa totanus</i>	70	Zorzal alirrojo	112
<i>Troglodytes troglodytes</i>	104	Zorzal común	111
<i>Tryngites subruficollis</i>	65		
<i>Turdus iliacus</i>	112		
<i>Turdus merula</i>	111		
<i>Turdus philomelos</i>	111		
<i>Turdus pilaris</i>	111		