



171. Dispensación de los test de autodiagnóstico para la detección de SARS-CoV-2: Actuación del farmacéutico y visión del paciente

Fernández Otero, María Dolores¹; García-Pastor, Coral²; Tejedor García, Noelia³

1. Farmacéutica comunitaria. Móstoles. Madrid. 2. Profesora CFGM. I.E.S. Benjamín Rúa. Móstoles. Madrid. 3 Farmacéutica comunitaria. Madrid.


Justificación: El pasado 20 de julio mediante el Real Decreto 588/2021 se autorizaba la dispensación de productos de autodiagnóstico para la COVID-19. El farmacéutico comunitario, como sanitario responsable del buen uso de los medicamentos y productos sanitarios, debe garantizar el correcto uso de estos productos, cuyo manejo e interpretación puede no resultar sencillo para algunos pacientes.

Objetivos: Conocer cuál es la actuación del farmacéutico a la hora de dispensar los test de autodiagnóstico (informar, supervisar o realizar el test), y la opinión de los encuestados sobre la información recibida, la dificultad de realizar el test y la fiabilidad que le conceden.


Materiales y métodos: Se realizó una encuesta de 9 preguntas cortas de respuesta única a través de un formulario Google que permaneció activa entre el 20 y el 31 de enero de 2022 (<https://forms.gle/T4GjzqYgYnKicTTD6>). El formulario fue difundido a través de grupos de WhatsApp y Telegram.

Resultados: Contestaron a la encuesta 177 pacientes, 69.5% mujeres y 56.5% universitarios. En casi el 80 % de las dispensaciones de los pacientes, recibieron indicaciones que consideraban suficientes para realizar e interpretar la prueba correctamente. En el 12,3% de los casos la toma de la muestra la realizó en farmacéutico mientras que un 13% había realizado la prueba bajo la observación y dirección del farmacéutico, quien interpretó la prueba y al 9.9% de los encuestados, el test no les resultaba fácil de realizar dándose un 7% que había tenido dificultades para interpretar el resultado de este. El 29 % de los encuestados realizaron otra prueba para confirmar el resultado, (7.4% en centro público) de atención primaria. El segundo resultado discrepó del primero en el 6.8% de los casos. ^{1,2,3}


¿Has adquirido alguna vez un test rápido de antígeno frente a la COVID-19 en farmacias comunitarias? 177 respuestas




¿Le ha resultado fácil? 162 respuestas



¿El farmacéutico que se lo ha dispensado le ha realizado la prueba? 162 respuestas



¿Ha confirmado el resultado con otro autotest de antígeno adquirido en la farmacia? 162 respuestas



Discusión: Una parte no despreciable de los encuestados tiene dificultades en la realización e interpretación de los test de autodiagnóstico frente a la COVID-19, pese a haber recibido información durante la dispensación, incluso considerando el posible sesgo de encuestados que considere que interpreta bien los resultados, pero no sea así. Estos datos, aunque limitados, revelan la importancia que tiene una correcta educación por parte de un profesional sanitario durante la dispensación de estos test en la farmacia comunitaria y el impacto positivo que esta actuación profesional farmacéutica tiene sobre el uso racional de los productos sanitarios.

BIBLIOGRAFIA:

1 La Comunidad de Madrid entrega hoy más de 1,4 millones de test de antígenos gratuitos en las farmacias | Comunidad de Madrid [Internet]. Disponible en:

<https://www.comunidad.madrid/noticias/2022/01/11/comunidad-madrid-entrega-hoy-14-millones-test-antigenos-gratuitos-farmacias>

2 Ministerio de trabajo y economía social. Disposición 3404 del BOE núm. 54 de 2021 [Internet]. 2021. Disponible en: <https://www.boe.es>

3 Torrente C. Test de autodiagnóstico: sólo 5 CCAA contabilizan los positivos notificados por las farmacias sin confirmación con PCR | Salud [Internet]. El mundo. 2022. Disponible en: <https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2022/01/08/61d46b29fc6c83cf4b8b4591.html>

Palabras clave: "COVID-19"[Mesh]; "Pharmacy"[Mesh]; " COVID-19 Testing"[Mesh].