


Fotografía Diagnóstica



Se trata de un caso de artritis séptica derivada de una onfalitis o infección umbilical en un ternero de 20 días de edad.

Este problema articular puede dar lugar desde cojeras y retrasos en el crecimiento hasta anquilosis, septicemia y muerte del individuo, por lo tanto el tratamiento aplicado va encaminado a reducir el dolor y favorecer la recuperación del animal en su fase de crecimiento.

En este caso la tumefacción afecta al carpo de la extremidad anterior derecha, presentando el ternero fuerte dolor a la palpación, calor aumentado y gran rubor.

El procedimiento utilizado se basa en la realización de una artrocentesis, técnica consistente en la extracción del líquido sinovial mediante punción en las zonas más inflamadas de la cavidad articular. Una vez sedado el animal y tras el rasurado, limpieza y desinfección de la zona a intervenir, se colocan dos agujas de entrada y salida en un ángulo que favorezca la circulación del suero fisiológico empleado en el lavado articular, de modo que el líquido introducido a presión por una de ellas fluya con fuerza para salir por la otra.

Una vez realizada la operación, se procede a la retirada de las agujas y al vendaje de la zona con gasas con antisépticos y algodón, complementando con la aplicación de corticoides y antibioterapia sistémica.

Artritis séptica por onfalitis

ARTURO BENEGASI CARMONA
MANUEL HIERRO GARDETA

Veterinarios