

del repetidor de TV, 900 m, 37/06 (SEV 216505).

Hypochoeris arachnoidea Poir. (Asteraceae).

En el herbazal del rellano del repetidor de TV, 900 m, 32/06 (SEV 216491).

Bocconea 8: 5-243

VALDÉS, B., M. REJDALI, A. ACHHAL EL KADMIRI, S.L. JURY & J.M. MONTSERRAT -2002- *Catalogue des Plantes Vasculaires du Nord du Maroc*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

BIBLIOGRAFÍA

FENNANE, M. & M. IBN TATTOU -1998- Catalogue des plantes vasculaires rares, menacées ou endémiques du Maroc.

Aceptado para su publicación en octubre de 2006

Dirección de los autores. Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Biología. Apdo. 1095. 41080 Sevilla.

12. SOBRE *VERBESINA ENCELIOIDES* (CAV.) A. GRAY EN MARRUECOS

Anass TERRAB, Salvador TALAVERA & Josefa DÍAZ DAPENA

Verbesina encelioides (Cav.) A. Gray in Morocco

Palabras clave. Corología, especie alóctona, Marruecos.

Key words. Chorology, exotic species, Morocco.

Esta Heliantheae, originaria de América, aparece muy frecuentemente en las dunas cercanas de Biougra, al SE de Agadir. La población la componía una docena de individuos de hasta 2 m de altura, con flores y frutos maduros. De las inmediaciones de Agadir fue ya indicada por Oberprieler & Vogt (1993), Fennane & Ibn Tattou (1998) y Gomiz (2001).

También encontramos esta misma especie en Moulay-Bouselham, viviendo en las arenas litorales cercanas al pueblo. La población estaba formada por unos 100 individuos, que en junio estaban en plena

floración y en septiembre aún permanecían con flores y frutos. Al parecer es la primera vez que se cita esta especie en la costa Atlántica del N de Marruecos.

Debe tratarse de invasiones no demasiado viejas, pero bien establecidas en estos territorios, ya que Jahandiez and Maire (1932), Emberger y Maire (1941) y Valdés et al. (2002) no testifican su presencia en Marruecos.

Material herborizado

AGADIR: A 10 km de Biougra, en la carretera de Taфраute, dunas, 40-50 m,

30°15'28,5" N – 9°25'33" W, 20/IV/2003, S. Talavera et al., 134/03 (SEV 216507).

LARACHE: Entre Larache y Kenitra, Moulay-Bouselham, a 1 km de la línea de costa, arenales marítimos cercanos al humedal, 60 m, 34°53'40" N – 6°16'53" W, 19/IX/2005, J. Díez Dapena (SEV 216483).

BIBLIOGRAFÍA

FENNANE, M. & M. IBN TATTOU -1998- Catalogue des plantes vasculaires rares, menacées ou endémiques du Maroc. *Bocconea* 8: 5-243.

GÓMIZ GARCÍA, F. -2001- *Flora Selecta Marroquí*. Amábar, S.L. Burgos.

JAHANDIEZ, E. & R. MAIRE -1934- *Catalogue des Plantes du Maroc* 3. Imprimerie Minerva. Argel.

EMBERGER, L. & R. MAIRE -1941- *Catalogue des Plantes du Maroc* 4. Imprimerie Minerva. Argel.

OBERPRIELER, CH. & R. VOGT -1993- Chromosome numbers of North African Phanerogams II. *Willdenowia* 23: 211-238.

VALDÉS, B., M. REJDALI, A. ACHHAL EL KADMIRI, S.L. JURY & J.M. MONTSERRAT -2002- *Catalogue des Plantes Vasculaires du Nord du Maroc*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid.

Aceptado para su publicación en octubre de 2006

Dirección de los autores. Departamento de Biología Vegetal y Ecología. Facultad de Biología. Apdo. 1095. 41080 Sevilla.