

(n) *Sesuvium portulacastrum* L. "Verdejo".
Cáñamo de la familia de las Amaranthaceas.
(n) *Salsola komarovii* T. S. Brandegee
Salsolácea. (E).
**CATALOGO DIDACTICO DE LAS PLANTAS
FANEROGAMAS MAS CARACTERISTICAS
DE LOS ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE
ALBACETE. CUARTA PARTE**

A. Valdés Franzí

R. Molina Cantos

J. L. González Beserán

Arturo Valdés Franzí. Doctor en Biología (Botánica).
Catedrático de Escuela Universitaria.

Rafael Molina Cantos. Licenciado en Biología. Becario de
Investigación (F.P.P.I.).

J. Luis González Beserán. Licenciado en Biología. Beca-
rio de Investigación (F.P.P.I.).

INTRODUCCION

En esta nota se continúa el catálogo de plantas vasculares publicado en tres trabajos anteriores,⁽¹⁾ con los mismos criterios y bibliografía allí citados.

Aquí nos referimos al resto de familias de Gamopétalas (Simpétalas), grupo que tratamos en la última publicación (l.c., 1989).

GAMOPETALAS (CONTINUACION)

CONVOLVULACEAS

- (n) *Calystegia sepium* (L.) R. Br. "Correhuela mayor".
Perenne trepadora; hasta 4 m.; Jn-S; márgenes de canales y
curso de agua. (E).
(n) *Convolvulus althaeoides* L. "Campanilla rosa".
Perenne, rastrera o trepadora; hasta 1 m.; Ab-Jl; comunida-
des graminoides en enclaves térmicos. (E).
(n) *Convolvulus arvensis* L. "Correhuela".
Perenne, rastrera o trepadora; hasta 1 m.; Ab-Jl; comunida-
des graminoides en enclaves térmicos. (E).

(1) Revista *Ensayos* n.º 1, pp. 209-220; n.º 3, pp. 257-281; n.º 4, pp. 187-197. Alba-
cete, 1987, 1989, 1990.

- (n) *Convolvulus arvensis* L. "Correhuela".
Perenne, rastrera o trepadora; 0, 2-0, 6 m.; My-0; herbazales de bordes de caminos, vertederos, (MF).
- (n) *Convolvulus lanuginosus* Desr. "Campanilla lanuda".
Perenne; 15-35 cm.; My-Ag; matorrales y campos incultos. (E).
- (n) *Convolvulus lineatus* L. "Campanilla espigada".
Perenne, leñosa en la base; 5-20 cm.; My-Ag; suelos pedregosos, bordes de caminos. (F).
- (s) *Cuscuta campestris* Yuncker.
Anual parásita; hasta 1 m.; J1-0; huertas y regadíos. (E).
- (n) *Cuscuta epithymum* (L.) L. "Barbas de capuchino".
Anual parásita; hasta 0,4 m.; My-0; matorrales y tomillares. (F).
- (s) *Ipomoea purpurea* Roth "Campanilla morada".
Anual, rastrera o trepadora; 1-3 m.; J1-N; huertas y regadíos. (E).

CUCURBITACEAS

- (n) *Bryonia cretica* L. "Nuez".
Perenne trepadora; hasta 4 m.; My-J1; espinares y zarzales de bosques de ribera. (F).
- (c) *Citrullus lanatus* (Thunb.) Mansfeld "Sandía".
Anual, rastrera o trepadora; hasta 2 m.; Jn-Ag; huertas. (E).
- (c) *Cucumis melo* L. "Melón".
Anual rastrera; hasta 1 m.; Jn-Ag.; huertas. (E).
- (c) *Cucumis sativus* L. "Pepino".
Anual rastrera; hasta 0'8 m.; Jn-Ag.; huertas. (E.).
- (c) *Cucurbita pepo* L. "Calabacera".
Anual, rastrera o trepadora; hasta 2 m.; Jn-J1; huertas. (E).

DIPSACACEAS

- (n) *Cephalaria leucantha* (L.) Roemer & Schultes "Cabezuela blanca", "Escabiosilla".
Perenne, leñosa en la base; 30-90 cm.; J1-0; matorrales en laderas pedregosas. (E).
- (n) *Dipsacus fullonum* L. "Cardo de cardador".
Bianual; 0, 8-2 m.; Jn-Ag; cardinales de bordes de caminos, cunetas húmedas. (E).
- (n) *Scabiosa atropurpurea* L. "Escobilla morisca".
Bianual; 20-60 cm.; My-J1; herbazales de bordes de caminos, campos incultos. (F).

- (n) *Scabiosa stellata* L. "Farolitos", "Viudas".
Anual; 15-50 cm.; My-J1; bordes de caminos, cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Scabiosa turoensis* Pau ex Willk.
Perenne; 20-60 cm.; My-S; matorrales y tomillares zonas frías del norte. (F).

ERICACEAS

- (c) *Arbutus unedo* L. "Madroño".
Arbusto o pequeño árbol perennifolio; 2-7 m.; 0-F; parques. (E).
- (n) *Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Sprengel "Gayuba".
Mata o pequeño arbusto perennifolio; 10-80 cm.; My-J1; encinares y coscojares parameras frías. (E).
- (n) *Erica multiflora* L. "Bruguera".
Mata o pequeño arbusto perennifolio; 0, 4-2 m.; Mz-0; valle del Júcar. (F).

ESCROFULARIACEAS

- (n) *Anarrhinum bellidifolium* (L.) Willd. "Acicates de olor".
Bianual o perenne; 0,2-0,7 m.; Jn-Ag; en claros de encinar sobre raíz. (E).
- (n) *Antirrhinum barrelieri* Boreau "Becerrilla".
Perenne; 0, 5-1 m.; Ab-Ag; bordes pedregosos de caminos y fisuras roquedos. (F).
- (c) *Antirrhinum majus* L. "Boca de dragón".
Perenne; 0, 3-1, 2 m.; Jn-S; jardines. (E).
- (n) *Bellardia trixago* (L.) All. "Gallocresta".
Anual; 10-50 cm.; My-J1; cunetas húmedas, campos incultos. (E).
- (n) *Chaenorhinum origanifolium* (L.) Fourr. "Espuelilla de hoja carnosa".
Perenne; 8-30 cm.; Ab-J1; fisuras de rocas calcáreas. (E).
- (s) *Cymbalaria muralis* P. Gaertner "Palomilla de muro".
Anual; 10-30 cm.; Mz-Jn; muros viejos. (E).
- (n) *Digitalis obscura* L. "Digital negra", "Estepilla".
Mata o arbusto pequeño; 0, 3-1 m.; My-J1; matorrales en laderas pedregosas. (F).
- (n) *Linaria caesia* (Pers) DC.
Anual o perenne; 10-30 cm.; Ab-Jn; márgenes de caminos y campos incultos. (E).
- (n) *Linaria hirta* (L.) Moench "Conejillo", "Canarios trigales".
Anual; 15-60 cm.; Ab-Jn; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (F).

- (n) *Linaria simplex* (Willd.) DC. “Linaria amarilla de hoja estrecha”.
Anual; 10-30 cm.: Ab-Jn; pastizales efímeros, cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Linaria spartea* (L.) Willd. “Baleo montesino”.
Anual; 10-60 cm.; Ab-J1; pastizales sobre raíz en claros de encinar. (E).
- (n) *Misopates orontium* (L.) Rafin. “Becerrilla”, “Cabeza de muerto”.
Anual; 15-35 cm.; Ab-J1; pastizales subnitrófilos en márgenes de caminos. (E).
- (n) *Odontites longiflora* (Vahl) Webb “Balea de flor larga”.
Anual; 15-50 cm.; Jn-0; enclaves subrupícolas y subnitrófilos. (E).
- (n) *Parentucellia latifolia* (L.) Caruel “Algarabía pegajosa”.
Anual; 5-20 cm.; Ab-Jn; pastizales efímeros entre tomillares. (E).
- (n) *Scrophularia auriculata* L. “Hierba del moro”, “Jabonera de agua”.
Perenne; 0, 4-0, 9 m.; My-S; bordes semiencharcados de cursos de agua. (E).
- (n) *Scrophularia canina* L. “Hierba de Troya”, “Ruda camera”.
Perenne; 0, 2-0, 8 m.; My-Ag; bordes de caminos, laderas pedregosas. (E).
- (n) *Verbascum pulverulentum* Vill. “Gordolobo”.
Bianual; 0, 6-1, 3 m.; Jn-Ag; cardinales de bordes de caminos. (F).
- (n) *Verbascum rotundifolium* Ten.
Bianual; 0, 5-1,3 m.; My-Jl; cardinales de bordes de caminos. (E).
- (n) *Verbascum sinuatum* L. “Acigutre”, Tientayernos.
Bianual; 0,5-1 m.; Jn-Ag; cardinales de bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Verónica agrestis* L. “Pamplina basta”.
Anual; 5-25 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, campos incultos. (E).
- (n) *Verónica anagallis-aquatica* L. “Verónica acuática”.
Perenne; 30-60 cm.; My-S; márgenes encharcados de cursos de agua. (F).
- (n) *Verónica hederifolia* L. “Hierba gallinera”.
Anual rastrera; 10-50 cm.; Mr-My; bordes de caminos, praderas entre olivares y viñedos. (F).
- (n) *Verónica persica* Poiret in Lam.
Anual, a menudo rastrera; 10-40 cm.; Mr-My; bordes de caminos, cultivos cerealistas. (F).

GENCIANACEAS

- (n) *Centaurium erythraea* Rafn. "Gotas de sangre", "Centaura menor".
Bianual; 10-40 cm.; My-Jl; tomillares y matorrales. (E).
(n) *Centarium linariifolium* (Lam.) G. Beck "Centaura".
Bianual; 15-40 cm.; My-Jl; tomillares y matorrales. (E).

GLOBULARIACEAS

- (n) *Globularia vulgaris* L. "Galipo", "Hierba de San Pedro".
Perenne; 10-40 cm.; My-O; matorrales en laderas pedregosas. (E).

LABIADAS

- (n) *Acinos rotundifolius* Pers. "Calaminta".
Anual, a veces perenne; 10-25 cm.; Ab-Jn; zonas incultas, nitrificadas. (E).
(n) *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreber "Pinillo". "Camepitio".
Anual, a veces perenne; 5-20 cm. ; Ab-Jl; campos incultos. (E).
(n) *Ballota hirsuta* Benthon "Flor rubí".
Perenne; 40-70 cm.; My-Ag; herbazales de márgenes de caminos. (E).
(n) *Cleonia lusitanica* (L.) L. "Cuatro hermanas".
Anual; 10-30 cm.; Ab-Jn; cunetas, claros de matorrales. (E).
(n) *Lamium amplexicaule* L. "Ortiga muerta", "Zapatitos de la Virgen".
Anual; 8-30 cm.; Mr-My; bordes terrosos de caminos, olivares y viñedos. (MF).
(n) *Lavandula latifolia* Medicus "Espliego", "Lavanda".
Mata o pequeño arbusto siempre verde; 20-60 cm.; Jl-N; tomillares y matorrales. (F).
(n) *Lavandula stoechas* L. "Cantueso", "Tomillo caballar".
Mata o pequeño arbusto siempre verde; 0, 4-0, 8 m.; tomillares sobre raíz. (E).
(n) *Marrubium supinum* L. "Marrubio español".
Perenne; 20-40 cm.; Ab-Jn; cunetas, tomillares algo nitrificados. (F).
(n) *Marrubium vulgare* L. "Marrubio", "Juanrubio".
Perenne; 30-60 cm.; My-Ag; cardinales de bordes de caminos, vertederos y campos incultos. (MF).
(c)s) *Melissa officinalis* L. "Limonera", "Toronjil".
Perenne; 0, 3-0, 8 m.; Jn-S; huertas, márgenes de acequias. (E).

- (n) *Mentha aquatica* L. "Hierba buena morisca".
Perenne; 0, 2-0, 7 m.; Jn-O; bordes encharcados de cursos de agua. (E).
- (n) *Mentha longifolia* (L.) Hudson "Hierba buena".
Perenne; 0, 3-0, 7 m.; Jl-S; zonas húmedas más o menos nitrificadas en regadíos y bordes de cursos de agua. (F).
- (n) *Mentha suaveolens* Ehrh. "Mastranzo".
Perenne; 0, 3-0, 9 m.; Jl-O; márgenes algo nitrificados de cursos de agua y acequias. (E).
- (n) *Nepeta nepetella* L. "Nebeda".
Perenne; 20-60 cm.; Ab-S; bordes pedregosos de caminos, matorrales nitrificados. (F).
- (n) *Phlomis crinita* Cav. "Barbas de macho".
Mata o pequeño arbusto perennifolio; 20-60 cm.; My-Jl.
Tomillares y matorrales sobre suelos pedregosos en zonas térmicas. (E).
- (n) *Phlomis herba-venti* L. "Aguavientos".
Perenne; 0,3-0,7 m.; My-Jl; bordes de caminos. (E).
- (n) *Phlomis lychnitis* L. "Candilera", "Mechera".
Mata o pequeño arbusto perennifolio; 30-60 cm.; Ab-Jl;
espartales sobre suelos pedregosos, bordes de caminos. (F).
- (n)(c) *Rosmarinus officinalis* L. "Romero".
Arbusto perennifolio; 0, 5-1, 8 m.; todo el año; matorrales y jardines. (MF).
- (n) *Salvia lavandulifolia* Vahl "Salvia", "Te indígena".
Mata; 20-50 cm.; My-Jl; tomillares y salviarios. (F).
- (n) *Salvia verbenaca* L. "Verbenaca", "Hierba de los ciegos".
Perenne; 10-50 cm.; Ab-Jl; herbazales húmedos de bordes de caminos y vertederos. (F).
- (n) *Satureja cuneifolia* Ten. "Ajedrea".
Mata; 15-50 cm.; Jl-O; tomillares y matorrales. (MF).
- (n) *Sideritis angustifolia* Lag. "Rabogato", "Zahareña".
Mata o pequeño arbusto; 15-70 cm.; Ab-Ag; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Sideritis hirsuta* L. "Rabogato", "Zahareña tomentosa".
Perenne; 15-50 cm.; Ab-Jl; bordes de caminos, matorrales. (E).
- (n) *Sideritis incana* L. "Rabogato", "Hierba del herido".
Mata; 15-60 cm.; My-Ag.; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Sideritis leucantha* Cav. "Rabogato".
Mata; 10-40 cm.; My-Jl; tomillares y matorrales en enclave térmico al sur del territorio. (E).
- (n) *Teucrium botrys* L. "Pinillo hembra".
Anual; 5-25 cm.; Ab-Jn; pastizales en laderas pedregosas. (E).

- (n) *Teucrium buxifolium* Schreber.
Mata; 5-15 cm.; Ab-Jn; fisuras de paredes rocosas. (E).
- (n) *Teucrium capitatum* L. “Zamarrilla”, “Poleo de monte”.
Mata; 10-30 cm.; My-Jl; tomillares, matorrales y bordes de caminos. (MF).
- (n) *Teucrium gnaphalodes* L. “Zamarrilla lanuda”.
Mata, 10-25 cm.; Ab-Jl; tomillares y matorrales. (F)
- (n) *Teucrium pseudochamaepitys* L. “Hierba de la cruz”.
Mata; 20-50 cm.; Ab-Jl; espartales y matorrales. (MF).
- (n) *Teucrium webbianum* Boiss.
Mata; 10-40 cm.; My-Ag; tomillares en suelos pedregosos. (E).
- (n) *Thymus mastichina* L. “Mejorana”, “Tomillo blanco”.
Mata; 20-40 cm.; Ab-Jl; claros de encinar sobre raíz. (E).
- (n) *Thymus vulgaris* L. “Tomillo común”, “Tomillo salsero”.
Mata; 10-30 cm.; Mz-Jl; tomillares y matorrales. (MF).
- (n) *Thymus zygis* L. “Tomillo aceitunero”.
Mata; 10-30 cm.; Ab-Jl; tomillares subnitrófilos y bordes de caminos. (F).

OLEACEAS

- (n)(c) *Fraxinus angustifolia* Vahl “Fresno común”.
Arbol caducifolio; 8-15 m.; F-Ab; bosques de ribera, parques y paseos. (F).
- (c) *Fraxinus excelsior* L. “Fresno de Vizcaya”.
Arbol caducifolio; 8-20 m.; Mz-Ab.; parques. (E).
- (n) *Jasminum fruticans* L. “Jazmín silvestre”, “Jazmín amarillo”.
Arbusto perennifolio; 0, 5-1, 5m.; Ab-Jn; encinares aclarados en laderas soleadas. (E).
- (c) *Jasminum nudiflorum* Lindley “Jazmín de invierno”.
Arbusto perennifolio; 1-3 m.; F-Ab; parques y jardines. (E).
- (c) *Ligustrum lucidum* Aiton fil. “Aligustre del Japón”.
Arbusto o pequeño árbol perennifolio; 2-8 m.; Jn-Jl; parques y jardines. (F).
- (c) *Ligustrum ovalifolium* Hassk. “Aligustre”.
Arbusto generalmente perennifolio; 1-3 m.; My-Jn; setos de jardines y parques. (F).
- (c) *Olea europaea* L. “Olivo”.
Arbusto o pequeño árbol perennifolio; 3-8 m.; My-Jn; cultivados en laderas soleadas. (F).
- (n) *Phillyrea angustifolia* L. “Labiérnaga”, “Olivilla”.
Arbusto perennifolio; 1-3 m.; Mz-My; encinares y coscojares. (E).

- (c) *Phillyrea latifolia* L. "Labiérnago prieto", "Agracejo".
Arbusto o pequeño árbol perennífolo; 2-6 m.; Jn-S; parques.
(E).
- (c) *Syringa vulgaris* L. "Lila".
Arbusto caducífolo; 1, 5-4 m.; Ab-My; parques y jardines
(F).

OROBANCACEAS

- (n) *Orobanche amethystea* Thuill. "Vara florida morada".
Parásita, a menudo sobre el cardo corredor; 10-30 cm.; My-Jl;
laderas pedregosas. (E).
- (n) *Orobanche latisquama* (F.W. Schulz) Batt. "Jopo".
Parásita sobre romero y jarilla; 15-35 cm.; Ab-Jl; matorrales.
(F).
- (n) *Orobanche lutea* Baumg.
Parásita sobre leguminosas; 15-50 cm.; My-Jl; laderas pedre-
gosas. (E).
- (n) *Orobanche minor* Sm. "Rabo de lobo".
Parásita sobre diversas plantas; 10-40 cm.; Ab-Jl; laderas
pedregosas. (E).
- (n) *Orobanche ramosa* L.
Parásita sobre diversas plantas; 5-25 cm.; Ab-Jl; romerales al
este del territorio. (E).

PITOSPORIACEAS

- (c) *Pittosporum tobira* (Thunb.) Aiton fil. "Pitosporo japonés".
Arbusto perennífolo; 1-4 m.; Ab-My; parques y jardines.
(F).

PLANTAGINACEAS

- (n) *Plantago afra* L.
Anual; 8-20 cm.; Ab-Jn; pastizales entre matorrales subnitró-
filos. (E).
- (n) *Plantago albicans* L. "Pelosilla", "Gitanilla".
Perenne; 15-35 cm.; Ab-Jl; bordes de caminos y matorrales
algo nitrificados (MF).
- (n) *Plantago coronopus* L. "Hierba estrella".
Anual o perenne; 3-30 cm.; Mz-Jl; zonas pisoteadas, bordes
de caminos. (MF).
- (n) *Plantago lagopus* L. "Pie de liebre".
Anual o perenne; 8-25 cm.; Ab-Jn; pastizales entre tomilla-
res, bordes de caminos. (E).

- (n) *Plantago lanceolata* L. "Llantén menor".
Perenne; 10-40 cm.; My-Jl; cunetas húmedas, prados y céspedes de jardines. (F).
- (n) *Plantago major* L. "Llantén mayor", "Lengua de oveja".
Perenne; 5-30 cm.; Jn-S; cunetas húmedas, prados (F).
- (n) *Plantago sempervirens* Crantz "Zaragatona".
Mata; 15-40 cm.; My-Jl; matorrales nitrificados, campos incultos. (E).

PLUMBAGINACEAS

- (n) *Armeria filicaulis* (Boiss.).
Perenne; 20-40 cm.; My-Jl; tomillares y matorrales en laderas pedregosas. (E).
- (n) *Limonium echioïdes* (L.) Miller "Acelguilla espinosa".
Anual; 10-30 cm.; My-Jl; pastizales entre tomillares, bordes de caminos y suelos yesíferos. (F).
- (n) *Plumbago europaea* L. "Belesa", "Hierba de San Antonio".
Perenne; 20-80 cm.; Jn-O; bordes de caminos. (E).

PRIMULACEAS

- (n) *Anagallis arvensis* L. "Muraje".
Anual o bianual; 8-40 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos y campos incultos. (F).
- (n) *Androsace máxima* L. "Cantarillos", "Picacuellos".
Anual; 3-12 cm.; Mz-My; cultivos cerealista, laderas pedregosas. (E).
- (n) *Asterolinon linum-stellatum* (L.) Duby "Lino de lagartijas".
Anual; 3-12 cm.; Mz-My; pastizales efímeros entre tomillares. (F).
- (n) *Coris monspeliensis* L. "Pincel", "Periquillo".
Bianual o perenne; 8-20 cm.; My-Jl; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Samolus valerandi* L. "Pajarilla de agua".
Perenne; 8-50 cm.; Jn-S; márgenes de cursos de agua. (E).

RUBIACEAS

- (n) *Asperula hirsuta* Desf. "Asperilla".
Perenne; 15-50 cm.; My-Jl; matorrales y espartales. (F).
- (n) *Callipeltis cucularis* (L.) Rothm.
Anual; 5-15 cm.; Ab-Jn; pastizales entre tomillares en zonas frías al este del territorio. (E).
- (n) *Crucianella angustifolia* L. "Espigadilla".
Anual; 10-40 cm.; My-Jl; bordes de caminos y campos incultos. (E).

- (n) *Galium aparine* L. "Amor de hortelano", "Azotalenguas".
 Anual tendida o fijada a otras plantas, muy áspera; hasta 1'5 m.; Ab-Jn; herbazales en cunetas húmedas muy nitrificadas. (F).
- (n) *Galium boissierianum* Ehrend & Krendl.
 Perenne, algo leñosa en la base; 15-40 cm.; Ab-Jl; fisuras de rocas al sur del territorio. (E).
- (n) *Galium fruticosens* Cav. "Galio leñoso".
 Perenne, algo leñosa en la base; 15-50 cm.; My-Jl; laderas pedregosas. (E).
- (n) *Galium lucidum* All.
 Perenne, algo leñosa en la base; 20-60 cm.; My-Jl; tomillares en laderas pedregosas. (F).
- (n) *Galium parisiense* L. "Espunidella blanca".
 Anual; 5-30 cm.; My-Jn; pastizales efímeros entre tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Galium spurium* L. "Amor de hortelano".
 Anual tendida o fijada a otras plantas, muy áspera; hasta 1'2 m.; Ab-My; herbazales primaverales en sotobosques de olmedas y cunetas frescas. (E).
- (n) *Galium tricornutum* Dandy "Galio de tres flores".
 Anual, áspera al tacto; 0, 1-0, 7 m.; Mz-My; cultivos cerealistas, bordes de caminos y campos incultos. (MF).
- (n) *Galium verum* L. "Cuajaleche", "Hierba sanjuanera".
 Perenne; 0, 3-0, 7 m.; Jn-S; prados y cunetas húmedas. (E).
- (n) *Rubia peregrina* L. "Raspalengua".
 Perenne trepadora, leñosa en la base, muy áspera; 0, 3-1, 2 m.; My-Ag; encinares y zarzales de bosques de ribera. (F).
- (n) *Sherardia arvensis* L.
 Anual, a menudo tendida; 10-40 cm.; Ab-Jn; herbazales de bordes de caminos. (F).

SOLANACEAS

- (c) *Capsicum annuum* L. "Pimiento".
 Anual o bianual; 20-60 cm.; Jn-S; huertas. (E).
- (c) *Cestrum parqui* L'Hér. "Palqui".
 Arbusto caducifolio; 1-3 m.; Jn-S; parques. (E).
- (s) *Datura stramonium* L. "Estramonio", "Trompentilla".
 Anual; 0, 4-1 m.; Jl-O; regadíos y cunetas húmedas. (F).
- (n) *Hyoscyamus albus* L. "Beleno blanco".
 Anual o perenne; 0, 2-0, 7 m.; My-Ag; cunetas muy nitrificadas, vertedoros. (E).
- (n) *Hyoscyamus niger* L. "Beleno negro".
 Anual o bianual; 0, 2-0, 6 m.; Ab-Jl; bordes de caminos, vertedoros. (E).

- (s) *Lycium europaeum* L. "Arto", "Cambrón blanco".
 Arbusto caducifolio espinoso; 1-4 m.; Jl-D; márgenes de caminos dentro de pueblos. (F).
- (c) *Lycopersicon esculentum* Miller "Tomatera".
 Anual, erecta o tendida; 0, 4-0, 8 m.; Jl-O; huertas. (F).
- (n) *Solanum dulcamara* L. "Amargamiel", "Uvas del diablo".
 Perenne, leñosa en la base; 0, 3-1 m.; Jn-S; sotobosques de ribera. (E).
- (c) *Solanum melongena* L. "Berenjena".
 Anual o perenne, erecta o tendida; 30-70 cm.; Jn-S; huertas. (E).
- (n) *Solanum nigrum* L. "Hierba mora", "Tomatillos del diablo".
 Anual; 20-50 cm.; My-O; cunetas húmedas y muy nitrificadas. (E).
- (c) *Solanum tuberosum* L. "Patatera".
 Anual o perenne; 0, 3-0, 7 m.; Jn-O; huertas. (E).

VALERIANACEAS

- (n) *Centranthus calcitrapae* (L.) Dufresne "Valeriana española".
 Anual; 10-50 cm.; Ab-Jn; pastizales y cunetas frescas. (F).
- (c)(s) *Centranthus ruber* (L.) DC. "Valeriana roja".
 Mata; 0, 3-0, 7 m.; My-Jl; bases húmedas de muros al sur del territorio. (E).
- (n) *Valerianella coronata* (L.) DC.
 Anual; 5-20 cm.; Ab-Jn; cultivos cerealistas. (E).
- (n) *Valerianella discoidea* (L.) Loisel. "Hierba de los canónigos".
 Anual; 5-20 cm.; Ab-Jn; pastizales efímeros entre tomillares y espartales. (E).

VERBENACEAS

- (n) *Verbena officinalis* L. "Verbena", "Hierba de los hechizos".
 Perenne; 0, 3-0, 6 m.; Jn-O; zonas húmedas y nitrificadas. (E).

Tiene por tanto un gran interés el estudio de los componentes responsables del aroma del vino, así como el estudio de las condiciones más favorables para obtener vinos de la mayor calidad aromática.

Estas condiciones han sido estudiadas para numerosos vinos. Sin embargo, los vinos más estudiados son los que tienen un elevado