

CATALOGO DIDACTICO DE LAS
PLANTAS FANEROGAMAS MAS
CARACTERISTICAS DE LOS
ALREDEDORES DE LA CIUDAD DE
ALBACETE. SEGUNDA PARTE

A. Valdés Franzí *

R. Molina Cantos*

*Arturo Valdés Franzí.- Doctor en Biología (Botánica).
Catedrático de E.U. Tiene publicados diversos trabajos de
investigación sobre Flora y Vegetación del norte de Extre-
madura, Sistema Central, Albacete, y de Didáctica de la
Biología.*

*Rafael Molina Cantos.- Licenciado en Biología. Becario
de Investigación (Plan F.P.I.).*

Introducción

Con esta nota florística continuamos la publicación del catálogo de plantas iniciado recientemente.⁽¹⁾ Nos referimos a las Dialipétalas, que constituyen el grupo más numeroso de Fanerógamas.

Seguimos fielmente los criterios contenidos en la 5.^a edición del clásico *Tratado de Botánica* de Strasburger & al.⁽²⁾ a la hora de dividir las Dicotiledóneas en Monoclamídeas (sin periantio, o periantio sencillo raramente petaloideo), Dialipétalas (cáliz y corola, ésta de pétalos libres) y Simpétales o Gamopétalas (cáliz y corola, ésta con pétalos más o menos soldados). Estos criterios no siempre son coincidentes en otras botánicas clásicas como las de Coste⁽³⁾ y la de Losa, Rivas & Muñoz-Medina.⁽⁴⁾

La razón de ello es la dificultad de delimitar exactamente las familias con base en caracteres como la apetalia, dialipetalia, simpe-

(*) E.U. del Profesorado de EGB de Albacete.

(1) Revista *Ensayos* n.º 1, pp. 209-220. Albacete. 1987.

(2) Ed. Marín. Barcelona. 1971.

(3) *Flore descriptive et illustrée de la France*. París. 1937.

(4) *Botánica descriptiva. II. Fanerogamia*. Impr. Urania. Granada. 1961.

talia, etc. Evolutivamente los grupos de plantas han ido adquiriendo paulatinamente nuevos caracteres, así los pétalos soldados a partir de antecesores dialipétalos. Otras veces, la falta de uno o los dos verticilos del periantio puede ser un carácter derivado de antecesores que los poseían y no un carácter primitivo.

Así es frecuente que en algunas familias genuinamente Dialipétalas aparezcan especies con flores apétalas. Tal es el caso del género *Herniaria*, *Paronychia*... en las Cariofiláceas, *Rhamnus* en Ramnáceas, *Clematis* en Ranunculáceas, *Sanguisorba*... en Rosáceas, *Pistacia* en Anacardiáceas, *Ceratonia* en Leguminosas, etc. El género *Fraxinus*, hoy día incluido en las simpétalas Oleáceas, presenta algunas especies sin periantio.

Las Platanáceas se consideran Dialipétalas, aunque los *Platanus* que conocemos tienen las flores desnudas; las Aristolochiáceas, Eleagnáceas y Timeleáceas han perdido la corola, aunque tienen un cáliz coloreado, petaloideo. Por estas razones, las cuatro familias son tratadas por Coste como Monoclamídeas.

Las Crasuláceas presentan algún género con pétalos soldados (*Umbilicus*), las Malváceas pueden tener los pétalos algo soldados en la base. Las Portulacáceas ya han sido tratadas entre las Monoclamídeas porque sus piezas coloreadas son interpretadas como un cáliz y las exteriores a ellas como un cálculo. Las Cucurbitáceas, finalmente, se consideran Simpétalas, aunque tienen representantes casi dialipétalos.

Hemos decidido añadir un nuevo dato de cada especie citada: el grado de presencia estimado para la comarca. Empleamos las siguientes abreviaturas:

- (E) Escasa.
- (F) Frecuente.
- (MF) Muy frecuente.

DICOTILEDONEAS DIALIPETALAS

ACERÁCEAS

- (c) *Acer negundo* L. "Arce americano", "Negundo".
Arbol caducifolio; 6-15 m.; F-Mr; parques y paseos. (F).
- (c) *Acer pseudoplatanus* L. "Falso plátano", "Sicomoro".
Arbol caducifolio; 8-20 m.; Mr-Ab; parques. (E).

ANACARDIACEAS

- (n) *Pistacia lentiscus* L. "Lentisco", "Charneca".
Arbusto perennifolio; 2-5 m.; Mr-Jn; encinares laderas soleadas. (E).

- (n) *Pistacia terebinthus* L. "Cornicabra", "Terebinto".
Arbusto caducifolio; 2-4 m.; Mr-Jn; encinares. (E).
- (n) *Rhus coriaria* L. "Zumaque".
Arbusto caducifolio; 1-3 m.; My-Jl; bordes de caminos. (E).

ARALIACEAS

- (n)(c) *Hedera helix* L. "Hiedra".
Arbusto perennifolio trepador; 1-20 m.; Ag-O; parques, riberas del Júcar. (F).

ARISTOLOQUIACEAS

- (n) *Aristolochia longa* L. "Candilicos", "Aristolochia larga".
Perenne rastrera; 20-60 cm.; My-Jn; bordes húmedos de acequias. (E).
- (n) *Aristolochia pistolochia* L. "Serpentaria", "Aristolochia menor".
Perenne rastrera; 20-60 cm.; Ab-Jn; laderas pedregosas, matorrales. (F).

BERBERIDACEAS

- (c) *Berberis vulgaris* L. "Agracejo".
Arbusto caducifolio; 1-2'5 m.; Ab-My; parques y jardines. (E).
- (c) *Mahonia aquifolium* (Pursh) Nutt. "Mahonia".
Arbusto perennifolio; 0'5-2 m.; Mr-Ab; parques. (E).

CELASTRACEAS

- (c) *Eunonymus japonicus* L. "Bonetero".
Arbusto perennifolio; 1-4 m.; Ab-My; parques y jardines. (F).

CISTACEAS

- (n) *Cistus albidus* L. "Ardivieja", "Estepa blanca".
Mata o pequeño arbusto; 0'4-1 m.; Mr-My; matorrales en laderas soleadas. (E).
- (n) *Cistus clusii* Dunal in DC. "Jara de hoja de romero", "Jaraca".
Mata o pequeño arbusto; 0'3-0'8 m.; Ab-Jn; matorrales. (MF).
- (n) *Fumana ericoides* (Cav.) Gand. "Sillerilla".
Mata; hasta 30 cm.; Ab-Jl; tomillares y matorrales. (F).

- (n) *Fumana thymifolia* (L.) Spach ex Webb “Tomillo morisco”.
Mata; 5-25 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales. (MF).
- (n) *Halimium viscosum* (Willk). P. Silva “Jaguarillo”.
Mata; 20-50 cm.; My-Jn; tomillares y matorrales sobre rañizos. (E).
- (n) *Helianthemum apenninum* (L.) Miller
Mata; 10-40 cm.; Mr-Jn; tomillares y matorrales. (E).
- (n) *Helianthemum asperum* Lag. ex Dunal.
Mata; 10-30 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Helianthemum cinereum* (Cav.) Pers.
Mata; 10-30 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales. (MF).
- (n) *Helianthemum hirtum* (L.) Miller “Tamarilla borde”.
Mata; 10-30 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Helianthemum lavandulifolium* Miller “Hierba sana”, “Jaguarzo valenciano”.
Mata; 10-50 cm.; My-Jl; tomillares y matorrales, margas. (F).
- (n) *Helianthemum pilosum* (L.) Pers. “Perdiguera”, “Tamarilla blanca”.
Mata; 10-30 cm.; Mr-Jn; tomillares y matorrales. (MF).
- (n) *Helianthemum salicifolium* (L.) Miller “Jaguarzo castellano”.
Anual; 5-20 cm.; Ab-My; pastizales efímeros entre matorral y encinar, bordes de caminos. (F).
- (n) *Tuberaria guttata* (L.) Fourr. “Hierba turmera”, “Mirasol”.
Anual; 10-25 cm.; My-Jn; pastizales efímeros sobre rañizos. (E).

CRASULACEAS

- (n) *Pistorinia hispanica* (L.) DC. “Uña de gato encarnada”.
Anual suculenta; 5-15 cm.; Jn; laderas pedregosas. (E).
- (n) *Sedum acre* L. “Pampajarito”, “Uva de pájaro”.
Perenne suculenta; 5-20 cm.; Jn-Jl; bordes subnitrófilos de caminos. (F).
- (n) *Sedum album* L. “Uva de gato”.
Perenne suculenta; 5-20 cm.; Jn-Ag; paredones y tejados. (E).
- (n) *Sedum dasyphyllum* L. “Aizoa bastarda”.
Perenne suculenta; 5-15 cm.; Jn-Jl; fisuras de rocas. (E).
- (n) *Sedum sediforme* (Jacq.) Pau “Uña de gato”, “Uva de pájaro”.
Perenne suculenta; 25-55 cm.; Jn-Ag; matorrales sobre suelos pedregosos. (E).
- (n) *Umbilicus rupestris* (Salisb.) Dandy “Ombligo de Venus”.

Perenne suculenta; 20-40 cm.; Jn-Jl; bases húmedas de muros. (E).

CRUCIFERAS

- (n) *Alyssum alyssoides* (L.) L. "Hierba de la rabia".
Anual o bianual; 8-30 cm.; Ab-My; pastizales efímeros subnitrófilos. (F).
- (n) *Alyssum granatense* Boiss. & Reuter.
Anual; 3-20 cm.; Ab-My; pastizales efímeros subnitrófilos. (E).
- (n) *Alyssum linifolium* Stephan & Willd.
Anual; 5-30 cm.; Mr-Ab; bordes de caminos y cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Alyssum minus* (L.) Rothm. "Hierba de la rabia".
Anual; 8-30 cm.; Mr-My; bordes de caminos y cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Alyssum serpyllifolium* Desf. "Broqueletes blancos".
Perenne; 10-30 cm.; Ab-Jn; tomillares. (E).
- (n) *Arabis parvula* Dufour
Anual; 5-20 cm.; Ab-My; pastizales efímeros en claros de tomillar y matorral. (E).
- (n) *Arabis recta* Vill.
Anual; 8-30 cm.; Mr-My; pastizales efímeros en claros de tomillar y matorral, bordes de caminos. (F).
- (n) *Biscutella auriculata* L. "Anteojos de Santa Lucía", "Anteojera".
Perenne; 15-55 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos y cultivos cerealistas. (MF).
- (n) *Biscutella valentina* (L.) Heywood "Anteojera de roca".
Perenne, leñosa en la base; 15-45 cm.; Ab-Jn; fisuras de rocas, bordes de caminos y matorrales. (F).
- (n) *Brassica fruticulosa* Cyr.
Anual o perenne; 20-50 cm.; Ab-My; zonas nitrificadas, bordes de caminos. (E).
- (c) *Brassica napus* L. "Nabo".
Anual o bianual; hasta 1'5 m.; Ab-My; huertas. (E).
- (c)(s) *Brassica oleracea* L. "Col", "Berza".
Bianual o perenne; hasta 2'5 m.; Ab-Jn; huertas. (F).
- (n) *Brassica repanda* (Willd.) DC.
Bianual; 20-50 cm.; Jn-Jl; laderas pedregosas, tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Calepina irregularis* (Asso) Thell.

- Anual o bianual; 25-75 cm.; My-Jn; herbazales de márgenes de caminos. (F).
- (n) *Camelina microcarpa* Andr. ex DC. "Alegría falsa", "Sésamo bastardo".
Anual o bianual; 15-60 cm.; Ab-Jn; herbazales de bordes de caminos y cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus "Bolsa de pastor".
Anual o bianual; 10-50 cm.; Mr-My; bordes de caminos, cultivos cerealistas, campos incultos. (MF).
- (n) *Capsella rubella* Reut.
Anual o bianual; 10-50 cm.; Mr-My; lugares muy nitrificados: cunetas, basureros, etc. (E).
- (n) *Cardaria draba* (L.) Desv. "Draba", "Capellanes".
Perenne; 20-80 cm.; Mr-Jn; campos incultos, bordes de caminos. (MF).
- (c) *Cheiranthus cheiri* L. "Alhelí".
Perenne; 20-80 cm.; My-Jl; jardines. (F).
- (n) *Clypeola jonthlaspi* L. "Hierba rodela".
Anual; 5-20 cm.; Mr-Ab; pastizales efímeros, bordes de caminos. (E).
- (n) *Conringia orientalis* (L.) Dumort. "Moriscolas", "Collejón".
Anual; 10-50 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas. (E).
- (n) *Descurainia sophia* (L.) Webb ex Prantl. "Hierba de la sabiduría".
Anual o bianual; 20-80 cm.; Mr-Jn; bordes de caminos, campos incultos y cultivos cerealistas. (MF).
- (n) *Diplotaxis eruroides* (L.) DC. "Jaramago blanco", "Rabaniza blanca".
Anual o bianual; 10-50 cm.; todo el año; bordes de caminos, cultivos. (MF).
- (n) *Diplotaxis virgata* (Cav.) DC. "Jaramago", "Boja amarilla".
Anual; 10-70 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, cultivos. (F).
- (n) *Erophila verna* (L.) Chevall. "Yerbecilla temprana".
Anual; 5-20 cm.; Mr-Ab; pastizales efímeros entre matorrales, bordes de caminos. (F).
- (n) *Eruca vesicaria* (L.) Cav. "Oruga blanca".
Anual; 30-100 cm.; Mr-Jn; bordes de caminos, zonas muy nitrificadas. (MF).
- (n) *Hirschfeldia incana* (L.) Lagr.-Fossat "Roqueta bastarda", "Citro".
Anual o perenne; 30-90 cm.; My-Jl; bordes de caminos, campos incultos. (MF).

- (n) *Hornungia petraea* (L.) Reichenb. "Mastuerzo de piedras".
Anual; 3-15 cm.; Mr-My; pastizales efímeros en claros de tomillar y matorral. (F).
- (n) *Hymenolobus procumbens* (L.) Nutt.
Anual o bianual; 3-10 cm.; Mr-Ab; pastizales efímeros en zonas subsalinas. (E).
- (n) *Iberis ciliata* All.
Anual o perenne; 15-30 cm.; Ab-Jn; matorrales en laderas, zonas subnitrofilas. (E).
- (n) *Lepidium campestre* (L.) R. Br. "Mostaza silvestre".
Anual o bianual; 20-50 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, campos incultos. (E).
- (n) *Lepidium cardamine* L.
Bianual; 10-20 cm.; Ab-Jn; suelos subsalinos. (E).
- (n) *Lepidium subulatum* L. "Boja", "Hierba de las pecas".
Mata; 10-25 cm.; Ab-Jl; sobre yesos. (E).
- (n) *Lobularia maritima* (L.) Desv. "Mastuerzo marino", "Miramar".
Perenne; 5-35 cm.; Ab-Jn; laderas calcáreas, zonas subnitrofilas. (F).
- (n) *Matthiola fruticulosa* (L.) Maire "Alhelí de campo".
Perenne, leñosa en la base; 15-55 cm.; Ab-Jn; entre matorrales sobre suelos margosos y yesíferos.
- (n) *Moricandia arvensis* (L.) DC. "Collejón", "Berza boba".
Perenne; 15-60 cm.; todo el año; bordes de caminos, zonas nitrificadas. (MF).
- (n) *Nasturtium officinale* R. Br. "Berro", "Mastuerzo acuático".
Perenne, rastrera o flotadora; 10-60 cm.; Ab-Jn; márgenes encharcados de cursos de agua. (F).
- (n) *Neslia paniculata* (L.) Desv. "Tamarillas".
Anual; 15-60 cm.; Ab-Jn; cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Ptilotrichum lapeyrousianum* (Jordan) Jordan
Mata; 10-30 cm.; My-Jn; matorrales en laderas pedregosas. (E).
- (c) *Raphanus sativus* L. "Rábano".
Anual o bianual; 30-70 cm.; My-Ag; huertas. (E).
- (n) *Rapistrum rugosum* (L.) All. "Tamarillas", "Rabanillo".
Anual; 10-50 cm.; Ab-Jn; lugares nitrificados. (F).
- (n) *Sinapis alba* L. "Mostaza blanca".
Anual; 20-70 cm.; Ab-Jl; zonas algo húmedas muy nitrificadas. (E).
- (n) *Sisymbrium austriacum* Jacq. "Rabanillo de hoja de

amargón”.

Bianual o perenne; 10-80 cm.; My-Jl; herbazales de bordes de caminos, campos incultos. (F).

- (n) *Sisymbrium crassifolium* Cav. “Rabanillo de hoja gruesa”.
Bianual o perenne; 30-80 cm.; Mr-My; bordes de caminos, campos incultos. (E).
- (n) *Sisymbrium irio* L. “Matacandil”, “Partesana”.
Anual; 20-50 cm.; F-My; basureros, bordes nitrificados de caminos. (F).
- (n) *Sisymbrium orientale* L. “Rabaniza morisca”.
Anual; 20-80 cm.; Ab-My; bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Sisymbrium runcinatum* Lag. ex DC. “Yerba de San Alberto”.
Anual; 10-40 cm.; Mr-My; bordes de caminos muy nitrificados. (F).

ELEAGNACEAS

- (c)(s) *Elaeagnus angustifolia* L. “Cinamomo”, “Arbol del paraíso”.
Arbusto o árbol caducifolio; 2-7 m.; Ab-My; parques, bordes de caminos. (F).

FRANQUENIACEAS

- (n) *Franqueniana pulverulenta* L. “Alcohol”, “Flor de golondrina”.
Anual; 7-25 cm.; My-O; suelos salinos algo nitrificados. (E).

GERANIACEAS

- (n) *Erodium ciconium* (L.) L'Hér. “Cigüeñas”, “Relojes”.
Anual o bianual; 15-65 cm.; Mr-My; bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Erodium cicutarium* (L.) L'Hér. “Alfilerillo de pastor”.
Anual; 10-40 cm.; F-My; cunetas frescas y zonas umbrosas nitrificadas. (F).
- (n) *Erodium malacoides* (L.) L'Hér. “Cigüeña malva”, “Filarmaría”.
Anual o bianual; 10-50 cm.; Mr-My; herbazales nitrificados, basureros. (E).
- (n) *Geranium dissectum* L. “Geranio cortado”.
Anual; 15-50 cm.; Ab-Jn; herbazales nitrificados y húmedos de cunetas y bordes de cursos de agua. (E).
- (n) *Geranium lucidum* L. “Geranio de hoja brillante”.
Anual; 10-40 cm.; Mr-My; herbazales nitrificados, húmedos y

umbríos en sotobosque de olmedas. (E).

- (n) *Geranium molle* L. "Geranio blando".
Anual; 10-30 cm.; Mr-My; herbazales nitrificados, frescos y umbríos. (E).
- (n) *Geranium purpureum* Vill.
Anual o bianual; 15-50 cm.; Mr-My; herbazales nitrificados, frescos y umbríos. (E).
- (n) *Geranium pusillum* L. "Geranio enanito", "Aguijilla de Salamanca".
Anual; 10-30 cm.; Ab-Jn; cunetas terrosas, terraplenes y pie de muros. (E).
- (n) *Geranium rotundifolium* L. "Sausana".
Anual; 10-30 cm.; Mr-Jn; cunetas frescas, campos incultos y basureros. (F).

HIDRANGEACEAS (FILADELFACEAS)

- (c) *Hydrangea macrophylla* (Thunb.) Seringe in DC. "Hortensia".
Arbusto caducifolio; 0'5-1'5 m.; Jn-Ag; jardines. (E).
- (c) *Philadelphus coronarius* L. "Celinda", "Filadelfo".
Arbusto caducifolio; 1-3 m.; My; parques y jardines. (F).

HIPERICACEAS (GUTIFERAS)

- (n) *Hypericum ericoides* L. "Corazón de peña".
Mata; 2-15 cm.; My-Jn; fisuras rocas calcáreas en zonas termófilas. (E).
- (n) *Hypericum perforatum* L. "Hierba de San Juan", "Hipérico".
Perenne; 20-90 cm.; My-Ag; bordes de caminos, campos incultos. (MF).

HIPOCASTANACEAS

- (c) *Aesculus hippocastanum* L. "Castaño de Indias".
Arbol caducifolio; 8-20 m.; Ab-Jn; parques y paseos. (F).

LAURACEAS

- (c) *Laurus nobilis* L. "Laurel".
Arbusto perennifolio; 2-6 m.; Mr-Ab; jardines. (E).

LEGUMINOSAS (PAPILIONACEAS)

- (c) *Acacia dealbata* Link "Mimosa", "Acacia".

- Arbol perennifolio; 7-15 m.; F-Mr; parques. (E).
- (n) *Anthyllis cytisoides* L. "Albaida".
Mata o pequeño arbusto; 20-80 cm.; F-Jn; matorrales en laderas termófilas del valle del Júcar. (E).
- (n) *Anthyllis henoniana* Cosson ex Batt.
Mata; 15-55 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales de zonas áridas. (E).
- (n) *Anthyllis vulneraria* L. "Vulneraria".
Bianual o perenne, rastrera; 10-40 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, matorrales y tomillares. (F).
- (n) *Argyrobium zanonii* (Turra) P. W. Ball "Hierba de la plata".
Perenne, leñosa en la base; 10-25 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales, fisuras de rocas. (F).
- (n) *Astragalus clusii* Boiss. "Granévalo", "Hierba de Santa María".
Perenne espinosa; 10-20 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Astragalus hamosus* L.
Anual; 15-50 cm.; Ab-Jn; matorrales y campos incultos. (F).
- (n) *Astragalus incanus* L. "Estacarrocines", "Gallicos".
Perenne, acaule; 8-20 cm.; Ab-Jn; tomillares. (F).
- (n) *Astragalus monspessulanus* L.
Perenne, acaule; 10-20 cm.; Ab-Jn; tomillares en laderas pedregosas. (E).
- (n) *Astragalus polyactinus* Boiss.
Anual; 5-20 cm.; My-Jn; laderas pedregosas. (E).
- (n) *Astragalus stella* Gouan "Astrálogo estrellado", "Estrellita cana".
Anual; 5-15 cm.; Mr-My; bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (c) *Cercis siliquastrum* L. "Arbol del amor", "Arbol de Judas".
Arbusto o pequeño árbol caducifolio; 3-10 m.; Mr-Ab; parques y paseos. (MF).
- (n) *Chronanthus biflorus* (Desf.) Frodin & Heyw. "Bolilla", "Ginestrina borde".
Mata o pequeño arbusto; 30-70 cm.; My-Jn; retamares y matorrales. (E).
- (c) *Cicer arietinum* L. "Garbanzo".
Anual; 20-70 cm.; My-Jn; cultivos de leguminosas. (F).
- (n) *Coronilla minima* L. "Coronilla de rey", "Lentejuela valenciana".
Mata; 20-40 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales. (F).

- (n) *Coronilla scorpioides* (L.) Koch "Alacranera".
Anual; 10-40 cm.; Mr-Jn; bordes de caminos, zonas nitrificadas y cultivos cerealistas. (F).
- (c) *Coronilla valentina* L. "Coronilla", "Carolina".
Pequeño arbusto; 0'5-1'5 m.; Ab-My; jardines. (E).
- (n) *Dorycnium pentaphyllum* Scop. "Mijediega", "Socarrillo".
Mata o arbusto pequeño; 15-80 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Erinacea anthyllis* Link "Piorno azul", "Tollaga".
Mata espinosa; 10-50 cm.; Mr-My; matorrales almohadillados de zonas frías y pedregosas. (E).
- (n) *Genista pumila* (Deb. & Rev. ex Herv.) Vierh. "Cambrón", "Escambrón".
Mata o pequeño arbusto espinoso; 40-80 cm.; Ab-Jn; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Genista scorpius* (L.) DC. "Aulaga", "Aliaga".
Arbusto espinoso; 0'5-1'5 m.; E-My; matorrales. (MF).
- (c) *Gleditsia triacanthos* L. "Acacia de tres espinas".
Arbol caducifolio; 10-25 m.; Jn-Jl; parques. (F).
- (n) *Hedysarum humile* L. "Estacarriones", "Sulla silvestre".
Perenne; 20-50 cm.; Ab-Jn; matorrales. (E).
- (n) *Hippocrepis bourgaei* (Nyman) Hervier "Herradura".
Perenne; 10-40 cm.; Ab-Jl; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Hippocrepis ciliata* Willd. "Herradura de caballo".
Anual; 5-30 cm.; Mr-My; pastizales efímeros entre matorrales. (F).
- (n) *Hippocrepis squamata* (Cav.) Cosson
Perenne; 10-40 cm.; Mr-Jn; tomillares y matorrales. (E).
- (c) *Laburnum anagyroides* Medicus "Lluvia de oro".
Arbusto caducifolio; 1'5-4 m.; Ab-My; parques y jardines. (E).
- (n) *Lathyrus cicera* L. "Almorta silvestre", "Cicércula".
Anual rastrera o trepadora; 20-90 cm.; Mr-My; bordes de caminos, cultivos. (F).
- (n) *Lathyrus hirsutus* L.
Anual rastrera o trepadora; 20-100 cm.; Ab-Jn; mala hierba de jardines y zonas algo húmedas. (E).
- (c) *Lathyrus sativus* L. "Guijas", "Almortas".
Anual rastrera o trepadora; 20-90 cm.; My-Jn; huertas. (E).
- (c) *Lens culinaris* Medicus "Lenteja".
Anual; 20-50 cm.; My-Jn; cultivos de leguminosas. (F).
- (n) *Lotus corniculatus* L. "Zapatitos de la Virgen", "Pie de

- gallo”.
- Perenne; 10-30 cm.; My-Ag; zonas algo húmedas y nitrificadas. (E).
- (n) *Lotus tenuis* Waldst. et Kit. ex Willd.
Perenne; 20-80 cm.; Jn-O; regadíos. (E).
- (n) *Lygos sphaerocarpa* (L.) Heywood “Retama común”, “Retama de bolas”.
- Arbusto caducifolio; 1-3 m.; Jn-Jl; retamares y encinares aclarados. (F).
- (n) *Medicago lupulina* L.
Anual o perenne; 10-50 cm.; Mr-Jn; zonas algo húmedas en jardines. (F).
- (n) *Medicago minima* (L.) Bartal “Carretilla menor”.
- Anual; 15-40 cm.; Mr-Jn; herbazales de bordes de caminos. (MF).
- (n) *Medicago orbicularis* (L.) Bartal “Mielga de caracolillo”, “Tortezuela”.
- Anual rastrera; 20-80 cm.; Mr-My; zonas nitrificadas, bordes de caminos. (F).
- (n) *Medicago rigidula* (L.) All. “Carretilla espinosa”.
- Anual rastrera; 20-50 cm.; Mr-My; herbazales de bordes de caminos. (MF).
- (n)(c) *Medicago sativa* L. “Alfalfa”, “Mielga”.
- Perenne; 20-80 cm.; My-O; bordes de caminos, cultivada en regadíos. (MF).
- (n) *Medicago suffruticosa* Ramond ex DC.
Perenne; 5-35 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos. (E).
- (n) *Melilotus alba* Medicus “Trébol de Santa María”, “Meliloto blanco”.
- Anual o bianual; 20-120 cm.; Jn-S; bordes húmedos y nitrificados de caminos. (E).
- (n) *Melilotus indica* (L.) All.
Anual; 15-45 cm.; Jn-O; herbazales de bordes húmedos de caminos. (E).
- (n) *Melilotus officinalis* (L.) Pallas “Coronilla real”, “Trébol oloroso”.
- Bianual; 30-150 cm.; Jn-N; herbazales de bordes de caminos. (F).
- (n) *Onobrychis peduncularis* (Cav.) DC. “Espanceta gris”.
- Perenne; 10-50 cm.; Ab-Jn; tomillares. (E).
- (n) *Ononis fruticosa* L. “Garbancera”, “Hierba melera”.
- Mata o pequeño arbusto; 20-90 cm.; My-Jn; matorrales. (E).

- (n) *Ononis natrix* L. "Pegamoscas", "Hierba culebra".
Mata; 20-50 cm.; Ab-Jn; herbazales de bordes de caminos. (F).
- (n) *Ononis pusilla* L.
Perenne, leñosa en la base; 8-25 cm.; Ab-Jl; tomillares y matorrales. (F).
- (n) *Ononis spinosa* L. "Quiebraarados", "Gatuña".
Mata o arbusto pequeño; 20-70 cm.; Jn-Ag; bordes de caminos. (F).
- (n) *Ononis tridentata* L. "Arnallo", "Carretón garbancero".
Mata; 15-60 cm.; My-O; matorrales sobre suelos yesíferos. (E).
- (c) *Phaseolus vulgaris* L. "Judía común", "Alubia".
Anual trepadora; hasta 3'5 m.; Jn-Ag; cultivos de leguminosas. (F).
- (c) *Pisum sativum* L. "Guisante", "Chicharo".
Anual trepadora; hasta 1'8 m.; My-Jl; cultivos de leguminosas. (E).
- (n) *Psoralea bituminosa* L. "Hierba cabruna", "Trébol hediondo".
Perenne, a menudo rastrera; 20-80 cm.; Ab-Jl; bordes pedregosos de caminos. (E).
- (c)(s) *Robinia pseudacacia* L. "Falsa acacia".
Arbol caducifolio; 7-20 m.; My-Jn; parques y paseos. (MF).
- (n) *Scorpiurus muricatus* L. "Lengua de oveja".
Anual, a veces rastrera; 20-70 cm.; Mr-My; bordes nitrificados de caminos. (E).
- (c) *Sophora japonica* L. "Acacia del Japón".
Arbol caducifolio; 7-20 m.; Jn-Ag; parques y paseos. (E).
- (c) *Spartium junceum* L. "Retama olorosa", "Gayumba".
Arbusto caducifolio; 0'8-2'5 m.; My-Jn; parques y jardines. (E).
- (n) *Trifolium arvense* L. "Pie de liebre".
Anual; 5-35 cm.; My-Jn; pastizales sobre suelos con cantos silíceos. (E).
- (n) *Trifolium campestre* Schreber
Anual; 10-30 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, pastizales subnitrófilos. (E).
- (n)(c) *Trifolium pratense* L. "Trébol de los prados".
Perenne rastrera; 15-90 cm.; My-O; cunetas húmedas, prados, jardines. (F).
- (n)(c) *Trifolium repens* L. "Trébol blanco".

- Perenne rastrera; 15-80 cm.; My-O; prados, bordes de acequias y jardines. (F).
- (n) *Trigonella gladiata* Steven ex Biev.
Anual; 5-20 cm.; Ab-My; pastizales efímeros entre tomillares. (E).
- (n) *Trigonella monspeliaca* L. "Alfolva menor".
Anual; 5-30 cm.; Mr-My; herbazales de bordes de caminos, basureros. (F).
- (n) *Trigonella polyceratia* L.
Anual; 8-40 cm.; Mr-My; herbazales de bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Vicia benghalensis* L. "Arveja roja".
Anual o perenne, rastrera o trepadora; 20-70 cm.; Ab-My; herbazales de bordes de caminos, campos incultos. (E).
- (n) *Vicia ervilia* (L.) Willd. "Alcaraceña", "Titos".
Anual, rastrera o trepadora; 10-40 cm.; Ab-Jn; herbazales de bordes de caminos, cultivos. (E).
- (c) *Vicia faba* L. "Haba".
Anual; 0'4-1'5 m.; My-Jl; huertas. (F).
- (n) *Vicia peregrina* L. "Algarroba común".
Anual, rastrera o trepadora; 30-90 cm.; Ab-My; herbazales de bordes de caminos, campos incultos. (F).
- (n) *Vicia sativa* L. "Veza", "Arveja".
Anual, rastrera o trepadora; 20-70 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, mala hierba de cultivos. (F).

LINACEAS

- (n) *Linum narbonense* L. "Lino azul", "Lino bravo".
Perenne; 20-70 cm.; Ab-Jn; coscojares y matorrales. (F).
- (n) *Linum strictum* L. "Lino".
Anual; 10-40 cm.; Ab-Jn; pastizales efímeros entre tomillares, laderas pedregosas. (F).
- (n) *Linum suffruticosum* L. "Hierba sanjuanera", "Lino blanco".
Perenne, leñosa en la base; 10-40 cm.; My-Jl; tomillares y salviares. (F).
- (n) *Linum trigynum* L. "Lino amarillo".
Anual; 8-20 cm.; Ab-Jn; pastizales sobre suelos con cantos silíceos. (E).

LITRACEAS

- (n) *Lythrum castellanum* Gonz.-Albo ex Borja.

Anual o bianual; 5-15 cm.; Jn-S; bordes húmedos de charcas y lagunas ricas en sales. (E).

- (n) *Lythrum flexuosum* Lag. "Jopillo".

Anual rastrera; 10-25 cm.; Jn-O; bordes húmedos de charcas y lagunas ricas en sales. (E).

- (n) *Lythrum salicaria* L. "Arroyuela", "Salicaria".

Perenne; 50-130 cm.; Jn-O; márgenes encharcados de cursos de agua. (F).

MAGNOLIACEAS

- (c) *Magnolia grandiflora* L. "Magnolio".

Arbol perennifolio; 5-20 m.; My-Jl; parques y jardines. (E).

MALVACEAS

- (c)(s) *Alcea rosea* L. "Malva real".

Perenne; 0'5-2 m.; My-Ag; jardines y bordes de caminos cercanos a viviendas. (F).

- (n) *Althaea hirsuta* L. "Cañamera azul", "Malvavisco peludo".

Anual; 15-50 cm.; Ab-Jn; herbazales de bordes de caminos, campos incultos. (F).

- (c) *Hibiscus syriacus* L. "Rosa de Siria".

Arbusto caducifolio; 1-3 m.; Jn-O; parques y jardines. (F).

- (n) *Lavatera maritima* Gouan "Malvavisco marino", "Paloma de mar".

Mata o arbusto pequeño; 30-110 cm.; Ab-Jl; laderas pedregosas soleadas y algo nitrificadas. (E).

- (n) *Lavatera triloba* L. "Malvavisco loco".

Perenne, leñosa en la base; 20-70 cm.; My-Jl; campos incultos, prefiere suelos salinos. (E).

- (n) *Malva neglecta* Wallr. "Malva de hoja redonda".

Anual; 15-55 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos más o menos nitrificados. (F).

- (n) *Malva nicaeensis* All.

Anual o bianual; 20-100 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos y cultivos. (E).

- (n) *Malva parviflora* L. "Malvilla menor".

Anual; 20-50 cm.; Ab-Jn; zonas incultas y nitrificadas, bordes de caminos. (E).

- (n) *Malva sylvestris* L. "Malva común".

Bianual o perenne, a menudo rastrera; 30-130 cm.; My-Jl; bordes más o menos húmedos y nitrificados de caminos, basureros. (MF).

MELIACEAS

- (c) *Melia azedarach* L. "Lila de Persia", "Agrión".
Arbusto o árbol caducifolio; 3-10 m.; My-Jn; parques. (E).

MIRTACEAS

- (c) *Eucalyptus camaldulensis* Dehnh. "Eucalipto menor".
Arbol perennifolio; 5-20 m.; todo el año; bordes de carreteras, aldeas. (E).

ONAGRACEAS (ENOTERACEAS)

- (n) *Epilobium hirsutum* L. "Adelfilla", "Hierba de San Antonio".
Perenne; 0'4-1'5 m.; Jn-S; cunetas húmedas, bordes de acequias, espadañares y cañaverales. (F).

OXALIDACEAS

- (n) *Oxalis corniculata* L. "Falso trébol", "Quitatinta".
Perenne rastrera; 5-45 cm.; Ab-Jn; campos incultos, mala hierba en jardines. (E).

PAPAVERACEAS

- (n) *Fumaria densiflora* DC. "Palomilla romana".
Anual, a veces rastrera; 10-50 cm.; F-Ab; bordes terrosos de caminos, cultivos y mala hierba en jardines. (F).
- (n) *Fumaria mirabilis* Pugsley
Anual; 15-50 cm.; F-My; bordes terrosos de caminos, campos incultos. (E).
- (n) *Fumaria officinalis* L. "Palomilla común", "Gitanillas".
Anual, a veces rastrera; 10-60 cm.; F-My; bordes de caminos, escombreras y mala hierba en jardines. (MF).
- (n) *Fumaria parviflora* Lam. "Palomilla menuda".
Anual, a veces rastrera; 10-55 cm.; F-My; cultivos cerealistas, campos incultos y escombreras. (F).
- (n) *Glaucium corniculatum* (L.) J. H. Rud. "Hierba lagartera", "Amapola loca".
Anual o bianual; 10-40 cm.; Ab-My; cultivos cerealistas, campos incultos. (F).
- (n) *Hypocoum imberbe* Sibth. & Sm. "Zadorija", "Pamplina".
Anual; 10-40 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, herbazales de bordes de caminos. (MF).
- (n) *Hypocoum pendulum* L. "Zapatillas", "Flores de oro".

- Anual; 10-30 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas. (E).
- (n) *Papaver argemone* L. "Amapola macho".
Anual; 10-50 cm.; Ab-My; cultivos cerealistas, campos incultos. (F).
- (n) *Papaver dubium* L. "Ababol", "Amapola oblonga".
Anual; 15-50 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (E).
- (n) *Papaver hybridum* L. "Amapola triste".
Anual; 10-50 cm.; Ab-My; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (F).
- (n) *Papaver rhoeas* L. "Amapola común".
Anual; 20-80 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, bordes de caminos y escombreras. (MF).
- (s) *Papaver somniferum* L. "Adormidera".
Anual; 30-100 cm.; My; herbazales de bordes de caminos. (E).
- (n) *Platycapnos spicata* (L.) Bernh. "Sangre de Cristo".
Anual; 5-25 cm.; Mr-My; bordes terrosos de caminos, cultivos cerealistas. (E).
- (n) *Roemeria hybrida* (L.) DC. "Amapola violeta", "Ababol morado".
Anual o bianual; 10-40 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (F).
- (n) *Sarcocapnos enneaphylla* (L.) DC. "Arros", "Zapatitos de la Virgen".
Perenne rupícola; 5-15 cm.; My-Jn; fisuras de rocas y paredones calcáreos. (E).
- (n) *Sarcocapnos crassifolia* (Desf.) DC. "Hierba de la Lucía".
Perenne rupícola; 5-15 cm.; My-Jn; fisuras de rocas y paredones calcáreos en enclaves termófilos. (E).

PLATANACEAS

- (c) *Platanus hybrida* Brot. "Plátano".
Arbol caducifolio; 7-20 m.; F-Mr; parques y paseos. (MF).

POLYGALACEAS

- (n) *Polygala monspeliaca* L. "Lechera de flor verde".
Anual; 10-25 cm.; My-Jl; pastizales efímeros entre matorrales y pinares. (E).
- (n) *Polygala rupestris* Pourret
Perenne, leñosa en la base; 10-20 cm.; Ab-Jn; laderas pedre-

gosas, fisuras de rocas. (F).

PUNICACEAS

(c)(s) *Punica granatum* L. "Granado".

Arbusto caducifolio; 1'5-4 m.; My-Jl; huertas y bordes de caminos en zonas termófilas. (E).

RAFLESIIACEAS

(n) *Cytinus hypocistis* (L.) L. "Chupamieles", "Colmenica de jaguarzo".

Perenne, parásita de Cistáceas; 2-10 cm.; Ab-My; matorrales. (E).

RAMNACEAS

(n) *Rhamnus alaternus* L. "Aladierno", "Carrasquilla".

Arbusto perennifolio; 0'5-3 m.; Mr-Ab; encinares y coscojares, laderas rocosas. (E).

(n) *Rhamnus lycioides* L. "Espino negro", "Espino prieto".

Arbusto perennifolio; 0'5-2 m.; Ab-Jl; encinares con sabinas negras y coscojares. (F).

RANUNCULACEAS

(n) *Adonis aestivalis* L. "Angelico", "Ojo de perdiz".

Anual; 10-40 cm.; Ab-Jn; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (E).

(n) *Adonis annua* L. "Gota de sangre".

Anual; 10-40 cm.; Mr-Jn; cultivos cerealistas, campos incul-tos. (E).

(n) *Adonis flammea* Jacq.

Anual; 10-40 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, campos incul-tos y bordes de caminos. (E).

(n) *Adonis microcarpa* DC. "Adonis amarillo".

Anual; 5-30 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, campos incul-tos. (E).

(n) *Ceratocephalus falcatus* (L.) Pers. "Yerba centella".

Anual; 2-12 cm.; Mr-Ab; terraplenes terrosos, campos incul-tos. (E).

(n) *Clematis flammula* L. "Enredadera de cola", "Cola de ardi-lla".

Arbusto trepador; 2-5 m.; My-Jl; encinares, espinares y mato-rrales. (E).

- (n) *Clematis vitalba* L. "Clemátide", "Hierba de los pordioseros". Arbusto trepador; hasta 25 m.; Jn-Ag; bosques de ribera. (F).
- (n) *Consolida orientalis* (Gay) Schröd. "Espuela de caballero de los jardines". Anual; 30-90 cm.; My-Jn; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (F).
- (n) *Delphinium gracile* DC. "Espuela de caballero". Anual o bianual; 20-80 cm.; My-Jl; bordes de caminos, campos incultos y cultivados. (E).
- (n) *Delphinium verdunense* Balbis Anual o bianual; 10-60 cm.; My-Jl; bordes de caminos, cultivos cerealistas. (E).
- (n) *Nigella damascena* L. "Arañuela", "Neguilla de Damasco". Anual; 8-30 cm.; Ab-Jn; cultivos cerealistas, campos incultos. (E).
- (n) *Nigella gallica* Jordan "Neguilla". Anual; 8-20 cm.; My-Jn; cultivos cerealistas, campos incultos. (E).
- (n) *Ranunculus arvensis* Jordan "Hierba del amor", "Abrepuños". Anual; 15-45 cm.; Ab-My; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (E).
- (n) *Ranunculus bulbosus* L. "Hierba velluda". Perenne; 15-50 cm.; My-Jl; prados, cunetas húmedas. (E).
- (n) *Ranunculus gramineus* L. Perenne; 10-50 cm.; F-My; tomillares, laderas pedregosas. (E).
- (n) *Ranunculus muricatus* L. "Abrojos a cuatro". Anual; 10-30 cm.; Ab-My; cunetas húmedas y nitrificadas. (E).
- (n) *Ranunculus repens* L. "Ranúnculo de prado", "Botón de oro". Perenne; 15-60 cm.; My-Ag; prados húmedos y nitrificados. (F).
- (n) *Ranunculus trichophyllus* Chaix in Vill. "Hierba lagunera". Anual o perenne acuática; 5-50 cm.; Mr-My; aguas dulces remansadas de lagunas y cursos de agua. (E).
- (n) *Thalictrum flavum* L. "Ruibarbo de pobres". Perenne; 40-100 cm.; My-Jn; riberas húmedas y bordes de acequias. (E).

RESEDACEAS

- (n) *Reseda lutea* L. "Gualda", "Pacífica".

Anual o perenne; 20-70 cm.; Mr-Jn; campos incultos, bordes de caminos. (F).

- (n) *Reseda paui* Valdés-Bermejo et Kaercher
Bianual o perenne; 20-45 cm.; Ab-Jn; tomillares en laderas pedregosas, bordes de caminos. (E).
- (n) *Reseda phyteuma* L. "Gualdilla", "Sosiega niños".
Anual o bianual; 20-50 cm.; Mr-Jn; herbazales de bordes de caminos, cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Reseda stricta* Pers.
Bianual; 20-50 cm.; Ab-O; zonas subnitrófilas margosas o yesíferas. (F).

ROSACEAS

- (n) *Agrimonia procera* Wallr. "Agrimonia de olor".
Perenne; 30-100 cm.; My-Ag; bajo bosques de ribera, cunetas húmedas. (E).
- (c) *Cotoneaster pannosa* Franch. "Cotoneaster".
Arbusto perennifolio; 1-3 m.; My-Jn; parques y jardines. (E).
- (n) *Crataegus monogyna* Jacq. "Majuelo", "Espino albar".
Arbusto o pequeño árbol caducifolio espinoso; 2-7 m.; Ab-My; en zarzales y espinares de bosques de ribera. (F).
- (c) *Cydonia oblonga* Miller "Membrillero".
Arbusto o pequeño árbol caducifolio; 1'5-5 m.; Ab-My; huertas. (E).
- (c) *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindley "Níspero del Japón".
Arbusto o pequeño árbol perennifolio; 3-8 m.; D-Mr; parques y huertas. (E).
- (c) *Malus domestica* Borkh. "Manzano".
Árbol caducifolio; 4-12 m.; Mr-Ab; huertas y regadíos. (F).
- (n) *Potentilla reptans* L. "Cinco en rama", "Pie de Cristo".
Perenne rastrera; 20-90 cm.; My-Jl; prados nitrificados, cunetas húmedas y bordes de acequias. (F).
- (c) *Prunus armeniaca* L. "Albaricoquero".
Arbusto o pequeño árbol caducifolio; 3-8 m.; F-Mr; huertas, parques. (E).
- (c) *Prunus cerasifera* Ehrh. var. *pissardi* (Carr.) Bayley "Ciruelo cerezo".
Arbusto o pequeño árbol caducifolio; 2-8 m.; F-Ab; parques y paseos. (MF).
- (c) *Prunus domestica* L. "Ciruelo".
Arbusto o árbol caducifolio; 3-9 m.; Mr-Ab; huertas y regadíos. (E).

- (c)(s) *Prunus dulcis* (Miller) D. A. Webb "Almendro".
Arbusto o árbol caducifolio; 4-10 m.; F-Mr; huertas, bordes de caminos. (F).
- (c) *Prunus laurocerasus* L. "Laurel cerezo", "Laurel real".
Arbusto o pequeño árbol perennifolio; 4-8 m.; Ab-My; parques. (E).
- (c) *Prunus persica* (L.) Batsch. "Melocotonero".
Arbusto o pequeño árbol caducifolio; 3-6 m.; Mr-Ab; huertas y regadíos. (E).
- (c) *Pyracantha coccinea* M. J. Roemer "Espino de fuego".
Arbusto perennifolio espinoso; 0'5-3 m.; Ab-My; parques y jardines. (F).
- (c) *Pyrus communis* L. "Peral".
Arbol caducifolio, a veces espinoso; 5-15 m.; Mr-Ab; huertas y regadíos. (E).
- (n) *Rosa canina* L. "Rosal silvestre", "Escaramujo".
Arbusto caducifolio espinoso; 1-3 m.; My-Jn; en zarzales y espinares de bosques de ribera. (F). Del g. *Rosa* existen numerosas variedades cultivadas.
- (n) *Rosa pouzinii* Tratt. "Agavanzo".
Arbusto caducifolio espinoso; 1-3 m.; My-Jn; en zarzales y espinares de bosques de ribera. (E).
- (n) *Rubus ulmifolius* Schott "Zarzamora", "Zarza".
Arbusto caducifolio espinoso; 1-4 m.; My-Jl; en zarzales y espinares de bosques de ribera, lugares húmedos. (F).
- (n) *Sanguisorba minor* Scop. "Pimpinela menor".
Perenne rastrera; 10-70 cm.; Ab-Jl; herbazales de bordes de caminos, matorrales y tomillares subnitrófilos. (F).
- (c) *Spiraea* sp. pl. "Espirea".
Arbusto caducifolio; 0'5-2'5 m.; Mr-My; diversas especies cultivadas en parques y jardines. (F).

RUTACEAS

- (n) *Dictamnus hispanicus* Webb ex Willk. "Tarraguillo", "Alfábega de pastor".
Perenne, leñosa en la base; 20-70 cm.; Jn-Jl; bajo pinares o encinares aclarados en el Valle del Júcar. (E).
- (n) *Ruta angustifolia* Pers. "Ruda menor".
Perenne, leñosa en la base; 30-70 cm.; My-Jl; matorrales secos y pedregosos. (E).
- (n) *Ruta montana* (L.) L. "Ruda montesina".
Perenne; 15-60 cm.; My-Jl; encinares aclarados y matorrales

soleados. (E).

SAXIFRAGACEAS

(n) *Saxifraga tridactylites* L.

Anual; 3-15 cm.; Mr-My; pastizales efímeros entre tomillares y matorrales. (E).

SIMAROUBACEAS

(c)(s) *Ailanthus altissima* (Miller) Swingle "Ailanto", "Arbol del cielo".

Arbol caducifolio; 10-25 m.; My-Jn; parques, bordes de caminos y solares abandonados. (MF).

TAMARICACEAS

(n)(c) *Tamarix africana* Poiret "Tamariz negro", "Taray".

Arbusto caducifolio; 2-4 m.; Mr-Ab; suelos subsalinos húmedos, parques.

(n) *Tamarix boveana* Bunge "Tamariz royo".

Arbusto caducifolio; 2-4 m.; Mr-My; suelos húmedos y subsalinos. (E).

TILIACEAS

(c) *Tilia platyphyllos* Scop. "Tilo".

Arbol caducifolio; 10-25 m.; Jn-Jl; parques. (E).

TIMELEACEAS

(n) *Daphne gnidium* L. "Torvisco", "Mata pollo".

Arbusto perennifolio; 0'5-2 m.; S-E; encinares y coscojares. (F).

(n) *Thymelaea hirsuta* (L.) Endl. "Bufalaga marina", "Bulaga".

Mata o pequeño arbusto; 30-70 cm.; N-Ab; matorrales pedregosos. (E).

(n) *Thymelaea pubescens* (L.) Meissner in DC.

Mata; 10-30 cm.; Mr-My; tomillares en laderas soleadas y pedregosas. (E).

(n) *Thymelaea tartonraira* (L.) All. "Bolaguilla", "Salamunda".

Mata; 20-50 cm.; Ab-My; matorrales en zonas soleadas y pedregosas. (E).

UMBELIFERAS

- (n) *Anthriscus caucalis* Bieb. "Ahoga gatos".
Anual; 10-60 cm.; Mr-My; herbazales nitrificados, frescos y umbríos. (E).
- (n) *Apium nodiflorum* (L.) Lag. "Apio", "Berraza".
Perenne, tendida; 20-100 cm.; My-S; charcas, bordes de cursos de agua, cunetas inundadas. (F).
- (n) *Bifora testiculata* (L.) Roth. "Bífora".
Anual; 20-35 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas. (E).
- (n) *Brachypodium dichotomum* (L.) Maire
Anual; 5-20 cm.; My-Jn; pastizales entre tomillares y matorrales, bordes de caminos. (E).
- (n) *Bupleurum baldense* Turra
Anual; 5-15 cm.; Ab-Jn; pastizales efímeros entre tomillares y matorrales. (E).
- (n) *Bupleurum frutescens* L. "Cuchillejo", "Hinojo de perro".
Mata o pequeño arbusto; 30-90 cm.; Jn-S; matorrales en laderas pedregosas. (F).
- (n) *Bupleurum fruticosum* L. "Adelfilla", "Matabuey".
Arbusto; 0'5-2'2 m.; Jn-S; encinares y coscojares. (E).
- (n) *Bupleurum rigidum* L. "Oreja de liebre".
Perenne; 40-130 cm.; JI-S; encinares y coscojares. (E).
- (n) *Bupleurum rotundifolium* L. "Langarica".
Anual; 15-65 cm.; My-JI; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (E).
- (n) *Bupleurum semicompositum* L.
Anual; 5-25 cm.; Ab-My; pastizales en zonas subsalinas y algo nitrificadas. (E).
- (n) *Caucalis platycarpus* L. "Cadillos".
Anual; 10-40 cm.; Ab-My; cultivos cerealistas, campos incultos. (F).
- (n)(c) *Daucus carota* L. "Zanahoria silvestre", "Zanahoria".
Anual o bianual; 40-120 cm.; Jn-S; carduales de bordes de caminos y campos incultos, una variedad se cultiva en huertas. (MF).
- (n) *Eryngium campestre* L. "Cardo corredor", "Cardo setero".
Perenne; 20-65 cm.; Jn-S; carduales de bordes de caminos, campos incultos y zonas pedregosas. (MF).
- (n) *Foeniculum vulgare* Miller "Hinojo".
Bianual o perenne; 0'5-2'5 m.; My-S; bordes de caminos, campos incultos. (MF).
- (n) *Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm.

- Anual; 10-30 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, matorrales en zonas secas. (E).
- (n) *Orlaya kochii* Heywood "Cachurro".
Anual; 5-30 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, laderas subnitrófilas. (E).
- (c) *Petroselinum crispum* (Miller) A. W. Hill "Perejil".
Bianual; 20-70 cm.; Jn-Ag; huertas. (F).
- (n) *Pimpinella villosa* Schousboe.
Perenne; 30-80 cm.; Jn-Ag; cardinales de bordes de caminos y campos incultos. (E).
- (n) *Scandix australis* L. "Aguja fina", "Peine de niños".
Anual; 10-20 cm.; Ab-Jn; cunetas frescas y umbrías, cultivos. (E).
- (n) *Scandix pecten-veneris* L. "Peine de Venus", "Aguja de pastor".
Anual; 10-30 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (MF).
- (n) *Seseli elatum* L. "Séseli".
Bianual o perenne; 15-110 cm.; JI-O; matorrales en laderas pedregosas. (E).
- (n) *Thapsia villosa* L. "Zumillo", "Cañaheja".
Perenne; 40-200 cm.; My-JI; bordes de caminos, campos incultos y matorrales subnitrófilos. (F).
- (n) *Torilis arvensis* (Hudson) Link "Bardanilla".
Anual; 20-90 cm.; Ab-JI; herbazales de bordes de caminos, campos incultos, regadíos. (F).
- (n) *Torilis leptophylla* (L.) Reich. fil. "Falso cadillo", "Cachurrera menor".
Anual; 10-35 cm.; Ab-Jn; herbazales de bordes de caminos, cultivos cerealistas. (F).
- (n) *Torilis nodosa* (L.) Gaertner "Bardanilla", "Cachurro".
Anual rastrera; 10-45 cm.; Ab-Jn; bordes de caminos, campos incultos y zonas nitrificadas. (E).
- (n) *Turgenia latifolia* (L.) Hoffm. "Cachurrera", "Cadillo de hoja ancha".
Anual; 15-55 cm.; Mr-My; cultivos cerealistas, bordes de caminos. (E).

VIOLACEAS

- (n) *Viola kitaibeliana* Schultes "Violetilla".
Anual; 3-15 cm.; Mr-My; herbazales frescos y subnitrófilos, campos incultos. (E).

VITACEAS

- (c) *Parthenocissus inserta* (A. Kerner) Fritsch "Viña virgen",
"Parra virgen".
Arbusto caducifolio trepador; hasta 20 m.; Jn-Ag; parques.
(E).
- (c)(s) *Vitis vinifera* L. "Vid".
Arbusto caducifolio trepador; hasta 30 m. en estado silvestre;
Jn; viñedos, asilvestrada en sus cercanías y en bosques de ribe-
ra. (MF).

ZIGOFILACEAS

- (n) *Peganum harmala* L. "Alhargama", "Gamarza".
Perenne; 30-70 cm.; My-Jl; matorrales nitrificados de zonas
margosas y yesíferas. (E).
- (n) *Tribulus terrestris* L. "Abrojo".
Anual rastrera; 10-50 cm.; My-Ag; viñedos, barbechos y cam-
pos incultos. (E).
- (n) *Zygophyllum fabago* L. "Morsana".
Perenne, leñosa en la base; 50-100 cm.; Ab-Jn; zonas nitrifica-
das, basureros y bordes de caminos. (F).