

**TABLA 2. Relación de los síntomas de dispepsia con diversos factores psicológicos**

	PAGI-SYM	Intensidad estrés	Afecto positivo	Afecto negativo	Optimismo	Número de sucesos estresantes
PAGI-SYM	1	,155	-,012	,494(**)	-,107	,193(*)
Intensidad estrés	,155	1	-,024	,118	,020	,008
Afecto positivo	-,012	-,024	1	-,149	,549(**)	-,120
Afecto negativo	,494(**)	,118	-,149	1	-,382(**)	,122
Optimismo	-,107	,020	,549(**)	-,382(**)	1	-,076
Número de sucesos estresantes	,193(*)	,008	-,120	,122	-,076	1

\*\* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

\* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

**TABLA 3. Relación de las subescalas del PAGI-SYM con los factores psicológicos**

Subescala del PAGI-SYM	Afecto positivo	Afecto negativo	Optimismo	Número de sucesos estresantes	Intensidad estrés
Dolor abdominal inferior	-,107	,356(**)	-,110	,179	,183(*)
Llenura/saciedad temprana	,032	,332(**)	-,050	,110	,137
Regurgitación	,029	,373(**)	-,069	,219(*)	,013
Náuseas/vómito	,024	,394(**)	-,140	,020	,019
Dolor abdominal superior	-,097	,360(**)	-,088	,155	,154
Malestar/reflujo gastroesofágico	,069	,312(**)	,024	,069	,123

\*\* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

\* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

con la escala PAGI-SYM y factores psicológicos tales como el afecto negativo y el número de sucesos vitales estresantes. Esto está acorde con estudios previos en los cuales se ha establecido una relación de la dispepsia con factores psicológicos asociados al afecto negativo tales como el neuroticismo, la ansiedad y la ira-hostilidad (Haug *et al.*, 1995; Norton *et al.*, 1999; Tanum y Malt, 2001; Li *et al.*, 2002).

Con respecto al estrés psicosocial, en la presente investigación se halló una relación de la medida total de sín-

tomos de dispepsia (medidos con el PAGI-SYM) con el número de sucesos vitales estresantes. Este aspecto ha sido también reportado en otros estudios (Haug *et al.*, 1995; Lau *et al.*, 1996; Tobón *et al.*, 2003a; Tobón *et al.*, 2004a). Sin embargo, al contrario de otros estudios (Bennett *et al.*, 1991; Hernández *et al.*, 1993; Lau *et al.*, 1996; Lee *et al.*, 2000), no se halló relación de la medida total de dispepsia con la intensidad del estrés. Con respecto a los síntomas específicos, se halló relación del número de sucesos vitales y de la intensidad del estrés