

# EL DESTETE TARDIO REDUCE LA MORTALIDAD

¿Por qué se destetan los conejos entre los 28 y 30 días?

Posiblemente porque esto se ha dicho hace muchos años y se constata que es posible. Esta fecha de uso tan generalizado se ha investigado si es idónea o no, y cuando puede ser del momento más adecuado para el destete.

Se ha observado que el destete a los 35 días en lugar de a los 28, permite aumentar considerablemente el peso al destete, máxime teniendo en cuenta de que se trata de un momento de fuerte crecimiento — entonces en una semana los gazapos ganan tanto peso como en las dos semanas anteriores—. Hemos observado todos que cuanto más pesan los gazapos mejor soportan el destete. Especialmente a los 35 días, que es cuando los gazapos se hallan mejor preparados para los cambios alimenticios, como muestran diversos trabajos:

— A la edad de 21 días, el granulado no supone **más del 20 al 30 %** del consumo total de materia seca.

— A los 28 días **el granulado es un 75 %** del alimento seco consumido, por lo que la leche materna aporta todavía el 25 % de nutrientes, de ahí que esta operación sea todavía un hecho a contracorriente que puede suponer fluctuaciones de consumo y la posibilidad de que surjan problemas digestivos y mortalidad.

— A los 35 días por el contrario, el **pienso representa el 90 %** del consumo y la supresión de la leche materna no es más que un pequeño incidente, sin influencia en los gazapos.

Desde el punto de vista cualitativo, el choque provocado por el destete a los 28 días es evidente, pues el contenido seco de la leche materna es muy rico en nutrientes, y los elementos «ricos» de la leche no pueden ser reemplazados inmediatamente por el pienso, como ocurre con el almidón. Para utilizar el almidón, el conejo precisa transformarlo en azúcares más simples asimilables gracias a la acción de la **amilasa**, en enzima segregado por el organismo, de la cual carece el animal y que va adquiriendo poco a poco, siendo aún incapaz de digerir el almidón a los 28 días.

En datos concretos, se presentó un estudio realizado 18 meses antes en el conejar del Liceo Agrícola de Pontivy, comparando los destetes a 25, 30 y 35 días, y señalándose las mortalidades de estos animales entre 25 y 70 días de edad. Los resultados fueron los siguientes:

- destete a 25 días: 20 % de mortalidad.
- destete a 30 días: 11 % de mortalidad.
- destete a 35 días: 6 % de mortalidad.

Se comentó que estos ensayos se siguen realizando en otros centros, y que las edades al destete no influyeron sobre el peso de los gazapos al final de la experiencia.

(Conferencia del Dr. F. Lebas en Loudeac.)



REPRODUCTORAS ALTA SELECCIÓN  
Y ANIMALES DE LABORATORIO



- Servicios integrales 24 horas, incluidos festivos.
- Análisis de piensos.
- Técnicos, en toda España, para resolver sus problemas.
- Transporte equipado con aire acondicionado y capacidad para 700 reproductores.
- Centro de selección acreditado por la junta de Castilla y León, con el n.º 01-LF-002.

Teléfono: (987) 31 09 72 (Contestador)  
Teléfono móvil: (908) 18 48 38  
Fax: (987) 31 09 72  
24210 MANSILLA DE LAS MULAS  
(León)

## BEBEDEROS VALVULA COMPLEMENTOS INSTALACIONES CUNICOLAS



- \*BEBEDEROS VALVULA EN ACERO INOXIDABLE, PARA CONEJOS.
- \*BEBEDERO Nº 1 para acoplar a tubo rígido o a alargadera de nylon.
- \*BEBEDERO Nº 2 con MUELLE UNIVERSAL para manguera de Ø 10 y sujeción malla.
- \*10 AÑOS DE GARANTIA.



- \*TUBERIA RIGIDA PVC 22x22 (largos de 2m y a medida)
- \*CONECTORES FINALES tubo rígido Ø 10 y 19 mm.
- \*BALANZA PESAR CONEJOS, cap. 10 kg con cesta.
- \*DEPOSITO REGULADOR PRESION AGUA, CON BOYA, cap. 8 litros.



- \*TAMBIEN FABRICAMOS BEBEDEROS PARA AVES Y PORCINO.

Para mayor información contacte con

Buscamos  
Distribuidores

**LEADER**  
PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S.A.  
IMPORT/EXPORT

Paseo de Cataluña, 4  
43887 NULLES (Tarragona)  
Tel (977) 60 25 15 y 60 27 23  
Fax (977) 61 21 96