

COMPORTAMIENTO DEL CONEJO EBRO DE NACIMIENTO A DESTETE RESULTADOS PRELIMINARES

J. A. Gregori (1) y M. Malo (2)

(1) Socio CUNIGREBEL, S. L.

(2) Gente de Zona de Gallina Blanca. Purina

INTRODUCCION

El conejo Ebro es el resultado de un esquema de selección a partir del Gigante de España que Gallina Blanca Purina, S. A. está llevando a cabo en colaboración con Cunigrebel, S. L. y la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Debido a los distintos orígenes de los animales y a su integración en el esquema de selección los datos que se presentan son todavía escasos. Esperamos en posteriores comunicaciones ampliar el número de estos, así como estudiar otras características productivas.

MATERIAL Y METODOS

Contamos con 646 animales controlados, provenientes de 71 camadas. Todos ellos proceden de la granja Cunigrebel, S. L.

Unicamente se han controlado aquellas camadas con características etnológicas suficientes para ser encuadradas dentro de la raza en cuestión.

Los datos recogidos han sido: número de nacidos, número de destetados, días entre nacimiento y destete y peso al destete, como consecuencia se desprende la mortalidad antes del destete.

RESULTADOS Y DISCUSION

El cuadro de medias y desviaciones típicas es el que sigue:

	Nacid.	Dest.	Días Dest.	Peso Dest.	Mortalidad
Medias	9	7	32	778	19,09
Desviac.	2,5	2,3	4,2	159,3	

Los datos del cuadro anterior, en cuanto a nacidos y destetados son bastante parecidos a los hallados por Marina López en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza publicados en 1986 y comunicados personalmente.

En cuanto al peso al destete, el comportamiento de los animales es extraordinario, con 778 gr. de media a los 32 días, teniendo en cuenta que hay 10 camadas con más de 10 animales destetados y cuyo peso al destete no baja de los 600 gr. con menos de 35 días en todos los casos. Esto ha dado un máximo de 11,4 Kg. de carne destetados a los 34 días y 5,6 Kg. de media a los 32 días.

Aunque es cierto que los gazapos reciben una complementación de un pienso especial para gazapos antes del destete, no cabe duda de la excelente capacidad lechera de estos animales.


En cuanto a la mortalidad en nido nos parece normal, si bien estamos convencidos de que se puede mejorar practicando lactación controlada a todos los animales


o solamente a los más nerviosos. En posteriores trabajos dedicaremos nuestra atención a otros parámetros productivos y de rusticidad de este conejo Ebro.


BIBLIOGRAFIA

MARINA LOPEZ Y COL.; 1986.

OPTIONS MEDITERRANÈES. Série séminaires, n.º 8. 1990.









EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL
DE CASTELLON



CONSELLERIA AGRICULTURA
Y PESCA



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CASTELLON



AS
ES
CU ASOCIACION
ESPAÑOLA
DE CUNICULTURA