



Granja Torremocha

Tomás M. Rodríguez Serrano
tmrs@asescu.com



La Comunidad de Madrid es la región de España con menos explotaciones de conejos. Según los últimos datos publicados figuran registradas en el Registro de Explotaciones Ganaderas seis explotaciones cunícolas de producción de gazapos para carne.

La granja Torremocha es una de estas seis. Se encuentra situada en el término municipal de Torremocha del Jarama, a menos de 70 kilómetros al noreste de Madrid, en la comarca de la Sierra Norte.

Justo García es un joven cunicultor con cerca de veinte años de experiencia en esta producción ganadera. Cuando Justo terminó sus estudios comenzó a trabajar en el extinguido Instituto Nacional de Industria, INI. En aquella época el INI tenía una

moderna explotación avícola dotada de todas las medidas de bioseguridad disponibles en aquella época. Llegado un momento este Instituto decidió cambiar la orientación productiva de la granja y la transformó en una cunícola, y al poco tiempo el INI se deshizo de ella. Este fue un momento clave en la vida de Justo, porque sus jefes le plantearon continuar trabajando en el INI en un cómodo despacho en la capital, pero en cambio él les propuso quedarse con la granja. Convirtiéndose de este modo en cunicultor profesional.

La explotación Torremocha, a pesar de su antigüedad, cumple todos los requisitos de bioseguridad exigidos en la actualidad, cuenta con un vallado perimetral, con aparcamiento para las visitas, con un foso para la desinfección de las ruedas de los



La granja Torremocha cuenta con cuatro naves con 7 módulos cada una de ellas.



El amplio pasillo de acondicionamiento proporciona unas magnificas condiciones ambientales a los animales.

vehículos que tienen que entrar en ella. Además para el personal dispone de vestuarios y duchas.

La granja está dispuesta en "H", de tal modo que cuenta con cuatro naves tipo vagón de tren, que tienen, cada una, siete salas con capacidad para 100 reproductoras, más la reposición correspondiente, alojando unas 1.800 hembras en producción. El pasillo de acondicionamiento es amplio, está bien asilado, proporcionando

un ambiente constante, y gracias al sistema de ventilación forzada transversal proporciona unas condiciones excepcionales para los animales, que se manifiesta en la inexistencia de procesos respiratorios.

En la actualidad Justo se encuentra en un proceso de renovación del equipamiento de la granja. Así hace algo más de un año ha instalado, en un par de módulos, las nuevas jaulas de Farmak, éstas fueron las primeras que se colocaron en una explotación comercial. Con la ayuda de Justo el material ha ido evolucionando y se han ido incorporando mejoras en las jaulas.



Nuevas jaulas polivalentes instaladas en Granja Torremocha.

El sistema de producción utilizado en Granja Torremocha es semi-extensivo, con cubriciones a los 18 días después del parto. De este modo, Justo trabaja con dos bandas de reproductoras, inseminando unas 1.300 conejas, y un grupo de cebo, destetados a los 40-42 días, que vende con 64 días de edad y un peso medio de 2.100 gramos.

Los animales utilizados en esta explotación son hembras Hy-Plus y Spermy, reponiendo con gazapos de "un día", además Spermy también se encarga de proporcionar el semen para las inseminaciones.



Detalle del nido de las jaulas polivalentes de Granja Torremocha.



Desde la izquierda: Tsvetomir Georgiev, Mario Malo, Justo García García y Carlos Albir en uno de los módulos de la Granja Torremocha.

Este manejo ha sido uno de los cambios que el veterinario Mario Malo ha sugerido para mejorar los problemas que tenía al producir gazapos con poco peso final. De este modo trabajando con dos grupos de hembras y uno de cebo, se retrasó el destete de los gazapos, y se puede hacer una limpieza a fondo y desinfección de los módulos libres. Con estas modificaciones de la pauta de trabajo en la explotación se ha disminuido la intensidad de las patologías que afectan a los animales, y se han mejorado los rendimientos de la explotación.

Aunque la Granja Torremocha se encuentra en una zona de muy baja densidad de pro-

ducción de conejos, el mayor problema patológico de la Mixomatosis. Esto hace que se extremen las medidas de prevención y bioseguridad. Así se vacuna a toda la reposición a los seis meses de edad para la prevención de la Mixomatosis y la Enfermedad Vírica Hemorrágica; a todas las reproductoras de manera continua y a los gazapos de cebo a los 28 días de edad para prevenir contra la Mixomatosis.

Granja Torremocha es una explotación que con instalaciones antiguas se aplican sistemas modernos de producción, haciendo de ella una granja rentable y con proyección de futuro. Justo tiene al día los datos de gestión técnica económica al día, así nos indica que uno de los problemas que tiene es la mortalidad al destete, cuenta

con un 10%, pero que en cambio no tiene excesivos problemas en el cebo, ya que cuenta con un 3 % de bajas en este periodo. También comenta que con este nuevo sistema de manejo ha mejorado mucho el comportamiento del cebo reduciéndose la incidencia de las patologías y además cuando éstas aparecen lo hacen de un modo más leve. Otros datos que nos aporta es que cuenta con una fertilidad del 84% y con una media de gazapos nacidos vivos del 9.2%.

