

PRONTUARIO DE LA NATURALEZA ALBACETENSE

Recopilado por Juan PICAZO TALAVERA*

El Prontuario de la Naturaleza Albacetense pretende ser un espacio para recoger los conocimientos inéditos sobre la Naturaleza de Albacete, que por su carácter puntual (citas), no tienen cabida en otras secciones de la Revista Sabuco.

Como criterios de selección hemos utilizado los siguientes, entre otros: que se trate de primeras citas de especies para la provincia de Albacete, de especies catalogadas “En Peligro de Extinción”, de nuevas poblaciones de endemismos, citas sobre un número relevante de individuos, de observaciones fenológicas inusuales o individuos vistos fuera de su área de distribución conocida, datos relevantes sobre la ecología de las especies, etc.

En todos los casos, y especialmente para las “Especies en Peligro de Extinción”, se han omitido detalles que pudieran suponer riesgo para las especies.

Las citas que necesiten homologación por los correspondientes Comités Biológicos de ámbito nacional, serán reseñadas con un asterisco (*).

Sin perjuicio de la selección realizada y aceptación de citas, éstas han sido remitidas voluntariamente por sus autores (indicados entre paréntesis), y a ellos corresponde la veracidad de los datos reflejados.

Ejemplo de cita recomendada: Valdés, A. (2009). *Juniperus thurifera*. En, J. Picazo (Rec.): Prontuario de la Naturaleza Albacetense, pp. 300. *Sabuco*, 7: 297-308. Instituto de Estudios Albacetenses.

PLANTAE**ANGIOSPERMAS*****Nigella damascena* L.**

Mencionada en Cerro del Pino, Hellín (Rouy, 1883), Almansa (Obón de Castro, 1985), La Molata (Herranz, 1986), Molino del Jaray, Yeste (Martínez S. & Herranz, 1992), La Viñica, Socovos (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993), Calar del Mundo (López Vélez, 1994), Villa de Ves, Santuario (J. Gómez, tesis doct. inéd.). Recogida entre la carretera de Jaén y Santa Ana, WJ9110, 675 m.s.n.m., herbazales subnifrófilos y pastizales en claros de campos incul-tos con suelos blanquecinos ricos en sulfatos, ALBA 7403 (A. Valdés, 31-5-2010). Nueva cita para ampliar su área conocida hacia el norte provincial.

Nigella papillosa* G. López subsp. *papillosa

Testigo de las proximidades de la Laguna de Mojón Blanco I, La Higuera, Corral Rubio, XH3695, 895 m., en márgenes de un camino, ALBA 7156 (A. Valdés & R. Roldán, 19-6-2009). Taxón caracterizado por sus grandes flores, frutos densamente glandulosos y estilos muy patentes en la fructificación. Parece que es la 1ª cita provincial.

***Glaucium flavum* Crantz**

Alrededores de Albacete, cerca de urbanización Casas Viejas, WJ9215, 690 m.s.n.m., en baldíos labrados sobre suelos blanquecinos ricos en sulfatos, ALBA 6988 (A. Valdés, 27-7-2009). No conocemos otras citas provinciales.

***Limonium latebracteatum* Erben**

Referencias del saladar de Cordovilla (Valdés & *al.*, 1993; Molina Abril & *al.*, 2001). Recogida en las cercanías del Canal de San Jorge y Urbanización Casas Viejas, WJ9215, 680 m.s.n.m., sobre suelos blanquecinos ricos en sales, no labrados, ALBA 7399 (J. Gómez & A. Valdés, 12-8-2010). Nueva localidad en la provincia para este endemismo del este hispánico.

***Limonium dichotomum* (Cav.) Kuntze**

En la comarca de Ruidera (G. Albo, vd. Velayos, 1981), Laguna de Pétrola (Herreros, 1992) y Salinas de Pinilla (Esteso, 1992). Como *Statice dichotoma* menciona en los alrededores de Albacete (Dantín, 1912). Colectado entre autovía de Jaén y Urbanización Casas viejas, WJ9215, 690 m.s.n.m., sobre suelos blanquecinos ricos en sales, no labrados, ALBA 7400 (J. Gómez & A. Valdés, 12-8-2010).

Limonium thiniense Erben

Citada en Pétrola (Sáez & Rosello, 1999; Cirujano & Medina, 2002), Laguna de Hoya Rasa en Corral Rubio y Los Llanos de Albacete, WJ9113 (Sáez & Rosello, 1999); en Laguna de Salobralejo en Higuera (Sáez & Rosello, 1999; Cirujano & Medina, 2002) y complejo lagunar de Corral Rubio (Alonso Vargas & de la Torre, 2004).

Recogida en alrededores de Albacete, cerca de urbanización Casas Viejas, WJ9215, 690 m.s.n.m., sobre suelos blanquecinos compactados ricos en sulfatos, junto con *Atriplex halimus*, *Cirsium pyrenaicum*, *Gypsophila tomentosa*, *Herniaria fruticosa*, *Lepidium cardamines* (de interés especial en la modificación del C.R.E.A., 2001), *Limonium echioides*, *Linaria oligantha*, *Lygeum spartum*, *Onopordum acaulon*, *Puccinellia fasciculata*, *Reseda stricta*, *Schismus barbatus*, *Sisymbrium austriacum*, *Sonchus crassifolius*, *Suaeda spicata* y otras especies de interés. ALBA 7398 (J. Gómez & A. Valdés, 12-8-2010). Incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas como vulnerable (D.O.C.M. de 15-5-1998).

***Limonium* sp. a confir.**

Planta perenne, recogida entre autovía de Jaén y Urbanización Casas Viejas, WJ9215, 680 m.s.n.m., suelos blanquecinos ricos en sales, no labrados, ALBA 7401 (J. Gómez & A. Valdés, 12-8-2010).

Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. subsp. ***procumbens***

Diversos testigos de márgenes Laguna Conceja (Velayos, 1981), Alcaraz (Herranz, 1986), Laguna de Recreo (Chinchilla) y La Molata (Herranz & al., 1986), Munera (Esteso, 1992), saladares de Cordovilla (Valdés & al., 1993; Alonso Vargas, 1999) y de Agramón (Valdés & al., 2003), Yesar de Socovos (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993), del sur de la comarca de Alcaraz (Inocencio & al., 1998), Cordovilla y lagunas de Corral Rubio (Alonso Vargas & de la Torre, 2004), Laguna de Pétrola (Herreros, 1992; Alonso Vargas & de la Torre, 2004; López Donate & al., 2004), Laguna del Salobralejo (Alonso Vargas & de la Torre, 2004; López Donate & al., 2004), Alborea y Casas de Ves (J. Gómez, tesis doct. inéd.) y Los Yesares, Albacete (Molina & Valdés, 2008).

Vista frecuente en los alrededores de Albacete ciudad: así en Los Pra-dos, WJ9313, 675 m.s.n.m., malezas y pastizales sobre suelos blanquecinos ricos en sales, ALBA 7192 (A. Valdés, 26-5-2010) y entre carretera de Jaén y Santa Ana, finca Sánchez Cajo, WJ8909, 675 m.s.n.m., barbechos y cultivos de centeno en suelos blanquecinos ricos en sulfatos, ALBA 7402 (A. Valdés, 31-5-2010).

***Potentilla supina* L.**

Citada en Laguna Concejo, Ruidera (Velayos, 1981), en Arroyo Benizar y Embalse del Cenajo en Socovos (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993, Sánchez Gómez & Güemes, 1993), en el Pantano de Alarcón al sur de Cuenca (Arán & Mateo, 1999). Vista en márgenes del embalse del Talave, WH9922, 505 m.s.n.m., en suelos limoso-arenosos húmedos, ALBA 6983 (R. Roldán & A. Valdés, 23-10-2009) y en la cola del Embalse de Almansa, XJ5904, 735 m. s.n.m, sobre suelos limosos en el vaso del embalse colmatado de sedimentos, ALBA 7085 (A. Valdés & R. Roldán, 24-10-2008). Nuevas citas provinciales de esta interesante especie.

***Onobrychis viciifolia* Scop.**

Hay citas de Alcaraz, Riópar y Bogarra (Herranz & *al.*, 1986), de Letur (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993; Verde, Rivera & Obón, 1998) y de Casas de Ves y de Alborea a Casas Ibáñez (J. Gómez, tesis doct. inéd.). Recogido por encima de Higuera, parque eólico, XJ3616, 1100 m., en márgenes de camino y cebadal, ALBA 7132 (A. Valdés, 22-5-09). Especie naturalizada. Ampliación de su área conocida en la provincia.

***Astragalus echinatus* Murray**

Riópar (Gandoger, 1917); Mesones (Martínez S. & Herranz, 1992); Cottillas, El Laminador (López Vélez, 1996). Testimonio de la Dehesa Boyal de El Bonillo, (como *A. pentaglottis*), ALBA 5666 (C. Soriano, 1972). Cogida en el cruce hacia Santa Ana, WJ9414, 680 m.s.n.m., campos incultos, ALBA 7061 (A. Valdés & R. Roldán, 8-5-2009). Ampliación área hacia el N de Albacete.

***Hedysarum boveanum* Bunge ex Basiner subsp. *europaeum* Guitt. & Kerguelén (= *H. confertum* auct.).**

Citado de Socovos (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993), en Fuensanta por Flora Ibérica (2000) y en Fuentealbilla y Alcalá del Júcar (Molina & Valdés, 2008), como *H. confertum*. También en Villatoya, Villamalea, Casas de Ves, Alborea, etc. (J. Gómez, tesis doct. inéd.).

Recogido en Tiriez, WJ6505, 900 m.s.n.m., entre matorrales, ALBA 7276 (A. Valdés & M.A. García, 23-5-1994) y en El Viso, Balsa de Ves, XJ5553, 550 m.s.n.m., en romerales y espartales sobre yesos triásicos, ALBA 6289 (A. Valdés, 20-5-2002). Ampliación de su área hacia el W provincial.

***Lythrum acutangulum* Lag.**

Citas de “Albacete Oppidum”, El Portazgo (tipo de Lagasca, 1816);

Albacete, Alcaraz y Villena (Gandoger, 1917); Villena, Ossa de Montiel y Laguna Redondilla en Ruidera (Borja, 1968); Letur (Herranz & *al.*, 1993); Calar del mundo (López Vélez, 1994). Colectada en Laguna de Recreo Grande, Corral Rubio, XJ3002, 900 m., en sus márgenes subsalinos, ALBA 7004 (A. Valdés & J. Gómez, 20-7-2009). Nueva localidad de esta interesante planta.

***Dictamnus albus* L.**

Nueva población de esta rutácea muy escasa en nuestro ámbito biogeográfico. Localizada en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, a un kilómetro del límite provincial de Albacete, en el término municipal de Villahermosa (Ciudad Real). Cuadrícula UTM WJ1107; altitud de 860 m. s.n.m. (Manuel López, José Fajardo, Segundo Ríos y Vanessa Martínez).

Linum austriacum* L. (Boiss.) Nyman subsp. *collinum

Citada en Lagunas de Ruidera, así en Laguna Tinajas y Laguna Tomilla (Velayos, 1981) y en laguna del Rey (Peinado & *al.*, 1985), en el sector NW de Albacete por G. Campo & *al.* (1985) y en Fuentealbilla y Jorquera (Gómez Manzaneque, 1986). Herborizada entre carretera de Jaén y Urbanización Casas Viejas, WJ9115, 680 m.s.n.m., sobre suelos blanquecinos ricos en sulfatos no labrados, ALBA 7394 (A. Valdés & J. Gómez, 12-10-10).

***Bupleurum lancifolium* Hornem**

Citada en Ayora y Jarafuel, Valencia, localidades cercanas a Albacete (Peris, 1983). Como *B. protractum* mencionado en Sierra de Taibilla por Gandoger, 1917. Recolectada en alrededores de Cilleruelo, WH5682, 1240 m.s.n.m., en campo inculto, ALBA 7153 (A. Valdés, 27-5-2009). 2ª cita provincial. No cita Flora Ibérica para la provincia.

***Fraxinus excelsior* L.**

Citada del Calar del Mundo, Riópar (Sánchez Gómez & *al.*, 2005). Recolectada también en Cerro de las Cruces, Riópar, WH6052m., 1460 m.s.n.m., en bosque eurosiberiano en ladera norte, ALBA 7388 (J. Fajardo, P. Aracil & J. Parras, 11-9-2010). Segunda cita provincial, situada a unos km. de la única conocida hasta la fecha. Incluida en la modificación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas como vulnerable (D.O.C.M. de 13-11-2001).

Ejemplar fuera de su área conocida de distribución. Pie localizado en la Cañada de La Hoz, el desfiladero por el que se encañona el río Valdemembra cerca ya del Júcar (Mahora). Formado por varios troncos que parecen ser rebrotes de un árbol anterior. Se sitúa entre vegetación de ribera, en el lecho del valle, a unos 200 m de una casa de labor. Localizado en una posición in-

termedia entre la población ibérica más meridional de la especie (Calar del Mundo) y las poblaciones existentes en la Serranía de Cuenca. Cabe la posibilidad que se trate de una antigua plantación. Coordenadas, N 39° 10' 09.4 y W 01° 42' 47.4 (altitud 615 m. s.n.m) (José Fajardo y participantes del grupo de Senderismo de la Universidad Popular de Albacete).

Verbena supina L.

Existen diversas citas bibliográficas, así en pantano de la Fuensanta (Esteso & *al.*, 1988), en embalse del Cenajo, desembocadura Arroyo Benizar y Férez (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993), Yeste (Ríos & *al.*, 1995, 2003) y también en embalse de Almansa (Ríos & *al.*, 2003; allí lo hemos visto abundante sobre sedimentos húmedos arcilloso-limosos en XJ5904, 735 m.s.n.m., 24-10-2008, ALBA 7086, R. Roldán & A. Valdés).

Herborizado en el cauce seco del arroyo Valdemembra, Mahora, XJ3808, sobre suelos nitrificados húmedos, ALBA 6726 (A. Verde & J. Fajardo, 16-9-2007). Ampliación del área conocida hacia el N provincial. En zonas limítrofes del S de Cuenca se presenta sobre limos desecados por el estiaje del Embalse de Alarcón, Honrubia, WJ6787, ALBA 3308 (A. Valdés, 13-10-1995).

Thymus antoninae Rouy & Coincy

Hay numerosas citas bibliográficas en diversas localidades de la comarca de Hellín (Coincy; Porta & Rigo; Willkomm, 1893; Morales, 1981, 1986; Alcaraz, 1983; Alcaraz, 1984; Valdés & Herranz, 1989; Sánchez Gómez & *al.*, 1991; Herranz & *al.*, 1993; Valdés & *al.*, 1996; Gamarra & Morales, 2002, etc.), en el Mugrón de Almansa (Gandoger 1916, como *T. portae*; Morales, 1986), Almansa (Rivera, 1982) y Socovos (Herranz & *al.*, 1993; Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993).

Herborizada en alrededores de Ontalafia hacia Abuzaderas, Pozohondo, XH0787, 820 m.s.n.m., sobre suelos calcáreo-rocosos entre matorrales, ALBA 7016 (A. Valdés & R. Roldán, 11-6-2009). Esta cita supone una ampliación del área conocida hacia el centro provincial de este taxón termófilo. Incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas como de interés especial (D.O.C.M. de 15-5-1998).

Linaria glauca (L.) Chaz. subsp. *olcadium* Valdés & Webb

Endémica de Albacete y Cuenca. Su localidad clásica está a 10 km. al WSW de Albacete (Valdés & Webb (1972); citada también cerca del río Jardín (Herranz, 1986), en Balazote (Esteso, 1992) y entre Albacete y Balazote (Flora Ibérica XIII, 2008). Dantín (1912), que cita sin subespecie en alrede-

dores de Albacete y estepa albaceteña, probablemente se refiere a este taxón.

Recolectada entre carretera de Jaén y urbanización Casas Viejas WJ9215, 680 m.s.n.m., sobre suelos blanquecinos ricos en sulfatos, no labrados, ALBA 7397 (J. Gómez & A. Valdés, 12-8-2010) y en zonas cercanas en los mismos medios ecológicos, WJ9115, 680 m.s.n.m., ALBA 7396 (A. Valdés & J. Gómez, 12-10-2010). Proponemos su inclusión en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas como Vulnerable o de Interés Especial.

***Silybum eburneum* Coss. & Durieu**

Mencionado en Cancarix (Valdés Bermejo & López, 1977); Almansa (Carreras 1975, Obón 1985); Ontur (Alcaraz, 1984); Hellín a Cancarix (Carrasco & *al.*, 1989; Herranz & *al.*, 1993); Pozocañada (González Beserán & *al.*, 1993); Tobarra (Hernández Cardona, 1996); Alborea (J. Gómez, tesis doct. inéd.). Recogida a 1 km de la base aérea de Los Llanos hacia Peñas de San Pedro, WJ9610, 700 m.s.n.m., en herbazales márgenes carretera, ALBA 1847 (A. Valdés, 6-5-1994) y en los alrededores de Barrax hacia Albacete, WJ7122, cunetas de la carretera, ALBA 5162 (A. Valdés, 5-5-1992). Vista también junto carretera de Jaén en la desv. a Santa Ana, WJ9314, 680 m.s.n.m., en campos incultos, testigo fotográfico (A. Valdés & R. Roldán, 8-5-2009). Ampliación área conocida de este taxón que está en fase de expansión por la provincia.

***Senecio auricula* Bourgeau ex. Coss. subsp. a confirmar.**

Herborizada por Porta, 1891, entre Albacete y Balazote, citado por Dantín (1912) en los alrededores de Albacete, en El Salobral (Dantín, 1912, Molero 1986, Fernández-Casas, 1990 y de la Torre & *al.*, 1999), en Balazote (Gandoger, 1917) etc. Como subsp. *auricula* citada en Cordovilla (Alonso Vargas, 1999); como subsp. *castellanus* en Balsa de Ves (Gómez Navarro, 2005); de la subsp. *sicoricus* hay referencias de entre Albacete y Balazote y en el Salobral (Ascaso & Pedrol, 1991).

Observado por J. Gómez (com. verb.) cerca de Casas Viejas, junto a la autovía de Jaén, WJ9115 (8-2010). Pendiente de confirmar la subespecie. Planta incluida en la modificación del Catálogo Regional de Especies Amenazadas como Vulnerable (D.O.C.M. de 13-11-2001).

***Carthamus tinctorius* L.**

Herborizada en alrededores de Albacete, junto al Canal de Acequión, WJ9117, 700 m.s.n.m., campos en barbecho, ALBA 6990 (A. Valdés, 27-7-2009). Posiblemente deriva de antiguos cultivos. Estimamos es primera cita para la provincia.

***Bromus lanceolatus* Roth**

Existen referencias de Alcaraz y Cotilla (Herranz & *al.*, 1986), de Arroyo de Letur (Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993), del sur comarca de Alcaraz (Inocencio & *al.*, 1998). Recogida a 3 km. de El Ballestero hacia Lezuza, WJ4902, 1010 m.s.n.m., en tomillares algo nitrificados en suelos calizos con cantos de raña, ALBA 7404 (R. Roldán & A. Valdés, 11-6-2010) y en Los Prados, WJ9313, 675 m.s.n.m., pastizales y malezas sobre suelos blanquecinos ricos en sulfatos, ALBA 7405 (A. Valdés, 26-5-2010). Ampliación del área conocida hacia el norte provincial.

***Limodorum abortivum* (L.) Sw.**

Hay varias citas bibliográficas en las sierras del sur provincial: Alcaraz, valle de los Chorros, Socovos, Arroyo de la Celadilla, río Madera, Yeste, Nerpio (López Vélez, 1984, 1996; Fernández-Casas 1988; Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993, etc.). También en el W provincial.: entre Villarrobledo y Ossa de Montiel (Esteso, 1992) y NE: Sierra del Boquerón en Villa de Ves (J. Gómez, tesis doct. inéd.). Recogida en el valle del Júcar, en el paraje de la Marmota, Albacete, WJ9036, 650 m.s.n.m., en el bosque de ribera del río Júcar, ALBA 7415 (A. Valdés & R. Roldán, 17-5-2010). Nueva localidad en el valle del Júcar.

***Orchis mascula* L.**

Muchas menciones de las sierras del sur (Nieschalk, 1973; López Vélez, 1984; Rivera & López, 1987; Sánchez Gómez & Alcaraz, 1993; López Vélez, 1996); de Sierra de Almansa (Rivera & López, 1987) y Sierra del Boquerón, Villa de Vés (J. Gómez, tesis doct. inéd). Recolectado en cercanías de la cumbre del Molatón (Higueruela), XJ4017, 1210 m.s.n.m., en quejigares de alto valor ecológico orientados al norte, ALBA 7100 (R. Roldán & A. Valdés, 29-5-2009). Ampliación de su área provincial conocida hacia el norte provincial.

ANIMALIA**ANFIBIOS****Tritón Pigmeo*****Triturus pygmaeus* (Wolterstorff, 1905)**

Nueva localidad de presencia para la especie en Albacete. Cuatro larvas vistas en una charca en la Sierra del Relumbrar (Villapalacios; cuadrícula

UTM 10x10: WH 27), el 29 de mayo de 2010 (José Manuel Reolid y Jesús Arribas).

Ranita de San Antonio

Hyla arborea (Linnaeus, 1758)

Nueva localidad de presencia para la especie en Albacete. Fuente del Vidrio (Peñascosa; 1.227 m. s.n.m; cuadrícula UTM 10x10: WH 67). el 1 de mayo de 2010 (José Manuel Reolid y Jesús Arribas).

Cita en la Fuente de La Raja (Peñascosa; 1.297 m. s.n.m; WH 57), en idéntica fecha a la anterior (José Manuel Reolid y Jesús Arribas).

REPTILES

Eslizón Ibérico

Chalcides bedriagai (Boscá, 1880)

Especie con escasas citas en la provincia de Albacete. Individuo muerto encontrado en un camino en las cercanías de Villa Manuela (Bonete), el 27 de mayo de 2010. Cuadrícula UTM 10x10: XJ 50, con entorno de campos de cultivo de cereal en secano, regadíos y manchas de vegetación de encinar mediterráneo (Juan Picazo y Julián Picazo).

AVES

Garcilla Cangrejera

Ardeola ralloides (Scopoli, 1769)

Un individuo visto en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) el 14 de abril de 2010 (Raúl Galindo y Antonia Zamora).

Morito Común

Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1776)

Especie con escasas citas en Albacete. Seis aves observadas en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) el 24 de julio de 2010 (Rafael Torralba). Un individuo en la Laguna de Tinajeros (Valdeganga) el 3 de septiembre de 2010 (Rafael Torralba y Julia Giménez).

Flamenco Común

Phoenicopterus roseus (Linnaeus, 1758)

Intento reproductor tardío en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón). Durante los censos de Flamenco Común en los humedales de Albacete realizados para la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

el 30 de julio de 2010 se observan 9 aves echadas y se estiman 68 nidos (Juan Picazo-ARAUCA y JCCM).

Datos de mortalidad derivados del suceso meteorológico acaecido en la tarde del 13 de agosto de 2010 en la Laguna de Hoya Usilla (Chinchilla de Montearagón) en las cercanías de Pétrola. Se produjo una granizada muy localizada de gran intensidad. Las cifras finales de flamencos recuperados fueron: 112 muertos y 23 heridos (Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad; Delegación de Agricultura y Medio Ambiente en Albacete, J.J.CC. de Castilla-La Mancha).

Cifra récord en los humedales de Albacete. 1.896 aves (327 juveniles) en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el 13 de septiembre de 2010 (Juan Picazo y Marisa García-Reyes).

Flamenco Enano

Phoenicopterus minor Saint-Hilaire, 1798

Un individuo junto con 12 flamencos comunes en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el 1 de mayo de 2010 (Antonio Fajardo y Ángel Lara-Grupo de Anillamiento Albacete).

Tarro Blanco

Tadorna tadorna (Linnaeus, 1758)

Cifra récord de parejas nidificantes en los humedales de Albacete, detectadas durante los censos de aves acuáticas realizados para la J.J.CC. de Castilla-La Mancha. Año 2010: 3-4 pareja en la Laguna de Salobrejo (Higuera); 1-2 en El Recreo (Corral Rubio); 3 en Hoya Grande (Corral Rubio); 2 en Baños de San José (Corral Rubio); 6-7 en Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón); 1-2 en Hoya Osilla (Chinchilla de Montearagón); 1 en Horna (Chinchilla de Montearagón); y 2 en Casa Villora (Chinchilla de Montearagón). En total se trataría de un mínimo de 7 a 10 parejas (Juan Picazo-ARAUCA y JCCM).

Cerceta Pardilla

Marmaronetta angustirostris (Ménétries, 1832)

Datos de reproducción en los humedales de Albacete (año 2010) de esta especie “En Peligro de Extinción”, obtenidos durante los censos de aves acuáticas realizados para la J.J.CC. de Castilla-La Mancha. Tres parejas nidificantes, respectivamente en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), Hoya Chica (Corral Rubio) y Ontalafia (Albacete) (Juan Picazo y Julián Picazo-ARAUCA y J.J.CC de Castilla-La Mancha).

Porrón Pardo*Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770)

Datos de esta especie “En Peligro de Extinción” y con escasísimas citas en la provincia. Tres aves en Hoya Grande (Corral Rubio) el 18 de septiembre de 2010 (Rafael Torralba y David Cañizares).

Malvasía Cabeciblanca*Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769)

Datos de reproducción en los humedales de Albacete de esta especie “En Peligro de Extinción”, obtenidos durante los censos de aves acuáticas realizados para la JJ.CC. de Castilla-La Mancha. Año 2009: 8 hembras reproductoras en la Laguna de Ontalafia (Albacete). Año 2010: 2 hembras reproductoras en la Laguna de Salobrejo (Higuera); 1 en El Recreo (Corral Rubio); 2 en Hoya Grande (Corral Rubio); 3 en Baños de San José (Corral Rubio); 2 en Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón); 0-1 en Horna (Chinchilla de Montearagón); 0-1 en Casa Villora (Chinchilla de Montearagón); y 5 hembras reproductoras en la Laguna de Ontalafia (Albacete) (Juan Picazo-ARAUCA y JCCM).

Milano Real*Milvus milvus* (Linnaeus, 1758)

Primera cita de reproducción comprobada en la provincia de Albacete. Nido con dos pollos grandes y un adulto sobrevolando la zona, el 25 de junio de 2010 en la Dehesa de Santa Marta (La Roda) (Francisco Tornero y David Cañizares).

Quebrantahuesos*Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758)

Dos aves volando cerca de Tiriez (Lezuza), el 20 de noviembre de 2009 (Elvira Serna). Un individuo en el Estrecho del Diablo (Yeste), el 1 de septiembre de 2010 (Rafael Torralba). Un ave en Los Poyos (Nerpio), el 11 de octubre de 2010 (Alberto Samper).

Buitre Leonado*Gyps fulvus* (Hablizl, 1783)

Datos recientes de reproducción en la provincia de Albacete. Año 2006 (5 parejas, según datos de EIN Castilla-La Mancha): 3 en Venta Ticiano (Yeste) y 2 en Rodas (Yeste). Año 2007 (25 parejas): 4 parejas en Venta Ticiano, 3 en Rodas y 18 en Tus (Yeste). Año 2008 (38 parejas): 5 en Venta Ticiano, 4

en Rodas, 26 en Tus y 3 en Collado de la Peña de la Buitrera (Vianos). Año 2009 (42 parejas): 5 en Venta Ticiano, 4 en Rodas, 29 en Tus y 4 en Collado de la Peña de la Buitrera. Año 2010 (46 parejas): 5 en Venta Ticiano, 3 en Rodas, 30 en Tus, 3 en Collado de la Peña de la Buitrera, 4 en el Puntal de la Escaleruela (Yeste) y 1 en Cotillas (Cotillas) (Rafael Torralba).

Águila Moteada

Aquila clanga Pallas 1811

Primera cita de la especie para la provincia de Albacete. Un juvenil el 20 de enero de 2010 en el Canal de La Lobera (Albacete) (Elvira Serna). (*) Cita sometida y pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología.

Un juvenil visto en Majadillo (Nerpio) el 14 de octubre de 2010 (Sergio O. Pinedo). (*) Cita sometida y pendiente de homologación.

Halcón de Eleonor

Falco eleonora Gené, 1839

Un ejemplar de fase oscura visto el 7 de junio de 2009 en los alrededores de La Lobera (Albacete) (David Cañizares).

Chorlito Carambolo

Charadrius morinellus (Linnaeus, 1758)

Presencia durante el otoño de 2009 en el Llano de Riachuelos (Albacete). La primera observación se produjo el 27 de agosto (14 aves) y la última correspondió al 29 de octubre (3 aves). El máximo se registró el 7 de septiembre, con 75 individuos (José Antonio Cañizares, David Cañizares, Rafael Torralba, Sergio Ovidio Pinedo, Antonio Manglano, Raúl Galindo, Antonia Zamora y otros).

Grupo de 175 en la Casa Nueva de la Alberiza (Albacete), el 7 de septiembre de 2010 (José Antonio Cañizares).

Chorlito Gris

Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)

Especie muy escasa como migrante en el interior peninsular. 3 ejemplares en una laguna de desbordamiento del río Lezuza al suroeste de la Casa del Capitán (Albacete), el 15 de mayo de 2010 (Pablo Benito y Julián Picazo).

Correlimos Gordo

Calidris canutus (Linnaeus, 1758)

Limícola muy escasa en el interior peninsular. Un adulto en plumaje

nupcial en la Laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola) el 13 de mayo de 2010 (José Antonio Cañizares).

Correlimos Pectoral

Calidris melanotos Vieillot, 1919

Primera cita en la provincia de Albacete. Un individuo en la Laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola) el 13 de octubre de 2010 (Rafael Torralba). (*) Cita sometida y pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología.

Zarapito Trinador

Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758)

Un ejemplar en la Laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola), el 10 de agosto de 2010 (Francisco Tornero y David Cañizares).

Archibebe Fino

Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)

Especie con escasísimas citas en la provincia de Albacete. Un ave en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) el 13 de septiembre de 2010 (Rafael Torralba).

Archibebe Patigualdo Chico

Tringa flavipes (Gmelin, 1789)

Primera cita para la provincia de Albacete de esta especie propia de Norteamérica. Un ave vista por primera vez el 7 de octubre de 2010 en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón) y observada reiteradamente por diferentes observadores/as al menos hasta el 9 de diciembre del mismo año (Rafael Torralba). (*) Cita sometida y pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología.

Falaropo Picogrueso

Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758)

Especie de limícola con escasas citas en el interior de la Península Ibérica. Un adulto en plumaje invernal en la Laguna Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola) el 3 de diciembre de 2009 (Laura Pareja, Rafael Torralba y David Cañizares).

Avutarda Común

Otis tarda (Linnaeus, 1758)

Número relevante de aves. Concentración invernal de 200 individuos

en el término municipal de Villalgordo del Júcar (cuadrícula UTM 10x10: WJ85), en dos grupos localizados a unos 3 km entre sí: uno de unas 120 hembras y otro de unos 80 machos (Félix Picazo).

Gaviota Patiamarilla

Larus michahellis Pallas, 1826

Tras la primera cita reproductora de la especie en humedales de Albacete (años 2008), durante los censos de aves acuáticas de 2010 realizados para la JJ.CC. de Castilla-La Mancha se vuelve a confirmar su reproducción esta vez en distintos humedales del complejo endorreico de Pétrola-Corral Rubio-La Higuera. Año 2010: 1 pareja en la Laguna de Salobrejo (Higueruela); 1-2 en El Recreo (Corral Rubio); 2 en Hoya Grande (Corral Rubio); 1 en Baños de San José (Corral Rubio); 1 en Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón); 0-1 en Hoya Osilla (Chinchilla de Montearagón); 1-2 en Casa Villora (Chinchilla de Montearagón); y 1 pareja en la Laguna de Ontalafia (Albacete). En total serían entre 8 y 11 parejas (Juan Picazo-ARAUCA y JCCM).

Búho Campestre

Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

Un individuo observado sobrevolando la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el 14 de junio de 2010 (Antonio Fajardo y Ángel Lara-Grupo de Anillamiento Albacete).

Alzacola

Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820)

Especie con escasísimas citas en Albacete. Un individuo visto en el Barranco Cueva de las Quinterías (Nerpio), el 15 mayo de 2010 (Richard Howard).

Buscarla Unicolor

Locustella luscinioides (Savi, 1824)

Un individuo juvenil capturado para anillamiento científico en la Laguna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el 31 de julio de 2010. Dado que las cuatro primeras primarias estaban a 3/4 aproximadamente de su total crecimiento, lo más probable es que se trate de un individuo nacido en Pétrola (Antonio Fajardo y Ángel Lara-Grupo de Anillamiento Albacete).

Carricerín Cejudo

Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)

Un individuo juvenil capturado para anillamiento científico en la La-

guna de Pétrola (Pétrola-Chinchilla de Montearagón), el 31 de julio de 2010 (Antonio Fajardo y Ángel Lara-Grupo de Anillamiento Albacete).

Mosquitero Ibérico

Phylloscopus ibericus (Ticehurst, 1937)

Datos de reproducción en la provincia de Albacete. Desde el 7 de mayo hasta el 16 de junio de 2010 se escucha semanalmente el canto de un macho y se observa defensa de territorio en una zona de soto en la casa de las Palomas (Casas de Lázaro-Peñascosa). Además, se captura para anillamiento un macho con protuberancia cloacal evidente (David Cañizares).

Alcaudón Dorsirrojo

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Segunda cita de la especie en la provincia. Un adulto en Mingarnao (Nerpio), el 10 de septiembre de 2010 (Ray Marsh).

Rabilargo

Cyanopica cyana (Pallas, 1766)

Cita fuera de su área de distribución conocida en la Península Ibérica y provincia de Albacete. Un ave vista el 21 de noviembre de 2008 en los alrededores de Bonete (Bonete) (Sandra García).

Gorrión Moruno

Passer hispaniolensis (Temminck, 1820)

Bando sobresaliente de aves. 500 individuos alimentándose en cultivo de girasol junto al Canal de El Salobral, el 29 de octubre de 2009 (Antonio Fajardo y Ángel Lara-Grupo de Anillamiento Albacete).

Nuevas localidades con presencia de la especie. Tres aves anilladas en Los Pinares del Júcar (Albacete) los días 11 y 25 de julio de 2009 (Grupo Manchego de Anillamiento-SAO). Dos machos cantando entre los tarajes de la Laguna de Ontalafia (Albacete), el 3 de julio de 2010 (Raúl Galindo, Víctor Cañizares y David Cañizares) y un macho capturado para anillamiento en la misma localidad el 7 de agosto de 2010 (Grupo Manchego de Anillamiento-SAO).

Camachuelo Común

Pyrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Especies con escasísimas citas en Albacete. Un macho adulto (EURING 4) capturado para anillamiento científico el 9 de diciembre de 2010 en Quita-

pellejos (Fuensanta) (Antonio Fajardo y Ángel Lara-Grupo de Anillamiento Albacete).

Picogordo

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Una pareja capturada para anillamiento científico en Puente Torres (Valdeganga), el 26 de mayo de 2010. La hembra presentaba una destacada placa incubatriz y el macho una prominente protuberancia cloacal (Antonio Fajardo y Ángel Lara-Grupo de Anillamiento Albacete).

Escribano Hortelano

Emberiza hortulana Linnaeus, 1758

Un individuo observado en Casa de Haches (Bogarra), el 23 de agosto de 2009 (José Antonio Tortosa). Un macho encontrado muerto bajo un tendido eléctrico en los alrededores de Peñas de San Pedro (Peñas de San Pedro), el 16 de septiembre de 2009 (David Cañizares).

FE DE ERRATAS: en la página 305 del nº 7 de SABUCO, se hace referencia a la Gaviota Patiamarilla *Larus cachinnas*, cuando debe decir Gaviota Patiamarilla *Larus michahellis*.



Chorlito Carambolo *Charadrius morinellus*. Ave juvenil capturada para anillamiento científico en el Llano de Riachuelos (Albacete).

Fotografía: David Cañizares.



Archibebe Patigualdo Chico *Tringa flavipes*. Laguna de Pétrola (Chinchilla de Montearagón-Pétrola). Fotografía: Antonio Manglano.