



National Audubon Society. 2011a. Christmas Bird Count <http://birds.audubon.org/christmas-bird-count> (Fecha de Consulta: 18-7-2011).

National Audubon Society. 2011b. 111 Annual Christmas Bird Count. CURRENT YEAR RESULTS http://cbc.audubon.org/cbccurrent/current_table.html (Fecha de Consulta: 18-7-2011)

Smith, R. y T. Smith. 2001. *Ecología*, cuarta edición. Madrid: Pearson Education.

Stiles, G. y A. F. Skutch. 2007. *Guía de aves de Costa Rica*, cuarta edición. Santo Domingo de Heredia: Editorial INBio.


Observaciones de *Vireo solitarius*

David Segura Sequeira

david_segse_19@yahoo.com

Del día 30 de enero del 2011 hasta el 6 de mayo del 2011, estuve observando el Vireo solitario (*Vireo solitarius*) la mayor parte en las mañanas (entre 6:15 a.m. y 7:40 a.m.), en el poblado de Santa Marta, Lourdes de Montes de Oca (9° 55' 53" N; 84° 02' 02" O) ubicado a una altitud de 1200m.s.n.m. Debido a su larga estadía se lograron hacer observaciones sobre su comportamiento del cual se desconoce mucho en Costa Rica.

La especie siempre se mantuvo dentro de bandadas mixtas con especies migratorias y residentes. Comúnmente se le observaba con *Setophaga petechia*, *Oreothlypis peregrina*, *Vireo philadelphicus*, *Vireo flavifrons* y *Basileuterus rufifrons*. Se mantenía la mayor parte del tiempo en los bordes de un bosque secundario en donde se mantenía en las partes bajas y medias. Forrajeaba en árboles como el jocote (*Spondias purpurea*), el cas (*Psidium friedrichsthalianum*), el guarumo (*Cecropia spp*) y el mango (*Mangifera indica*), pero el ave mostraba una preferencia muy alta por el árbol de ciprés (*Cupressus lucitanica*), de donde obtenía la mayor parte de su alimento.





Vireo solitarius. Foto: David Segura

Buscaba insectos con vuelos cortos, lentos y pesados entre las ramas. También escudriñaba en las hojas arrolladas. Realizaba también pequeñas persecuciones detrás de polillas. Frecuentemente realizaba un comportamiento de percharse, quedarse inmóvil por dos segundos y continuar su avance entre las ramas. Consumía

polillas, pequeños escarabajos, saltamontes y grillos; generalmente invertebrados de tamaño pequeño y mediano. No se le observó consumiendo otra clase de alimento. Emitía una nota ronca, similar a la del *Vireo flavifrons*, cuando se excitaba (ej. Cuando había algún depredador cerca).

Esta especie se encuentra desde el sur de Canadá hasta Honduras; se ha observado invernar desde el sur de los Estados Unidos de América hasta Costa Rica, oeste de Panamá y Cuba. En Costa Rica es un visitante de invierno muy raro o casual en las bajuras del Pacífico y las montañas del norte y centro del país (Stiles y Skutch 1989).

Agradezco a Renán Molina por revisar éste informe.

Referencias

Stiles, F. G. y A. F. Skutch. 2007. *A guide to the birds of Costa Rica*. Ithaca, New York: Cornell University Press.



Vireo solitarius. Foto: David Segura