

***Iberodorcadion lorquini* *lorquini* (Fairmaire, 1855) en la sierra de Filabres, Almería e *Iberodorcadion amorii segurense* (Escalera, 1911) en la sierra de Baza, Granada y una nueva localidad para *Iberodorcadion marmottani* (Escalera, 1900). España (Coleoptera, Cerambycidae).**

Antonio Verdugo \* & Antonio Hidalgo-Fontiveros\*\*

\* Héroes del Baleares, 10- 3º B, 11100 SAN FERNANDO, Cádiz  
([averdugopaez@gmail.com](mailto:averdugopaez@gmail.com))

\*\* Fuente del Oso, 3. 23700 LINARES (Jaén)  
([antonio\\_hidalgo\\_pontiveros@yahoo.es](mailto:antonio_hidalgo_pontiveros@yahoo.es))

**RESUMEN.** Se cita por primera vez de la sierra de Filabres (Almería) a *Iberodorcadion lorquini lorquini* (Fairmaire, 1855), así como de la sierra de Baza (Granada) a *Iberodorcadion amorii segurense* (Escalera, 1911). Se ofrece, asimismo, una nueva localidad para *Iberodorcadion marmottani* (Escalera, 1900). Debe excluirse del Catálogo andaluz de Coleoptera Cerambycidae la especie *Iberodorcadion isernii* (Pérez-Arcas, 1868).

**ABSTRACT.** *Iberodorcadion lorquini lorquini* (Fairmaire, 1855) is mentioned for the first time of the sierra de Filabres (Almeria) and, as well *Iberodorcadion amorii segurense* (Escalera, 1911) of the sierra de Baza (Granada). Also, we offer a new data for *Iberodorcadion marmottani* (Escalera, 1900). *Iberodorcadion isernii* (Pérez-Arcas, 1868) must be exclude from the Andalusian Catalogue of Coleoptera Cerambycidae.

#### NOTA CIENTIFICA.

Durante las pasadas primaveras de 2009 y 2010 los autores (por separado) han realizado una serie de visitas a distintas localidades andaluzas en busca de diferentes especies de *Iberodorcadion* Breuning, 1943, resultando tres de sus capturas novedosas para la distribución del género en Andalucía.

#### ***Iberodorcadion lorquini lorquini* (Fairmaire, 1855) (Figura 1).**

En lo referente a esta especie, no se conocía de la provincia de Almería más que del Puerto de la Ragua, en la vertiente oriental de sierra Nevada, siendo las capturas de la sierra de María, en el extremo septentrional de la provincia, pertenecientes a su ssp. *cobosi* Vives, 1979 (Vives, 1985; Verdugo, 2004).

La sierra de Filabres se encuentra a escasos 50 kms. del extremo oriental de sierra Nevada y separada de ésta por el valle del río Almanzora, por lo que prácticamente es una continuación de la misma.

#### **Datos de captura:**

Almería, Sierra de los Filabres, Calar Alto, Cuadrícula UTM 10x10 km. 30SWG31. Altitud: 2129m. Fecha: 30-IV-2010. Un individuo macho soleándose sobre una piedra, A. Hidalgo leg., en la coll. de su recolector. Mapa 1, localidad 1.

Verdugo, A. & Hidalgo-Fontiveros, A. *Iberodorcadion l. lorquini* (Fairmaire, 1855) en la sierra de Filabres, Almería e *Iberodorcadion amorii segurense* (Escalera, 1911) en la sierra de Baza, Granada y una nueva localidad para *Iberodorcadion marmottani* (Escalera, 1900). España (Coleoptera, Cerambycidae).

---

***Iberodorcadion amorii* (Marseul, 1856), ssp. *segurense* Escalera, 1911 (Figura 2).**

Esta especie ya se conocía de la provincia de Granada, en las estribaciones de la sierra de Segura, puerto el Pinar, a 1600 m., en donde convive con *Iberodorcadion marmottani* (Escalera, 1900) e *Iberodorcadion nigrosparsum* Verdugo, 1993 (Verdugo, 2004).

Lo interesante de ésta captura es que ha permitido dilucidar las sospechas que existían sobre nuestra cita de otra especie muy similar en dicha localidad. En nuestro trabajo sobre los Cerambycidae de Andalucía (Verdugo, 2004) citábamos de la sierra de Baza (Granada) a *Iberodorcadion isernii* (Pérez Arcas, 1868), sobre un único individuo recogido el 1 de mayo de 1997 (J. A. Hernández Ruiz leg.). Las capturas actuales de cuatro individuos (dos machos y dos hembras) nos han permitido corregir el error inicial y determinar que el taxón presente en los Prados del Rey de la sierra de Baza, es realmente *segurense* Escalera y no *isernii* Pérez Arcas.

Por tanto habrá que excluir del catálogo andaluz de Coleoptera Cerambycidae a *Iberodorcadion isernii* (Pérez Arcas)

**Datos de captura:**

Granada, Sierra de Baza, Prados del Rey, Cuadrícula UTM 10x10 km. 30SWG13. Altitud: 1994m. Fecha: 1-V-2010 y 15-V-2010, cuatro ejemplares bajo piedras, 2 de cada sexo, A. Hidalgo leg. Un macho y una hembra en la colección de cada autor. Mapa 1, localidad 2.

***Iberodorcadion marmottani* (Escalera, 1900) (Figura 3)**

Esta especie es endémica de la región bética, conociéndose de las comunidades de Castilla la Mancha (Albacete), Murcia y Andalucía (Almería, Córdoba, Granada y Jaén), siempre en localidades por encima de los 1500 metros de altitud.


Fue capturada por el primer autor (AV) una única pareja, en cópula, en los límites del término de Cazorla, en la sierra del mismo nombre y reproducido en cautividad, lo que nos ha permitido obtener una amplia serie de los mismos.

**Datos de captura:**

Jaén, sierra de Cazorla, Torcal Cerecino. Cuadrícula UTM 10x10 km. 30SWG19. Altitud: 1700 m. Fecha: 6-IV-2009, una pareja en cópula. A Verdugo leg. y coll. particular. Mapa 1, localidad 3. Se trata de una nueva localidad eso sí, dentro de la distribución ya conocida para la especie.

## BIBLIOGRAFÍA

- VERDUGO, A. 2004. *Los Cerambícidos (Coleoptera, Cerambycidae) de Andalucía*. Monográfico de la Sociedad Andaluza de Entomología nº 1: 5-149.
- VIVES, E., 1985. *Cerambícidos (Coleoptera) de la Península Ibérica y de las Islas Baleares*. Treballs del Museu de Zoologia de Barcelona, 2:1-137 (1984).



**MAPA 1.**



**Figura 1**

**Figura 2**

**Figura 3**

---

**Recibido:** 1 Julio 2010  
**Aceptado:** 7 Julio 2010  
**Publicado en línea:** 8 Julio 2010