

## **Efectos en el rendimiento físico a corto plazo de dos programas de entrenamiento neuromuscular con diferente orientación aplicados en jugadores de fútbol de élite U-17**

### **Short-term physical performance effects of two different neuromuscular oriented training programs on U-17 elite soccer players**

**Javier Raya-González<sup>1</sup>, Luis Suárez-Arrones<sup>1</sup>, Manuel Moreno-Puentedura<sup>2</sup>,  
Jesús Ruiz-Márquez<sup>2</sup> y Eduardo Sáez de Villarreal<sup>1</sup>**

1.Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. España

2.Córdoba C.F., Departamento de Preparación Física. España

#### **Resumen**

El objetivo de este trabajo fue comparar el efecto de dos programas de entrenamiento neuromuscular (orientación vertical vs horizontal), realizados durante 6 semanas, sobre el rendimiento físico en jugadores de fútbol. Dieciséis futbolistas de  $16,6 \pm 0,3$  años fueron asignados de manera aleatoria en dos grupos experimentales que complementaron su entrenamiento habitual de fútbol con un programa de entrenamiento neuromuscular dos días a la semana. El entrenamiento del grupo vertical ( $n=8$ , GV) consistió en los ejercicios  $\frac{1}{2}$  sentadilla y squat lateral realizados en un dispositivo inercial, y salto vertical al cajón, y el entrenamiento del grupo horizontal ( $n=8$ , GH) estuvo basado en ejercicios resistidos de sprint lineal y con cambio de dirección (COD). Antes y después del periodo de intervención se midió la altura de salto vertical, el tiempo de sprint lineal y COD y la potencia del tren inferior. Se obtuvieron mejoras sustanciales (probables a muy probables) en GV en salto con contramovimiento (CMJ) [TE: 0,49, VC: Probable (93/7/0%)], test de Abalakov (ABK) [TE: 0,38, VC: Probable (83/16/1%)] y velocidad media propulsiva (VMP) en todas las cargas utilizadas, además de empeorar el tiempo de sprint lineal y COD hacia la izquierda (COD-I). El GH mejoró sustancialmente el tiempo de sprint 10m [TE = 0,63, VC: Muy Probable (98/2/0%)], COD hacia la derecha (COD-D) [TE = 0,36, VC: Probable (76/23/1%)], COD-I [TE = 0,34, VC: Probable (80/19/1%)], y VMP con 15-30-50kg, además de una posible mejora en el tiempo de sprint en 20 y 30m. El análisis inter-grupos mostró mejoras sustanciales mayores en GV en CMJ [TE = 0,39, VC: Muy Probable (76/22/0%)], y en GH en tiempo de sprint en 10-20-30m y COD hacia la derecha (COD-D). Los resultados obtenidos sugieren que el entrenamiento del GH es más efectivo en la optimización de la condición física específica del futbolista.

**Palabras clave:** capacidad de salto; velocidad media propulsiva; sobrecarga excéntrica; sprint lineal; cambio de dirección.

#### **Abstract**

The aim of this research was to compare the effects of two different neuromuscular training programs (vertical vs. horizontal orientation), conducted during 6 weeks, on the physical performance of soccer players in-season. Sixteen soccer players of  $16.6 \pm 0.3$  years were randomly assigned to two equally large experimental groups, and both supplemented the soccer training with a specific neuromuscular training program 2 days/week. Vertical group's training ( $n=8$ , VG) was composed by half-squat using a flywheel device and vertical jump to box and horizontal group's training ( $n=8$ , HG) consisted on linear and non-linear resisted sprints. Before and after the training period jumping ability, linear and non-linear sprint and lower-limb power were measured. Substantial improvements (likely to very likely) were found in the VG in countermovement jump (CMJ) (ES: 0.49), Abalakov test (ABK) (ES: 0.38) and Mean Propulsive Velocity (all load measured), in addition to decrease the performance in linear and non-linear sprint (COD-L). The HG improved substantially in 10m sprint (Effect size [ES]: 0.63), COD-R (ES: 0.36), COD-L (ES: 0.34) and in Mean Propulsive Velocity in 15-30-50kg. Furthermore, a possible improvement in 20 and 30m sprint was also reported in HG. Between-groups analysis showed greater substantial improvements in VG in CMJ (ES: 0.39), and in HG in 10-20-30m sprint and COD-R. The results obtained suggest that horizontal group's training program could be more effective in order to optimize the specific physical condition of the soccer players.

**Key words:** jumping ability; mean propulsive velocity; eccentric-overload; linear sprint; change-of-direction.

Correspondencia/correspondence: Javier Raya-González  
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla. España  
Email: rayagonzalezjavier@gmail.com

## Introducción

El fútbol es un deporte intermitente (Di Salvo, Baron, Tschan, Calderon-Montero, Bachl, y Pigozzi, 2007) donde acciones de alta intensidad como sprints, saltos y cambios de dirección, pueden llegar a ser factores determinantes para conseguir el éxito deportivo, tanto en futbolistas adultos (Reilly, Bangsbo y Franks, 2000) como en jóvenes (Castagna, D'Ottavio y Abt, 2003). Además, los desplazamientos a alta intensidad y este tipo de acciones durante la competición se han visto incrementadas en los últimos años (Bush, Barnes, Archer, Hogg y Bradley, 2015), por lo que es esencial tenerlas en cuenta a la hora de programar el entrenamiento de fútbol (Hoff y Helgerud, 2004).

Para mejorar la capacidad de realizar las acciones de alta intensidad que se suceden durante el juego, el entrenamiento de fuerza cobra un papel fundamental en la optimización del rendimiento (Cronin y Hansen, 2005). Con el fin de obtener estas mejoras en los futbolistas, se han aplicado principalmente programas de fuerza constituidos por ejercicios orientados prioritariamente en el plano vertical, los cuales han mostrado efectos positivos en jugadores de fútbol sobre la capacidad de salto vertical (Thomas, French y Hayes, 2009; Chelly, Fathloun, Cherif, Ben Amar, Tabka, y Van Praagh, 2009; Wong, Chamari y Wisloff, 2010), la reducción del tiempo de sprint en diferentes distancias (Chelly y col., 2009; Sander, Keiner, Wirth, y Schmidbleicher, 2013; Wong y col., 2010) y el aumento de fuerza y/o potencia del tren inferior (Chelly y col., 2009; Sander y col., 2013). Otras variables relacionadas con el rendimiento en fútbol como la agilidad (Thomas y col., 2009), la velocidad del balón tras golpeo, la distancia recorrida en test intermitentes o la economía de carrera (Wong y col., 2010) también se han visto mejoradas debido al efecto de este tipo de programas de fuerza. En esta línea, Thomas y col. (2009) utilizaron ejercicios pliométricos dos veces a la semana durante seis semanas como trabajo adicional al entrenamiento de fútbol, obteniendo mejoras significativas en la agilidad y capacidad de salto vertical. Sander y col. (2013) propusieron un entrenamiento de fuerza basado en ejercicios tradicionales (front squat y back squat) en jugadores jóvenes durante dos años, mejorando estos su fuerza dinámica máxima y el tiempo en sprint en 30m. Por otro lado, Gorostiaga, Izquierdo, Ruesta, Iribarren, González-Badillo, e Ibáñez, (2004) combinaron en su trabajo ejercicios tradicionales y pliométricos, consiguiendo tras 11 semanas de entrenamiento mejoras significativas en la altura de salto con contramovimiento (CMJ) sin carga y con cargas de 20 y 30kg, reduciendo también el tiempo de sprint en 5m.

También se han utilizado, aunque en menor medida, programas de fuerza basados en ejercicios orientados prioritariamente en el plano horizontal. Meylan y Malatesta (2009) llevaron a cabo un programa de fuerza con mayor orientación horizontal (ejercicios pliométricos) en jugadores jóvenes y durante 8 semanas, obteniendo mejoras en el tiempo de sprint y agilidad, además de incrementar la capacidad de salto vertical. En la misma línea, Marques, Pereira, Reis, y van den Tillaar, (2013) administraron en futbolistas jóvenes un entrenamiento pliométrico combinado con diferentes ejercicios de sprint. Tras las seis semanas que duró la intervención, se mejoró la capacidad de salto y el tiempo en sprint en los jugadores que participaron en el proceso de intervención. Por el contrario, Ronnestad, Kvamme, Sunde, y Raastad. (2008) no encontraron mejoras en la capacidad de salto ni el tiempo de sprint tras la aplicación durante siete semanas de un programa de fuerza prioritariamente horizontal en futbolistas profesionales.

Gracias a estudios previos conocemos los efectos de diferentes programas de fuerza con mayor orientación vertical y/u horizontal sobre las capacidades de rendimiento de los jugadores de fútbol. En cambio, son muy pocas las investigaciones que comparan los efectos de ambos tipos de entrenamiento. Los Arcos, Yanci, Mendiguchia, Salinero, Brughelli, y Castagna. (2014) compararon los efectos de un programa de entrenamiento vertical con otro combinado (vertical + horizontal) demostrando como el programa combinado era más efectivo en la mejora de capacidad de salto y la potencia del tren inferior. Siguiendo esta línea, Ramírez-Campillo, Gallardo, Henriquez-Olguín, Meylan, Martínez, Álvarez, Caniuqueo, Cadore, e Izquierdo. (2015) aplicaron en futbolistas jóvenes un programa pliométrico de diferente orientación (vertical, horizontal o combinado) durante seis semanas, obteniendo mayores mejoras en la capacidad de salto y tiempo en sprint en los jugadores incluidos en el programa combinado. Hasta la fecha aún no se han comparado los efectos de dos programas de entrenamiento neuromuscular (sobrecarga excéntrica + pliometría vs sprint lineal y con cambio de dirección resistidos) sobre el rendimiento en salto, sprint lineal, sprint con cambio de dirección (COD) y potencia muscular del tren inferior en futbolistas jóvenes de alto nivel. Debido a que a ambos métodos de entrenamiento se le presuponen mejoras sobre el rendimiento físico en futbolistas, es necesario comparar sus efectos para obtener información relevante que facilite la posterior inclusión de los mismos en las programaciones de entrenamiento en fútbol.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar el efecto de dos programas de entrenamiento neuromuscular, con una mayor orientación vertical u horizontal, sobre el rendimiento físico en futbolistas de élite junior.

## Método

### *Participantes*

Dieciséis futbolistas junior de élite aceptaron voluntariamente participar en este estudio. Los jugadores de fútbol pertenecían al mismo equipo de la cantera de un club de fútbol profesional de 1ª División de España, y fueron divididos de forma aleatoria en dos grupos: Grupo Vertical [GV; n=8, (16,7 ± 0,3 años de edad, 177,1 ± 6,5cm de altura, 65,9 ± 5,4kg de masa corporal, y 21,1 ± 1,8kg/ m<sup>2</sup> de índice de masa corporal)] y Grupo Horizontal [GH; n=8, (16,5 ± 0,3 años de edad, 176,9 ± 7,3cm de altura, 66,4 ± 4,8kg de masa corporal, y 21,6 ± 1,5kg/ m<sup>2</sup> de índice de masa corporal)]. Antes de su participación en el estudio cada jugador completó un cuestionario sobre su historia médica e historial de lesiones. Los porteros fueron excluidos de la muestra de estudio, y los jugadores que no completaron al menos el 80% de las sesiones de entrenamiento fueron omitidos en el análisis estadístico posterior. Antes de iniciar el estudio, los participantes fueron completamente informados sobre el protocolo a seguir, y el consentimiento escrito e informado fue rellenado por los padres al ser los participantes menores de edad. Todos los participantes eran libres de abandonar el estudio en cualquier momento sin ninguna penalización. Los procedimientos fueron aprobados por el Comité de Ética de la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, (España) y de acuerdo con la Declaración de Helsinki (2013).

### *Procedimiento*

El estudio fue diseñado para comparar el efecto de un programa de entrenamiento neuromuscular con mayor orientación vertical con otro protocolo de entrenamiento neuromuscular con mayor orientación horizontal. Durante el periodo de intervención, los jugadores siguieron participando en su entrenamiento habitual de fútbol. La rutina semanal consistía en 4 sesiones por semana (martes, miércoles, jueves y viernes) con los siguientes contenidos: desarrollo técnico-táctico, entrenamiento de resistencia, entrenamiento de fuerza, prevención de lesiones y trabajo de flexibilidad (70%, 10%, 7%, 6% y 7% del tiempo total de entrenamiento, respectivamente). Además, durante el tiempo que duró el diseño experimental, los jugadores disputaron nueve partidos de competición (domingo). La intervención duró nueve semanas (entre los meses de enero, febrero y marzo, correspondientes al periodo competitivo). La primera semana se destinó a la familiarización de los jugadores con los dispositivos a utilizar y los test a realizar, en la segunda semana los participantes llevaron a cabo las sesiones del pre-test y en la última semana las sesiones del post-test. En ambas jornadas los futbolistas fueron instruidos para realizar su última comida tres horas antes del comienzo de las pruebas, no tomar bebidas con cafeína, ni realizar ejercicio físico intenso el día de la toma de datos (Sánchez-Sánchez, Hernández, Marcos, Rodríguez y Carretero, 2016). Todos los test se realizaron a la misma hora, entre un gimnasio y el campo de hierba artificial donde el equipo realizaba su entrenamiento, con la indumentaria habitual y el calzado que normalmente usaba el jugador. Los test fueron supervisados por los mismos técnicos especialistas en dos días diferentes, con 48 horas de separación entre cada sesión. El primer día de evaluación, además de realizar el registro de las medidas antropométricas de todos los jugadores, se realizaron los test de salto vertical y el test de media sentadilla. En el segundo día se llevó a cabo el test de sprint lineal y sprint con COD. Antes de cada sesión se realizó un calentamiento estandarizado, que consistió en tres minutos de carrera continua a baja intensidad, ejercicios de movilidad articular y acciones de salto y sprint sobre distancias de 10 a 30m. Los programas de entrenamiento tuvieron una duración de seis semanas y consistieron en dos sesiones semanales (martes y jueves), las cuales se realizaron previamente a la sesión de entrenamiento de fútbol. El entrenamiento del GV, consistió en la combinación de ejercicios realizados en un dispositivo inercial con sobrecarga excéntrica (media sentadilla y squat lateral) y ejercicios pliométricos (salto al cajón) (Tabla 1). El entrenamiento del GH, consistió en ejercicios de sprint lineal y COD de 90° (dos cambios de dirección en cada repetición, uno a derecha y otro a izquierda) usando un chaleco lastrado con un incremento de peso progresivo en función del porcentaje del peso corporal de cada jugador (Tabla 2). Ambos programas de entrenamiento neuromuscular fueron administrados en base a parámetros similares de volumen e intensidad. Todos los jugadores realizaron un calentamiento estandarizado previo a la sesión específica de entrenamiento neuromuscular, que consistió en una parte general basada en ejercicios aeróbicos y de movilidad, similar para ambos grupos, y una parte específica, en la que se propuso el ejercicio de ½ sentadilla bilateral, unilateral con cada pierna y bilateral con salto para el GV; y ejercicios de sprint y COD de 90° sobre distancias de 10 a 30m para el GH.

Tabla 1. Programa de entrenamiento neuromuscular con mayor orientación vertical.

Semana	Sesión	Ejercicio 1	Ejercicio 2	Intensidad	Recuperación entre series	Altura
1	1	½ Sentadilla 4x(2+6)	-	Máxima	3min	-
1	2	½ Sentadilla 4x(2+6)	-	Máxima	3min	-
2	3	½ Sentadilla 2x(2+8)	SL 2x(2+6)	Máxima	3min	-
2	4	½ Sentadilla 2x(2+8)	SL 2x(2+6)	Máxima	3min	-
3	5	Squat Lateral 4x(2+6)	-	Máxima	3min	-
3	6	SV a Caja 3x15 Bilateral	-	Máxima	2min	20cm
4	7	SV a Caja 3x20 Bilateral	-	Máxima	2min	20cm
4	8	SV a Caja 4x20 Bilateral	-	Máxima	2min	40cm
5	9	SV a Caja 2x20 Unilateral	-	Máxima	2min	20cm
5	10	SV a Caja 3x20 Unilateral	-	Máxima	2min	40cm
6	11	SV a Caja 2x20 Unilateral	-	Máxima	2min	40cm
6	12	SV a Caja 3x20 Bilateral	-	Máxima	2min	60cm

SV: Salto Vertical; SL: Squat Lateral

Tabla 2. Programa de entrenamiento neuromuscular con mayor orientación horizontal.

Semana	Sesión	Ejercicio 1	Series/Reps	Distancia	Intensidad	Recuperación entre series	% PC
1	1	COD 15+15+15	2x3	45m	Máxima	2min 30s	0 %
1	2	Sprint Lineal	2x3	40m	Máxima	3min	0 %
2	3	COD 15+15+15	2x4	45m	Máxima	2min 30s	4-5 %
2	4	Sprint Lineal	2x4	40m	Máxima	3min	4-5 %
3	5	COD 10+10+10	2x5	30m	Máxima	2min 30s	7,5-8,5 %
3	6	Sprint Lineal	3x3	30m	Máxima	3min	7,5-8,5 %
4	7	COD 10+10+10	2x5	30m	Máxima	2min 30s	11-12 %
4	8	Sprint Lineal	3x3	30m	Máxima	3min	11-12 %
5	9	COD 5+5+5	3x3	15m	Máxima	2min 30s	14-15 %
5	10	Sprint Lineal	4x3	20m	Máxima	3min	14-15 %
6	11	COD 5+5+5	2x3	15m	Máxima	2min 30s	7,5-8,5 %
6	12	Sprint Lineal	2x3	20m	Máxima	3min	7,5-8,5 %

Abreviaturas: COD, Cambio de dirección; PC, peso corporal

### *Instrumentos y Test*

*Antropometría.* La altura se midió utilizando un estadímetro de pared (*222 Seca; Seca, Nueva York, EE.UU*) con una precisión de 2mm y un rango de medición de 130-210cm. La masa corporal se midió utilizando una báscula médica, con una precisión de 0.2kg y un rango de medición de 2-130kg (Tanita BC-418 MA; Tanita, Tokyo, Japan).

*Salto vertical.* Tras un calentamiento estandarizado, los futbolistas ejecutaron tres saltos con contramovimiento (CMJ) y 3 Abalakov (ABK), utilizando para valorar la altura de cada uno de los saltos una plataforma de rayos infrarrojos (*Optojump Next, Microgate®, Bolzano, Italia*). Durante toda la ejecución del CMJ las manos de los participantes debían estar colocadas en sus caderas, aunque durante la ejecución del ABK se permitió el movimiento de los brazos de manera coordinada y sincronizada con la acción de flexo-extensión de las piernas. Se recomendó a los participantes que realizaran la recepción de cada salto en una posición vertical y que flexionaran las rodillas después del aterrizaje (Sáez de Villarreal, Suárez-Arrones, Requena, Haff y Ferrete, 2015). El mejor valor de cada test fue seleccionado para el posterior análisis estadístico y el tiempo de recuperación propuesto entre cada salto fue de 2min.

*Test de Media Sentadilla.* Para el tren inferior se determinó la velocidad media propulsiva (VMP) en un test incremental de cargas en el ejercicio de ½ sentadilla (López-Segovia, Palao y González-Badillo, 2010). Los participantes ejecutaron la ½ sentadilla desde una posición de inicio completamente extendidos con la barra en contacto con los hombros. A la señal, los participantes ejecutaron la fase excéntrica de manera controlada, seguido y sin pausa, de una extensión de las piernas lo más rápido posible para volver a la posición inicial tras finalizar la fase concéntrica. El tronco debía mantenerse lo más derecho posible, y un experto en entrenamiento de fuerza guió el desarrollo de este test y ayudó a que los participantes realizaran la técnica de manera correcta. Los test fueron realizados con una barra guiada (*Máquina Smith®, Modelo Adan-Sport, Granada, España*) la cual permitía solo movimientos verticales. Se analizó la velocidad media propulsiva gracias a un encoder lineal fijado en la barra. Por medio de su software informático específico se registraron y filtraron los valores obtenidos (*T-Force System®, Ergotech, Murcia, Spain*). Se realizó un calentamiento previo que consistió en una serie de 10 repeticiones con una carga de 15kg. El test se inició con un peso de 15kg en la primera serie y acabó con un peso 60kg en la última serie, con pesos de 30kg, 40kg y 50kg para las series intermedias. En cada serie los participantes ejecutaron 4 repeticiones, y se estableció una recuperación de 5min entre cada serie. Para el posterior análisis estadístico, se seleccionó el mejor valor obtenido en base a la VMP en cada una de las cargas utilizadas.

*Test de Sprint lineal.* Para valorar los tiempos de sprint se emplearon fotocélulas eléctricas (*Polifermo Light Radio, Microgate®, Bolzano, Italia*). Todos los participantes realizaron dos sprints lineales midiendo el tiempo en las distancias de 10, 20 y 30m (Buchheit, Mendez-Villanueva, Delhomel, Brughelli y Ahmaidi, 2010). En el inicio de cada test el pie delantero se colocó 0,5m antes de la primera fotocélula. Se eligió el mejor valor de cada test para el consiguiente análisis estadístico. El tiempo de descanso entre cada repetición fue de 3min.

*Test de Sprint con Cambio de Dirección.* Todos los participantes realizaron dos esprines de 20m (10+10m) con un de COD de 90° (Figura 1) hacia la derecha (COD-D) y dos esprines con un COD de 90° hacia la izquierda (COD-I) (Hader, Palazzi y Buchheit, 2015). En el inicio de cada test el pie delantero se colocó 0,5m antes de la primera fotocélula (*Polifermo Light Radio, Microgate®, Bolzano, Italia*). Para el posterior análisis estadístico se eligió el

mejor valor de cada test. Se estableció un tiempo de recuperación de 2min entre repeticiones. El tiempo en el sprint lineal de 20m de distancia fue usado con el tiempo en el sprint con cambio de dirección de 20m para el cálculo del porcentaje de pérdida de COD.




Figura 1. Representación esquemática de la posición de salida y de los cambios de dirección de 90°

### *Análisis estadístico*

Los datos se presentan como media  $\pm$  desviación estándar (DE). Todas las variables objeto de estudio presentaron una distribución normal (test Shapiro-Wilk). El tamaño del efecto [TE, límite de confianza (LC) 90%] según la propuesta de Cohen (1988) y adaptada por Hopkins, Marshall, Batterham, y Hanin. (2009) fue calculado para comparar la magnitud de las diferencias entre el pre-test y el post-test dentro de cada grupo, al igual que para la comparación entre grupos. Los rangos establecidos para los valores del TE fueron  $>0,2$  (pequeño),  $>0,6$  (moderado), y  $>1,2$  (grande) (Hopkins y col., 2009). Las diferencias cuantitativas fueron valoradas de manera cualitativa (VC) (Hopkins y col., 2009) estableciendo las siguientes probabilidades:  $<1\%$ , casi seguro que no; 1% a 5%, muy poco probable; 5% a 25%, poco probable; 25% a 75%, posible; 75% a 95%, probable; 95% a 99%, muy probable; y  $>99\%$ , casi seguro. Se determinó un efecto sustancial a diferencias con una probabilidad  $>75\%$  al igual que en previos estudios (Suárez-Arrones, Tous-Fajardo, Núñez, Gonzalo-Skok, Gálvez, y Méndez-Villanueva, 2014).

## **Resultados**

No existieron diferencias inter-grupos en ninguna de las variables de rendimiento evaluadas durante el pre-test (Tabla 3). El análisis estadístico intra-grupo mostró en el GV mejoras sustanciales en el CMJ [1,96cm (5,66%), TE = 0,49, VC: Probable (93/7/0%)], ABK [1,75cm (4,24%), TE = 0,38, VC: Probable (83/16/1%)] y en la VMP con todas las cargas evaluadas en  $\frac{1}{2}$  sentadilla. También se produjo en este grupo una reducción en el rendimiento en el tiempo de sprint lineal en 10m [0,04s (2,23%), TE = -0,69, VC: Probable (2/8/90%)], 20m [0,07s (2,32%), TE = -0,86, VC: Muy probable (1/3/96%)], 30m [0,05s (1,20%), TE = -0,45, VC: Probable (4/18/78%)] y en el tiempo de sprint con cambio de dirección de 90° hacia la izquierda (COD-I) [0,07s (1,95%), TE = -0,33, VC: Probable (0/6/94%)]. Además, en el GV tuvo lugar un aumento sustancial de la masa corporal [0,84kg (1,27%), TE = 0,14, VC:

Probable (89/11/0%)] y del índice de masa corporal [0,27kg/ m<sup>2</sup> (1,28%), TE = 0,14, VC: Probable (90/10/0%)]. Se encontraron mejoras sustanciales en el GH en el tiempo de sprint en 10m [-0,05s (-2,64%), TE = 0,63, VC: Muy Probable (98/2/0%)], en el tiempo de sprint con cambio de dirección de 90° hacia la derecha (COD-D) [-0,05s (-1,37%), TE = 0,36, VC: Probable (76/23/1%)], en el COD-I [-0,05s (-1,36%), TE = 0,34, VC: Probable (80/19/1%)] y en la VMP en algunas de las cargas utilizadas en ½ sentadilla. El GH no presentó cambios sustanciales en ninguna de las variables antropométricas estudiadas.

La comparación inter-grupos reflejó diferencias sustanciales (>75%) en diversas variables del rendimiento (Tabla 4). El GV manifestó mejoras sustancialmente mayores respecto al GH en el CMJ [TE = 0,39, VC: Muy Probable (76/22/0%)], mientras que el GH presentó unas mayores mejoras en el tiempo de sprint en 10m [ES = 0,68, VC: Probable (93/7/0%)], 20m [ES = 0,72, VC: Muy probable (96/4/0%)] y 30m [ES = 0,57, VC: Probable (88/11/1%)], y en el tiempo de sprint con cambio de dirección de 90° hacia la derecha (COD-D) [ES = 0,73, VC: Probable (91/8/1%)] en comparación con el VG. No existieron diferencias inter-grupos en la VMP en ninguna de las cargas utilizadas.



Tabla 3. Cambios en el rendimiento después del entrenamiento en ambos grupos, Media  $\pm$  SD

Variable	Grupo Vertical						Grupo Horizontal					
	Pre-test	Post-test	% cambio	TE (90% CL)	Probabilidad	VC	Pre-test	Post-test	% cambio	TE (90% CL)	Probabilidad	VC
CMJ (cm)	34,60 $\pm$ 3,50	36,56 $\pm$ 3,58	5,66	0,49 $\pm$ 0,33	93/7/0%	Probable	35,97 $\pm$ 4,01	36,41 $\pm$ 3,82	1,22	0,10 $\pm$ 0,30	28/67/5%	Posible
Abalakov (cm)	41,30 $\pm$ 4,40	43,05 $\pm$ 3,22	4,24	0,38 $\pm$ 0,33	83/16/1%	Probable	41,88 $\pm$ 3,69	42,46 $\pm$ 3,68	1,38	0,14 $\pm$ 0,23	32/67/1%	Posible
10m sprint (s)	1,79 $\pm$ 0,06	1,83 $\pm$ 0,03	2,23	-0,69 $\pm$ 0,65	2/8/90%	Probable	1,89 $\pm$ 0,08	1,84 $\pm$ 0,06	-2,64	0,63 $\pm$ 0,31	98/2/0%	Muy probable
20m sprint (s)	3,02 $\pm$ 0,07	3,09 $\pm$ 0,05	2,32	-0,86 $\pm$ 0,57	1/3/96%	Muy probable	3,16 $\pm$ 0,13	3,13 $\pm$ 0,10	-0,95	0,17 $\pm$ 0,34	44/52/4%	Posible
30m sprint (s)	4,20 $\pm$ 0,10	4,25 $\pm$ 0,07	1,20	-0,45 $\pm$ 0,58	4/18/78%	Probable	4,38 $\pm$ 0,18	4,33 $\pm$ 0,12	-1,14	0,24 $\pm$ 0,39	58/38/4%	Posible
COD-D (s)	3,64 $\pm$ 0,14	3,69 $\pm$ 0,07	1,37	-0,33 $\pm$ 0,46	3/27/70%	Posible	3,69 $\pm$ 0,11	3,64 $\pm$ 0,07	-1,37	0,36 $\pm$ 0,49	76/23/1%	Probable
COD-I (s)	3,59 $\pm$ 0,11	3,66 $\pm$ 0,05	1,95	-0,57 $\pm$ 0,40	0/6/94%	Probable	3,67 $\pm$ 0,13	3,62 $\pm$ 0,10	-1,36	0,34 $\pm$ 0,29	80/19/1%	Probable
%Pérdida- COD-D (s)	0,20 $\pm$ 0,03	0,19 $\pm$ 0,02	-5,01	0,22 $\pm$ 0,53	53/38/9%	Posible	0,17 $\pm$ 0,03	0,16 $\pm$ 0,02	-5,88	0,06 $\pm$ 0,58	33/45/22%	Posible
%Pérdida- COD-I (s)	0,19 $\pm$ 0,02	0,18 $\pm$ 0,03	-5,26	0,12 $\pm$ 0,45	37/52/11%	Posible	0,16 $\pm$ 0,04	0,15 $\pm$ 0,03	-6,25	0,10 $\pm$ 0,42	34/55/11%	Posible
VMP15	1,01 $\pm$ 0,14	1,12 $\pm$ 0,14	10,89	0,65 $\pm$ 0,67	88/10/2%	Probable	1,02 $\pm$ 0,08	1,06 $\pm$ 0,11	6,01	0,65 $\pm$ 0,68	87/10/3%	Probable
VMP30	0,96 $\pm$ 0,09	1,03 $\pm$ 0,11	7,29	0,68 $\pm$ 0,47	96/4/0%	Muy probable	0,89 $\pm$ 0,10	0,94 $\pm$ 0,10	5,62	0,46 $\pm$ 0,57	78/19/3%	Probable
VMP40	0,88 $\pm$ 0,09	0,96 $\pm$ 0,12	9,09	0,64 $\pm$ 0,60	90/9/1%	Probable	0,85 $\pm$ 0,10	0,87 $\pm$ 0,06	2,35	0,25 $\pm$ 0,49	58/36/6%	Posible
VMP50	0,84 $\pm$ 0,08	0,88 $\pm$ 0,09	4,76	0,43 $\pm$ 0,47	80/18/2%	Probable	0,77 $\pm$ 0,08	0,80 $\pm$ 0,06	3,90	0,44 $\pm$ 0,27	93/7/0%	Probable
VMP60	0,79 $\pm$ 0,07	0,81 $\pm$ 0,05	2,53	0,40 $\pm$ 0,37	82/17/1%	Probable	0,73 $\pm$ 0,08	0,74 $\pm$ 0,09	1,37	0,16 $\pm$ 0,31	40/57/3%	Posible

Abreviaturas: CL, intervalos de confianza; TE, tamaño del efecto; VC, evaluación cualitativa; CMJ, salto con contramovimiento, VMP; velocidad media propulsiva; COD-D, cambio de dirección hacia la derecha; COD-I, cambio de dirección hacia la izquierda

Tabla 4. Diferencias entre GV y GH tras el proceso de entrenamiento, Media  $\pm$  SD

Variable	% GV	% GH	TE (90% CL)	Probabilidad	VC
CMJ (cm)	5,66*	1,22	0,39 $\pm$ 0,46	76/22/2%	Probable
Abalakov (cm)	4,24	1,38	0,31 $\pm$ 0,43	67/30/3%	Posible
10m sprint (s)	2,23	-2,64*	0,68 $\pm$ 0,54	97/3/0%	Muy probable
20m sprint (s)	2,32	-0,95*	0,72 $\pm$ 0,49	96/4/0%	Muy probable
30m sprint (s)	1,20	-1,14*	0,57 $\pm$ 0,54	88/11/1%	Probable
COD-D (s)	1,37	-1,37*	0,73 $\pm$ 0,67	91/8/1%	Probable
COD-I (s)	1,95	-1,36	0,92 $\pm$ 0,47	99/1/0%	Casi seguro
%Pérdida- COD-D (s)	-5,01	-5,88	0,12 $\pm$ 0,72	43/35/22%	Posible
%Pérdida- COD-I (s)	-5,26	-6,25	0,05 $\pm$ 0,59	33/44/23%	Posible
VMP15	10,89	6,01	0,31 $\pm$ 0,99	58/23/19%	Posible
VMP30	7,29	5,62	0,14 $\pm$ 0,73	45/35/20%	Posible
VMP40	9,09	2,35	0,37 $\pm$ 0,77	65/24/11%	Posible
VMP50	4,76	3,90	0,03 $\pm$ 0,51	28/50/22%	Posible
VMP60	2,53	1,37	0,15 $\pm$ 0,45	42/48/10%	Posible

Nota: CL, intervalos de confianza; TE, tamaño del efecto; VC, evaluación cualitativa; VMP, velocidad media propulsiva; CMJ, salto con contramovimiento; COD-D, cambio de dirección hacia la derecha; COD-I, cambio de dirección hacia la izquierda; %GV, diferencias pre-post test en GV; %GH, diferencias pre-post test en GH  
\*Diferencias sustanciales (>75%) entre los dos grupos experimentales con mayores mejoras en ese grupo  
Probabilidad: Porcentaje de posibilidad de tener mejores/similares/peores valores

## Discusión

El objetivo de este estudio fue analizar el efecto de dos programas de entrenamiento neuromuscular, con una mayor orientación vertical u horizontal, en una muestra de jugadores de fútbol de élite junior. Los resultados obtenidos muestran que, tras el periodo de intervención, los jugadores del GV incrementaron su capacidad de salto vertical, medida a través de los test CMJ y ABK, y la VMP estimada mediante el test de ½ sentadilla, mientras que empeoraron sus resultados en el tiempo de sprint lineal y COD-I. Sin embargo, los jugadores del GH mejoraron sustancialmente su tiempo en sprint en 10m, COD-I, COD-D así como la VMP con 15-30-50kg.

El CMJ ha ganado importancia en los últimos años por ser un test relevante en el rendimiento en fútbol y útil tanto en la selección de talentos, como para discriminar el nivel competitivo de los futbolistas (Comfort, Stewart, Bloom y Clarkson, 2014), siendo también considerado como uno de los test más fiable para la detección de la fatiga en futbolistas (Gathercole, Sporer, Stellingwerff, y Sleivert, 2015). Los resultados del presente estudio mostraron como el GV presentó mejoras sustanciales en el CMJ (5,66%, TE = 0,49). Este resultado parece coincidir con la mayoría de los estudios publicados previamente en los que se examina esta capacidad utilizando programas de entrenamiento similares (Chelly, Ghenem, Abid, Hermassi, Tabka, y Shephard, 2010; De Hoyo, Pozzo, Sañudo, Carrasco, Gonzalo-Skok, Domínguez-Cobo, y Morán-Camacho, 2015; Ramírez-Campillo y col., 2015). Sin embargo, también hay que tener en cuenta otra investigación similar aunque con resultados contradictorios (Los Arcos y col., 2014). Estas diferencias entre estudios podrían deberse a la edad de los participantes (jóvenes vs sénior), debido a que el potencial de entrenabilidad de los participantes jóvenes parece influir de manera positiva sobre las mejoras en el

rendimiento (Michailidis, Fatouros, Primpa, Michailidis, Avloniti, Chatzinikolaou, Barbero-Álvarez, Tsoukas, Douroudos, Draganidis, Leontsini, Margonis, Berberidou, y Kambas, 2013).

Otro test de salto para valorar la fuerza explosiva del tren inferior es el test ABK, para el que se encontraron también cambios sustanciales (4,24%, TE = 0,38) en GV tras el proceso de entrenamiento. Al igual que en nuestro estudio, Wong y col. (2010) encontraron mejoras sustanciales (3,3%, TE = 0,39) en ABK en jugadores de fútbol junior de élite durante la pretemporada tras un proceso de entrenamiento de fuerza de 12 semanas de duración que incluía una fase de entrenamiento de fuerza compuesta por ejercicios tradicionales y una fase de entrenamiento de potencia en la que se incluyeron ejercicios olímpicos. En el GH no se encontraron mejoras sustanciales respecto a la capacidad de salto vertical, resultados que coinciden con los obtenidos por Campos-Vázquez, Romero, Toscano-Bendala, León-Prados, Suárez-Arrones y González-Jurado (2015) tras la aplicación de un programa de entrenamiento neuromuscular similar. Por lo tanto, en la comparación inter-grupos el GV obtuvo sustancialmente mejores resultados que el GH en CMJ (TE = 0,39). El hecho de que en el programa de entrenamiento propuesto para el GV se hayan incluido ejercicios cuyo patrón de movimiento es similar al que se lleva a cabo en el CMJ, parece ser que ha influido positivamente en los resultados obtenidos por los componentes del GV en este test (De Hoyos y col., 2015).

Diversos estudios presentes en la literatura científica con programas de entrenamiento basados en la aplicación de fuerza vertical presentaron mejoras en el tiempo de sprint (Chelly y col., 2009; Sander y col., 2013). Por el contrario y en base a nuestros resultados, el GV empeoró sustancialmente sus resultados en el tiempo de sprint lineal y con COD-I. Se conoce que el rendimiento en sprint es el producto de la velocidad de zancada y la longitud de zancada, además de numerosos componentes que influyen en esta fórmula aparentemente simple. Debido a que ambos elementos están claramente influenciados por las características antropométricas (Ross, Leveritt, y Riek, 2001), una de las principales explicaciones para la pérdida del rendimiento en el tiempo en sprint observado en el GV podría ser los cambios antropométricos observados en los sujetos que componían el GV durante el proceso de entrenamiento. De hecho, tras el post-test el GV aumentó sustancialmente (1,27%, TE = 0,14) su masa corporal y su índice de masa corporal (1,28%, TE = 0,14) con respecto al pre-test. Por otra parte, tradicionalmente se cree que el rendimiento en las pruebas de sprint dependen en gran medida de factores genéticos, obteniéndose solamente mejoras relativamente pequeñas gracias al efecto del entrenamiento (Ross y col., 2001). Además, para conseguir mayores mejoras en el tiempo de sprint se debe buscar la especificidad en el programa de entrenamiento (Sáez de Villarreal, Suarez-Arrones, Requena, Haff, y Ramos-Veliz, 2014). Es por esto que el GH sí que presentó, tras el proceso de entrenamiento, mejoras sustanciales en el tiempo de sprint lineal en 10m (-2,64% ES = 0,63) así como en el COD [Derecha (-1,37% TE = 0,36) Izquierda (-1,36% TE = 0,34)], además de posibles mejoras en el tiempo de sprint en 20 y 30m. Estos resultados parecen coincidir con los obtenidos en el trabajo de Clark, Stearne, Walts, y Miller. (2010) en el que tras aplicar un programa de entrenamiento de 7 semanas de duración en el que se llevaron a cabo 13 sesiones de sprints resistidos con chaleco lastrado, obtuvieron mejoras significativas en el tiempo en sprint en el intervalo de distancia de 18,3 a 54,9 m (-1,20% TE = 0,25). También existen investigaciones con resultados diferentes, especialmente en distancias más largas

(Bachero-Mena y González-Badillo, 2014; Iaia, Fiorenza, Perri, Alberti, Millet, y Bangsbo, 2015; Luteberget, Raastad, Seynnes, y Spencer, 2015), diferencias que podrían deberse al dispositivo utilizado, ya que en estos estudios se utilizó un trineo y en nuestro estudio utilizamos un chaleco lastrado como medio para aplicar la resistencia al sprint. Debido a que el GV no presentó mejoras en el tiempo de sprint lineal y COD el GH obtuvo, en el análisis inter-grupos, mejoras sustanciales mayores en el tiempo de sprint en 10m (TE = 0,68), 20m (TE = 0,72) y 30m (TE = 0,57) así como en el COD-D (TE = 0,73). Estas diferencias inter-grupos parecen estar influenciadas por el aumento sustancial de la masa corporal de los jugadores que formaron parte del GV durante el proceso de intervención (Ross y col., 2001).

En relación con la potencia del tren inferior, nuestros resultados reflejaron mejoras sustanciales en la VMP en el ejercicio de  $\frac{1}{2}$  sentadilla en ambos grupos. En el GV se obtuvieron mejoras sustanciales respecto al pre-test en todas las cargas utilizadas, un hecho que se podría esperar debido al elevado volumen de ejercicios con orientación vertical y con sobrecarga excéntrica incluidos en la rutina semanal de entrenamiento para este grupo. Estos ejercicios de fuerza con sobrecarga excéntrica se caracterizan por una ejecución más fuerte y rápida del ciclo estiramiento-acortamiento, lo que produce mejoras en la potencia y la fuerza máxima (Sáez de Villareal y col., 2014). Por otro lado, el GH mejoró sustancialmente en el test de media sentadilla en las cargas de 15-30-50kg (Tabla 3), a pesar de que no se incluyeron ejercicios de orientación vertical en su rutina de entrenamiento. Estos resultados no fueron esperados, y podrían demostrar que es posible mejorar la VMP en el ejercicio de  $\frac{1}{2}$  sentadilla a través de otros ejercicios, aspecto que se fundamenta con los resultados similares encontrados en el trabajo de Campos-Vázquez y col. (2015), y que permite descartar que estas mejoras fueran producidas por el efecto del aprendizaje. A pesar de que el porcentaje de mejora para cada carga utilizada en el test de media sentadilla fue mayor en el GV el análisis inter-grupos no mostró diferencias sustanciales para esta variable en ninguna de las cargas analizadas.

## Conclusiones

La realización de un entrenamiento neuromuscular con mayor orientación vertical (sobrecarga excéntrica y pliometría) produce mejoras en la potencia muscular del tren inferior y en la capacidad de salto, así como una reducción del rendimiento en el tiempo de sprint en 10-20-30m y COD-I; mientras que un entrenamiento neuromuscular con mayor orientación horizontal utilizando un chaleco lastrado mejora el tiempo de sprint lineal y COD y en la VMP en futbolistas jóvenes de élite. Además, el análisis inter-grupos demuestra que los efectos producidos por el programa de entrenamiento del GH son superiores al GV en el tiempo de sprint lineal en 10-20-30m y COD-I. Por el contrario, el GV solamente obtuvo mejores resultados respecto al GH en CMJ. A pesar de esto, debemos tener en cuenta que en este estudio se ha utilizado una muestra relativamente pequeña, debido a que los equipos de fútbol de cantera estaban compuestos solamente por 18 jugadores de campo. En vista de los resultados obtenidos, se recomienda para futuras investigaciones realizadas con jugadores jóvenes de fútbol llevar a cabo un control del estado antropométrico de los jugadores en intervalos cortos de tiempo.

Según los resultados obtenidos en el presente estudio, el programa de entrenamiento del GH parece ser más efectivo para la optimización del rendimiento físico en jugadores de fútbol jóvenes de alto nivel. Sin embargo, es imprescindible conocer los efectos y limitaciones de cada programa de entrenamiento para así poder elegir el más adecuado a las necesidades de cada deportista con el fin de optimizar su rendimiento físico-deportivo.

## Referencias

- Bachero-Mena, B., & González-Badillo, J.J. (2014). Effects of resisted sprint training on acceleration with three different loads accounting for 5, 12.5, and 20% of body mass. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28, 2954-2960.  
<https://doi.org/10.1519/JSC>
- Buchheit, M.; Mendez-Villanueva, A.; Delhomel, G.; Brughelli, M., & Ahmaidi, S. (2010). Improving repeated sprint ability in young elite soccer players: repeated shuttle sprint vs explosive strength training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24, 2715-2722.  
<https://doi.org/10.1519/JSC>
- Bush, M.; Barnes, C.; Archer, D.T.; Hogg, B., & Bradley, P.S. (2015). Evolution of match performance parameters for various playing positions in the English Premier League. *Human Movement Science*, 39, 1-11.  
<https://doi.org/10.1016/j.humov.2014.10.003>
- Campos-Vazquez, M.A.; Romero-Boza, S.; Toscano-Bendala, F.J.; Leon-Prados, J.A.; Suarez-Arrones, L.J., & Gonzalez-Jurado, J.A. (2015). Comparison of the effect of repeated-sprint training combined with two different methods of strength training on young soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(3), 744-751.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000700>
- Castagna, C.; D'Ottavio, S., & Abt, G. (2003). Activity profile of young soccer players during actual match play. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 17, 775-780.
- Chelly, M.S.; Fathloun, M.; Cherif, N.; Ben Amar, M.; Tabka, Z., & Van Praagh, E. (2009). Effects of a back squat training program on leg power, jump, and sprint performances in junior soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(8), 2241-2249.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b86c40>
- Chelly, M.S.; Ghenem, M.A.; Abid, K.; Hermassi, S.; Tabka, Z., & Shephard, R.J. (2010). Effects of in-season short-term plyometric training program on leg power, jump and sprint performance of soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24(10), 2670-2676.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181e2728f>
- Clark, K.P.; Stearne, D.J.; Walts, C.T., & Miller, A.D. (2010). The longitudinal effects of resisted sprint training using weighted sleds vs. weighted vests. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24, 3287-3295.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b62c0a>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.)*. Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.

- Comfort, P.; Stewart, A.; Bloom, L., & Clarkson, B. Relationships between strength, sprint, and jump performance in well-trained youth soccer players. (2014). *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28, 173-177.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318291b8c7>
- Cronin, J. B., & Hansen, K. T. (2005). Strength and power predictors of sports speed. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 19(2), 349–357.
- De Hoyo, M.; Pozzo, M.; Sañudo, B.; Carrasco, L.; Gonzalo-Skok, O.; Domínguez-Cobo, S., & Morán-Camacho, E. (2015). Effects of a 10-week in-season eccentric-overload training program on muscle-injury prevention and performance in junior elite soccer players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 10(1), 46-52.  
<https://doi.org/10.1123/ijssp.2013-0547>
- Di Salvo, V.; Baron, R.; Tschann, H.; Calderon-Montero, F. J.; Bachl, N., & Pigozzi, F. (2007). Performance characteristics according to playing position in elite soccer. *International Journal of Sports Medicine*, 28(3), 222-227.
- Gorostiaga, E.; Izquierdo, M.; Ruesta, M.; Iribarren, J.; González-Badillo, J.J., & Ibáñez, J. (2004). Strength training effects on physical performance and serum hormones in young soccer players. *European Journal of Applied Physiology*, 91, 698–707.
- Gathercole, R.J.; Sporer, B.C.; Stellingwerff, T., & Sleivert, G.G. (2015). Comparison of the Capacity of Different Jump and Sprint Field Tests to Detect Neuromuscular Fatigue. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29, 2522-2531.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000912>
- Hader, K.; Palazzi, D., & Buchheit, M. (2015). Change of direction speed in soccer: How much braking is enough? *Kinesiology*, 47(1), 67-47.
- Hoff, J., & Helgerud, J. (2004). Endurance and strength training for soccer players: physiological considerations. *Sports Medicine*, 34, 165-180.
- Hopkins, W.G.; Marshall, S.W.; Batterham, A.M., & Hanin, J. (2009). Progressive statistics for studies in sports medicine and exercise science. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41, 3–13.  
<https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31818cb278>
- Iaia, F.M.; Fiorenza, M.; Perri, E.; Alberti, G.; Millet, G.P., & Bangsbo, J. (2015). The Effect of Two Speed Endurance Training Regimes on Performance of Soccer Players. *PLoS One*, 10,(9)e0138096.  
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0138096>
- López-Segovia, M.; Palao, J.M., & González-Badillo, J.J. (2010). Effect of 4 months of training on aerobic power, strength, and acceleration in two under-19 soccer teams. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 19 (10), 2705-2714.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181cc237d>
- Los Arcos, A.; Yanci, J.; Mendiguchia, J.; Salinero, J.J.; Brughelli, M., & Castagna, C. (2014). Short-term training effects of vertically and horizontally oriented exercises on neuromuscular performance in professional soccer players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 9(3), 480-488.  
<https://doi.org/10.1123/ijssp.2013-0063>

- Luteberget, L.S.; Raastad, T.; Seynnes, O., & Spencer, M. (2015). Effect of traditional and resisted sprint training in highly trained female team handball players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 10, 642-647.  
<https://doi.org/10.1123/ijsp.2014-0276>
- Marques, M.C.; Pereira, A.; Reis, I.G., & van den Tillaar, R. (2013). Does an in-Season 6-Week Combined Sprint and Jump Training Program Improve Strength-Speed Abilities and Kicking Performance in Young Soccer Players? *Journal of Human Kinetics*, 31(39), 157-166.  
<https://doi.org/10.2478/hukin-2013-0078>
- Maulder, P., & Cronin, J. (2005). Horizontal and vertical jump assessment: Reliability, symmetry, discriminative and predictive ability. *Physical Therapy in Sport*, 6, 74-82.
- Meylan, C., & Malatesta, D. (2009). Effects of in-season plyometric training within soccer practice on explosive actions of young players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(9), 2605-2613.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181b1f330>
- Michailidis, Y.; Fatouros, I.G.; Primpa, E.; Michailidis, C.; Avloniti, A.; Chatzinikolaou, A.; Barbero-Álvarez, J.C.; Tsoukas, D.; Douroudos, I.I.; Draganidis, D.; Leontsini, D.; Margonis, K.; Berberidou, F., & Kambas, A. (2013). Plyometrics' trainability in pre-adolescent soccer athletes. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(1), 38-49.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3182541ec6>
- Ramírez-Campillo, R.; Gallardo, F.; Henriquez-Olguín, C.; Meylan, C.M.; Martínez, C.; Álvarez, C.; Caniuqueo, A.; Cadore, E.L., & Izquierdo, M. (2015). Effect of Vertical, Horizontal, and Combined Plyometric Training on Explosive, Balance, and Endurance Performance of Young Soccer Players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(7), 1784-1795.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000827>
- Reilly, T.; Bangsbo, J., & Franks, A. (2000). Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. *Journal of Sports Sciences*, 18, 669-683.
- Rønnestad, B.R.; Kvamme, N.H.; Sundé, A., & Raastad, T. (2008). Short-term effects of strength and plyometric training on sprint and jump performance in professional soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 22(3), 773-780.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31816a5e86>
- Ross, A.; Leveritt, M., & Riek, S. (2001). Neural influences on sprint running. Training adaptations and acute responses. *Sports Medicine*, 31, 409-425.
- Sáez de Villarreal, E.; Suarez-Arrones, L.; Requena, B.; Haff, G.G., & Ramos-Veliz, R. (2014). Effects of dry-land vs. in-water specific strength training on professional male water polo players' performance. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 28, 3179-3188.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000514>
- Sáez de Villarreal, E.; Suarez-Arrones, L.; Requena, B.; Haff, G.G., & Ferrete, C. (2015). Effects of Plyometric and Sprint Training on Physical and Technical Skill Performance in Adolescent Soccer Players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 29(7), 1894-1903.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000838>

Raya-González, J.; Suárez-Arrones, L.; Moreno-Puentedura, M.; Ruiz-Márquez, J., y Sáez de Villareal, E. (2017). Efectos en el rendimiento físico a corto plazo de dos programas de entrenamiento neuromuscular con diferente orientación aplicados en jugadores de fútbol de élite U-17. *RICYDE. Revista internacional de ciencias del deporte*, 48(13), 88-103.  
<https://doi.org/10.5232/ricyde2017.04801>

---

Sánchez-Sánchez, J.; Hernández, C.; Marcos, V.; González, A., & Carretero, M. (2016). Efecto de un entrenamiento intermitente con y sin cambios de dirección, sobre el rendimiento físico de jóvenes futbolistas. *RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 30, 70-75.

Sander, A.; Keiner, M.; Wirth, K., & Schmidbleicher, D. (2013). Influence of a 2-year strength training programme on power performance in elite youth soccer players. *European Journal of Sport Sciences*, 13(5), 445-451.  
<https://doi.org/10.1080/17461391.2012.742572>

Suarez-Arrones, L.; Tous-Fajardo, J.; Núñez, J.; Gonzalo-Skok, O.; Gálvez, J., & Méndez-Villanueva, A. (2014). Concurrent repeated-sprint and resistance training with superimposed vibrations in rugby players. *International Journal of Sports Physiology and Performance*, 9(4), 667-673.  
<https://doi.org/10.1123/ijspp.2013-0238>

Thomas, K.; French, D., & Hayes, P.R. (2009). The effect of two plyometric training techniques on muscular power and agility in youth soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 23(1), 332-335.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e318183a01a>

Wong, P.L.; Chamari, K., & Wisløff, U. (2010). Effects of 12-week on-field combined strength and power training on physical performance among U-14 young soccer players. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 24, 644-652.  
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181ad3349>