

---

PAGINA PARA LOS GANADEROS

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS  
ENFERMEDADES DE LAS AVES  
DE CORRAL

Es de mucha utilidad para todo avicultor tener conocimientos fundamentales sobre las enfermedades más comunes en las gallinas, así como también sobre los tratamientos que deben emplearse para combatir esas enfermedades.

De la "Revista de Agricultura" de Puerto Rico extractamos los siguientes datos sobre el particular:

*Abscesos de las patas:*

Causas: Tumores febriles y muy dolorosos en la planta del pie, causados por humedad, perchas demasiado altas o terrenos demasiado duros y pedregosos.

Tratamiento: Aplicar antiflogistina. Si el tumor se forma a pesar de ello, abrirlo y lavarlo interiormente con solución desinfectante. Creolina al dos por ciento.

*Bronquitis:*

Causas: Enfriamientos, cambios bruscos de temperatura, gallineros húmedos. En una palabra: malos gallineros.

Tratamiento: Colocar al ave en sitio seco. Alimentación cocida y caliente. Aplicar tintura de yodo en la pechuga, cuidando que el yodo quede entre la piel y no quede entre las plumas.

### *Catarros:*

Causas: Corrientes de aire y enfriamientos bruscos que predisponen al ave. En otras palabras: gallineros o dormitorios malos y húmedos.

Tratamiento: Lavados con agua fenicada al 1 por 1,000. Encerrar al ave en sitio abrigado y seco.

### *Cólera:*

Causas: Enfermedad contagiosa de origen microbiano. Aparece debido a la falta de higiene (acumulación de deyecciones, etc.), o por contagio al través de la comida, agua sucia, etc.

Tratamiento: Actualmente no se conoce un remedio realmente eficaz, y puede considerarse como incurable esta enfermedad, ocasionando graves mortandades. Si se notaran pocos animales atacados de esta enfermedad, lo mejor es sacrificarlos y quemarlos; en caso contrario, aislamiento riguroso de las aves enfermas, suministrándoles dos gramos de ácido sulfúrico por litro de agua. Enérgica desinfección de todo el gallinero, puntear o dar vuelta a la tierra del mismo. Para aves valiosas, aplicar suero anti-colérico en inyecciones bajo la piel debajo del ala.

### *Moquillo infeccioso:*

Causas: Enfermedad infecciosa.

Tratamiento: Deben hacerse inmediatamente, si no es mortal, lavados de creolina al uno por ciento, o de permanganato de potasa, al uno por mil. Aislamiento de los animales enfermos. Desinfección del gallinero.

### *Curso amarillo:*

Causa: De carácter contagioso.

Tratamiento: Aislar al ave enferma. Se obtienen buenos resultados mezclándose en un kilo de arroz cocido 15 gramos de benzonaftol, 10 de salicilato de bismuto y 20 de quina. Suficiente para 20 gallinas.

### *Diarrea:*

Causas: Alimentos demasiado acuosos o malos. También de carácter microbiano.

Tratamiento: Administrar un purgante de un centígramo de calomel. Luégo dar alimentación seca. Para contener la diarrea pueden darse 10 centigramos de salicilato de bismuto en dos veces.

*Diarrea de los pollitos:*

Causas: Indigestiones por exceso de alimentación en los primeros días de vida.

Tratamiento: Alimentarlos con carne cruda y pan mojado. También con arroz. Puede darse bismuto al centígramo. Limpiar el exterior de la cloaca con solución de creolina al uno por ciento.

*Difteria:*

Causas: Contagiosa. Falta de higiene, agua sucia, etc.

Tratamiento: Lavados con creolina al uno por ciento. Raspar con un bisturí las placas, y toques con tintura de yodo con glicerina.

*Embuchado:*

Causas: Acumulación de alimentos en el buche.

Tratamiento: Si es reciente, se administra una cucharada de aceite de comer, y se sacan por la boca los alimentos que se han almacenado. Agua de bebida con bicarbonato de soda. En casos muy avanzados lo más conveniente es abrir el buche con un bisturí, retirar los alimentos, lavar con agua hervida y dar dos puntadas de sutura. Mantener el animal a dieta.

*Estomatitis:*

Causa: Al parecer contagiosa.

Tratamiento: Lavados bucales con vinagre diluido. Suministrar alimentos pastosos (harinas mojadas con agua o leche).

*Lombrices:*

Causas: Se alojan en la tráquea e intestino. Los primeros están representados por los causantes de la bronquitis verminosa de los pollitos. Trátase de un pequeño gusano colorado, de un centímetro de longitud, que se aloja en la tráquea para chupar la sangre, llegando por su número a dificultar la respiración. La infección se produce de año en año, por los gérmenes que quedan en el terreno.

Tratamiento: Aplicar una buena lechada de cal en el terreno y ararlo. No criar los pollos en el mismo terreno. Pueden extraerse los gusanos de la tráquea con un lazo hecho con una cuerda. Para las lombrices en los intestinos dése a cada enfermo 15 gotas de helecho macho.

*Lombrices intestinales:*

Causas: Se contagian los pollos al través de los huevos que expelen esos parásitos. En realidad, se debe a falta de higiene.

Tratamiento: Media cucharadita de aceite de trementina, combinada con una de aceite de oliva, por la mañana, en ayunas, y tres horas después otra de aceite de castor, para cada ave.

*Gotas:*

Causas: La humedad del gallinero.

Tratamiento: Fricciones con alcohol alcanforado, o bien tintura de yodo. Llevar el animal a un sitio seco y, mejor, sanear el gallinero.

*Piojos:*

Tratamiento: Baño tibio en un tanque con solución: 10 litros de agua y 60 gramos de fluoruro de sodio. Esto alcanza para muchas aves y es lo más eficaz. Pueden emplearse insecticidas preparados en esta forma: tres partes de nafta y una parte de creolina. Lavar los gallineros con creolina y luego quemarla.

*Sarna:*

Causas: Pequeño animal que vive entre la piel. Se propaga fácilmente cuando falta la higiene.

Tratamiento: Aislar los animales enfermos. Desinfección del gallinero. En la piel, baños tibios con creolina, al tres por ciento. En las patas, baños o lavados con solución de creolina, cepillo y jabón para ablandar las costras y luego aplicar pomada creosotada o de Elmerich, hecha así: azufre sublimado 10 partes, carbonato de potasa 10 partes, y manteca de cerdo 60 partes.

*Viruela:*

Causas: Contagiosa de origen microbiano.

Tratamiento: Desinfección general. Aislamiento de las aves enfermas. Administrarles un purgante de un centigramo de calomel. Dieta. Lavados con solución tibia de ácido bórico (una cucharada en un litro de agua) o ablandar los tumorsitos con glicerina fenicada, luego arrancarlos y untar el sitio con tintura de yodo o con partes iguales de tintura de yodo y ácido fénico.