

---

PAGINA PARA LOS GANADEROS

COLICOS (torzón)

*Primeros tratamientos*

Aunque el cólico empiece con síntomas no bien marcados, o poco fuertes, debe considerarse como cosa grave y, por consiguiente, el veterinario debe ser avisado sin demora, para evitar el peligro de que llegue demasiado tarde.

Mientras llega el veterinario, se aplicarán al animal los siguientes tratamientos de urgencia:

Impedir, ante todo, por todos los medios posibles, que el animal se acueste, pues casi siempre los caballos enfermos de cólico se acuestan de manera violenta, lo cual puede producir la ruptura del estómago o de los intestinos. Cuando el animal se halla acostado, es conveniente no dejar que éste se revuelque sobre sí mismo, para evitar torsiones y desplazamientos del intestino, circunstancias que pueden determinar en la mayoría de los casos la muerte del animal. Para evitar que el animal se acueste se hará caminar despacio, sin dejarlo trotar ni galopar; pues mientras el movimiento moderado aumenta el movimiento de los intestinos y facilita las evacuaciones, el ejercicio violento puede ocasionar graves consecuencias.

En espera del veterinario, es conveniente aplicar lavados de agua jabonosa empleando para esto bombas con su correspondiente tubo de caucho y de bastante potencia, con el fin de hacer subir el agua lo más

que sea posible. Cuando falta la bomba se puede improvisar un aparato para tal fin, por medio de un largo tubo de caucho sumergido en el recipiente del agua jabonosa, colocando éste a una altura suficiente para que el agua tenga la fuerza suficiente para penetrar en el intestino; puede dejarse penetrar de quince a veinte litros de agua. Antes de practicar el lavado se debe hacer la exploración rectal, con el fin de sacar la mayor cantidad de heces fecales y facilitar así el lavado.

Internamente sirven la suministración de calmantes como de excitantes. Como calmante se puede suministrar en un litro de infusión de manzanilla ocho a diez gramos de láudano (treinta gotas de láudano equivalen a un gramo). Como excitantes sirve el café tinto (cien gramos de café en un litro de agua), cien a doscientos gramos de alcohol etílico en un litro de infusión aromática, veinticinco a treinta gramos de eter sulfúrico en un litro de agua.

Además es muy útil hacer externamente fricciones sobre todo el cuerpo del animal con paja o con bayetas, humedecidos con alcohol alcanforado, mezclado con esencia de trementina, o a falta de todo esto se pueden hacer las fricciones con vinagre caliente.