

GALERÍA DE IMÁGENES

Síndrome del seno del tarso

Álvarez de Cienfuegos Rodríguez A, Tevar Sanchez M
 Servicio de Reumatología. Hospital Vega Baja. Orihuela (Alicante)
 Correspondencia: Dr. Antonio Álvarez de Cienfuegos Rodríguez - Servicio de Reumatología - Hospital Vega Baja - Almoradi, s/n - 03314 San Bartolomé - Orihuela (Alicante)
 ✉ antonioalvarezdc@gmail.com

Se presentan las imágenes de paciente con síndrome del seno del tarso y os trigonum.



Imagen 1 y 2. RMN de tobillo derecho (T1 y STIR). Se aprecia alteración de señal en la mitad anterior del calcáneo y región yuxtaarticular calcáneo-astragalina en relación con edema intraóseo, asociando edema de las partes blandas adyacentes, con obliteración de la grasa del seno del tarso que muestra hiposeñal en T1 e hiperseñal en STIR y mala delimitación de los ligamentos interóseo y cervical, hallazgos compatibles por RM de síndrome del seno del tarso. Os trigonum. Espolón calcáneo.



Imagen 3. Radiografía lateral de tobillo derecho. Os trigonum. Espolón calcáneo.