

A PROPÓSITO DE HTLV I

ABOUT HTLV I

Tomas Zamora Bastidas MD*

Estimado Editor,

Debieron transcurrir dos décadas para encontrar en la Facultad de Ciencias de la Salud, de nuestra Universidad del Cauca, un artículo concerniente a una enfermedad neurológica relacionada actualmente con un tipo de retrovirus que se identifica como HTLV I.

La primera descripción de ésta enfermedad se hizo en la Universidad del Valle por Wladimir Zaninovic, quien recibía pacientes remitidos del puerto de Tumaco en Nariño. Pocos meses después de las primeras descripciones, la Paraparesia Espástica del Pacífico o también Tropical, fue diagnosticada en la Universidad del Cauca, en pacientes habitantes del Municipio de Páez, población netamente indígena y situada en una zona geográfica totalmente alejada de la zona costera del Pacífico.

Qué alegría me produjo encontrar un artículo en nuestra revista (1) relacionado con pacientes que presentan el cuadro dramático de incapacidad para el movimiento de extremidades inferiores, con reflejos de estiramiento muscular exaltados y valorados en tres y cuatro cruces, sin alteraciones de sensibilidad y con un severo compromiso de la vejiga. Los pacientes descritos en el artículo son habitantes de la población de Sahonda, municipio nariñense de Francisco Pizarro, cercano a Tumaco; esto significa que corresponden a la zona geográfica donde se informaron los primeros casos en Colombia y posiblemente en Suramérica.

La confirmación del diagnóstico se ha hecho no solamente con la historia clínica sino con la determinación de anticuerpos HTLV I – II.

El estado actual de la prevalencia de HTLV I, ha disminuido gracias a las medidas que se recomendaron en relación al control de las transfusiones de sangre, la determinación de HTLV I de todo donante en los bancos de sangre y las recomendaciones similares a las practicadas con el virus del SIDA y de la Hepatitis. Respecto al tratamiento, aun no existen recursos farmacológicos que ayuden al paciente con este tipo de retrovirus. Los pacientes que sobreviven presentan un estado de espasticidad totalmente invalidante, estado de ánimo deprimido y cambios en la esfera mental.

Tal como lo menciona Alonso Ruiz en su artículo, es importante estar alerta en los servicios de Salud Pública en los departamentos en donde se han descrito casos de paraparesia espástica o mielopatía HTLV I; este tipo de infecciones pueden producir por épocas verdaderos brotes epidémicos.

REFERENCIAS

1. Ruiz A, Ramírez LE. Paraparesia espástica tropical / mielopatía asociada a HTLV (PET/MAH). Reporte de casos en el pacífico colombiano. Revista de la Facultad Ciencias de la Salud, Universidad del Cauca. 2013; 15 (3).

* Universidad del Cauca, Profesor titular, Departamento de Medicina Interna, Facultad de Ciencias de la Salud.