

Frecuencia y características de la circuncisión masculina no terapéutica en niños inmigrantes africanos

R.M.^a Macipe Costa⁽¹⁾, L.A. Gimeno Feliu⁽²⁾, J.M. Jiménez Hereza⁽³⁾, B. Navarra Vicente⁽¹⁾, N. García Sánchez⁽¹⁾

⁽¹⁾Pediatra Atención Primaria. ⁽²⁾Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. ⁽³⁾Diplomado Superior en Metodología de Investigación Clínica

[Bol Pediatr Arag Rioj Sor, 2011; 41: 87]

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en España ha habido un gran aumento de la población procedente de países en los que se realiza la circuncisión por motivos no terapéuticos. Esta población no tiene muy claro qué cauce utilizar en nuestro país para la realización de la misma, lo cual puede favorecer la utilización de cauces no seguros.

El objetivo del presente estudio es conocer la frecuencia, características y complicaciones esta práctica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio descriptivo prospectivo, realizado en consultas de Atención Primaria de centros de salud de Aragón, durante los años 2010 y 2011. Los datos se obtuvieron de cuestionarios dirigidos a progenitores de niños procedentes de África. Se estudiaron variables sociodemográficas y otras relacionadas con la práctica de la circuncisión. Se calculó un tamaño muestral para que la muestra fuera representativa de 233 encuestas.

RESULTADOS

Se obtuvieron 283 cuestionarios remitidos por 27 pediatras de 21 centros de salud de Aragón. Hubo niños de

15 procedencias. De las familias encuestadas el 98,93% habían realizado la circuncisión a sus niños o la iban a realizar.

Cuando la circuncisión se realiza con posterioridad a la migración, lo más frecuente, 108 niños (67,08%), es realizarla en el país de origen en unas vacaciones, siendo este el cauce elegido mayoritariamente por la población procedente de países árabes.

El 92,4% de los que la realizaron en España procedían de África subsahariana. La mitad de estas se realizaron en domicilios, el 84% a niños gambianos.

Se han detectado pocas complicaciones a corto plazo independientemente del cauce utilizado.

CONCLUSIONES

Prácticamente la totalidad de los niños inmigrantes procedentes de África serán circuncidados.

Existe un colectivo en riesgo de optar por una circuncisión insegura, como es la población gambiana, que circuncida a sus hijos en el país de acogida fuera del sistema sanitario.

Los resultados obtenidos ponen en evidencia la necesidad de buscar cauces seguros para la realización de la circuncisión a niños inmigrantes procedentes de África.