

PRIMERA CITA DE *VIPERA LATASTEI* BOSCÁ, 1878 EN LA RIOJA

C. Zaldívar
A. Gosá
A. Bergerandi

En la generalidad de las obras consultadas se admite que el área de distribución de *Vipera latastei* se extiende por el norte de África y la casi totalidad de la península Ibérica —incluida La Rioja— a excepción de una franja húmeda que comprende Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Pirineos.

Sin embargo, ninguno de los autores considerados, así como VERDU et al. (1986), ZALDÍVAR et al. (1988 y 1989) en las sucesivas contribuciones al *Atlas Herpetológico de la C. A. de La Rioja*, ofrecen citas de *V. latastei* en esta región. Sólo las publicadas por FALCON (1982), FALCON y CLAVEL (1987) de la Sierra del Moncayo, ARRIBAS (1983) de Soria, BARBADILLO (1983) de la provincia de Burgos y GOSA y BERGERANDI (en prensa) de Navarra, se aproximan a La Rioja.

Por otro lado, en las revisiones realizadas durante el mes de octubre de 1990 en las colecciones de la Estación Biológica de Doñana (Sevilla), Unidad de Zoología Aplicada (Alcalá de Henares) y Museo de Ciencias Naturales (Madrid), así como las efectuadas con anterioridad en el Centro Pirenaico de Ecología (Jaca), Universidad de Navarra (Pamplona) y Sociedad de Ciencias Aranzadi (San Sebastián), tampoco hemos encontrado ningún ejemplar de la especie recogido en La Rioja.

Por tanto, el hallazgo de un ejemplar de *V. latastei*, recogido el 21 de septiembre de 1990 en el término municipal de Muro de Aguas (Coordenadas 30TWM7365), confirma la presencia esperada de esta especie dentro de los límites del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El animal fue recolectado a 900 m.s.n.m. en una ladera de orientación suroeste. El sustrato es calizo, con suelo raquíutico, rocas aflorantes y piedras de pequeño y mediano tamaño.

La vegetación de la zona está compuesta por una pequeña mancha residual de *Quercus rotundifolia* y matorral mediterráneo de montaña (ARIZALETA et al., 1990) con escasa cobertura y predominio de caméfitos aromáticos como *Rosmarinus officinalis*, *Thymus zygis*, *Lavandula latifolia* y *Genista scorpius*.

Se trata de un individuo inmaduro de 19 cm. de longitud total de los que 2,8 pertenecen a la cola. Con la región fronto-parietal fragmentada en numerosas escamas de parecido tamaño sin llegar a diferenciar escama frontal, con 3 escamas apicales en su apéndice nasal y 132 escamas ventrales.

VARIA

Su diseño dorsal presenta un marcado contraste entre la oscura y bien definida banda en zig-zag y el marrón claro de fondo, mientras que su vientre es de color gris, excepto en la cola donde predominan los tonos amarillos.

Este hallazgo eleva hasta 30 (10 anfibios y 20 reptiles) el número de especies que componen el *Catálogo Herpetológico Provisional de la Comunidad Autónoma de La Rioja*.

AGRADECIMIENTOS

El animal en cuestión se encuentra depositado en la colección del Colegio Nacional de E.G.B. de Cortes (Navarra) a cuyos alumnos agradecemos el haberlo encontrado así como al profesor D. Martín Martín por facilitarnos su observación y examen.

BIBLIOGRAFÍA

- Arizaleta, J.A., Fernández, R., Lopo, L., 1990. Los matorrales de La Rioja. *Zubia*. (8), 83-127.
- Arribas, O., 1983. Nota preliminar de los Anfibios y Reptiles de la provincia de Soria en cartografía reticular U.T.M. *Butll. Soc. Cat. Ictio. y Herp.* (5), 8-12.
- Barbadillo, L.J., 1983. Sobre la distribución de los Anfibios y Reptiles en la provincia de Burgos. *Butll. Soc. Cat. Ictio. y Herp.* (5), 10-17.
- Falcón, J.M., 1982. *Los Anfibios y Reptiles de Aragón*. Librería General S.A., 1-110.
- Falcón, J.M., Clavel, F., 1987. Nuevas citas de anfibios y reptiles de Aragón. *Rev. Esp. Herpetología*. (2), 83-130.
- Gosá, A., Bergerandi, A., (en prensa). *Atlas de distribución de los Anfibios y Reptiles de Navarra*. Servicio de Medio Ambiente. Gobierno de Navarra.
- Verdú, J., Zaldívar, C., Fuente, M.E., Irastorza, M.T., 1986. Contribución al Atlas Herpetológico de La Rioja. *Zubia*. (4), 87-114.
- Zaldívar, C., Verdú, J., Irastorza, M.T., Fuente, M.E., 1998. Contribución al Atlas Provisional de Anfibios y Reptiles de la Comunidad Autónoma de La Rioja. *Rev. Esp. Herpetología*. (3-1), 41-53.
- Zaldívar, C., Verdú, J., Irastorza, M.T., 1989. Nuevas citas herpetológicas para la Comunidad Autónoma de La Rioja. *Zubia*. (7), 99-107.

ADDENDA

Con posterioridad a la entrega de esta pequeña aportación, hemos encontrado cinco nuevos ejemplares de *Vipera latastei* que relacionamos a continuación junto al municipio, UTM y altitud a la que fueron hallados:

VARIA

- Adulto: Cornago, 30TWM7162, 900 m.s.n.m.
- Joven: Préjano, 30TWM6968, 1.300 m.s.n.m.
- Adulto: Arnedillo, 30TWM6372, 1.099 m.s.n.m.
- Adulto: Munilla, 30TWM6170, 850 m.s.n.m.
- Adulto: Enciso, 30TWM6166, 800 m.s.n.m.

Los hallazgos se distribuyen por las cabeceras de los ríos Linares y Cidacos, sobre pedrizas y suelos raquíuticos de pendiente elevada que soportan matorrales mediterráneos de montaña y manchas relictas de carrascal.