

NOTA / NOTE

Polyommatus (Polyommatus) amandus (Schneider, 1792), 104 años después (Lepidoptera, Lycaenidae).

José Álvarez Gándara¹, Rafael Estévez Rodríguez² & Tito Salvadores Ramos³

¹ Barrio do Souto, 10 B. E-36740 San Salvador de Tebra, Tomiño (PONTEVEDRA). e-mail: lcgandara@yahoo.es

² Avda. Balaídos, 50, 1º Izq. E-36210 Vigo (PONTEVEDRA). e-mail: radoda@mundo-r.com

³ Avda. Alcalde Portanet, 23, 2ºB. E-36210 Vigo (PONTEVEDRA). e-mail: titusgb@yahoo.es

Resumen: Después de más de un siglo, se aportan nuevos registros fidedignos que confirman fehacientemente la presencia de *Polyommatus (Polyommatus) amandus* en Galicia. Se detectan tres colonias relictas con un escasísimo número de individuos en prados hiper-húmedos montanos ligeramente por encima de los 1.000 m s.n.m en las estribaciones del Macizo de Trevinca, dentro de los límites de la provincia de Ourense, NW de la Península Ibérica.

Palabras clave: Lepidoptera, Lycaenidae, *Polyommatus (Polyommatus) amandus*, Península Ibérica, faunística.

Abstract: *Polyommatus (Polyommatus) amandus* (Schneider, 1792), 104 years after (Lepidoptera, Lycaenidae). After more than a century, new reliable records that irrefutably prove the occurrence of *Polyommatus (Polyommatus) amandus* in Galicia are hereby reported. Three relict colonies with an extremely scarce number of individuals were detected in hyper-humid meadows slightly above 1.000 m above sea level in the foothills of Trevinca Massif, within the limits of Ourense province, NW of the Iberian Peninsula.

Key words: Lepidoptera, Lycaenidae, *Polyommatus (Polyommatus) amandus*, Iberian Peninsula, faunistics.

Recibido: 13 de octubre de 2011
Aceptado: 16 de octubre de 2011

Publicado on-line: 28 de octubre de 2011

Introducción

La primera mención de la existencia de *Polyommatus (Polyommatus) amandus* (Schneider, 1792) en Galicia se produce en Julio de 1906 como resultado de las prospecciones que realizaron los míticos entomólogos británicos Dr. Thomas Algernon Chapman y Mr. George Charles Champion en el Macizo de Trevinca ourensano (Chapman, 1906).

En el informe presentado por Chapman ese mismo año ante la Entomological Society londinense consignó, quizás por error, las coordenadas de 42° 16' N - 6° 44' W al material recolectado, coordenadas que realmente corresponden a una localización leonesa de esta misma sierra, concretamente a una zona cercana a las lagunas de La Baña (León).

Posteriormente esta misma sociedad publica con mayor detalle el informe presentado por Chapman el año anterior (Chapman & Champion, 1907). Curiosamente en este segundo trabajo (pág. 151) se repiten las mismas coordenadas, aunque en esta ocasión ya se menciona la localidad ourensana de Casaio como localidad para esta especie (pág. 161).

A partir de aquí se abre un amplio paréntesis de 104 años en el que no aparecen referencias sobre este taxón a excepción de algunas reseñas vagas que apuntamos a continuación:

En Fernández Vidal (1988) se presenta una tabla comparativa entre las especies encontradas por Chapman & Champion en 1906 y aquellas que el autor pudo corroborar por sí mismo entre el 13 y el 19 de julio de 1986. Hemos comprobado que en dicha tabla (pág. 149) el autor no pudo confirmar la presencia de la especie citada.

Posteriormente en Fernández Vidal (1991), se hace referencia a la citada especie (pág. 41) como rara en Galicia. Igualmente, en la página 111 de esta misma publicación se menciona la cita de Chapman y Champion, informando también de la existencia de una nueva colonia para el SE lucense, pero sin ofrecer más datos que una fotografía que, además, no pertenece al taxón estudiado, pues corresponde claramente a un macho del género *Plebejus* Kluk, 1780, posiblemente *P. argus* (Linnaeus, 1758) o *P. idas* (Linnaeus, 1761).

Por último, en Iglesias Garrote & Astor Camino (1992), los autores hacen referencia a esta especie de una forma superficial, sin aportar ningún estudio o criterio que demuestre su existencia en Galicia. Además, en la página 253 los autores incluyen fotos de tres especímenes cuya procedencia no es gallega, pues se tuvo acceso a su colección y, según el etiquetado, todo el material procedía del Pirineo.

Exposición

Hemos de admitir que el redescubrimiento de esta especie se produjo de forma fortuita puesto que las nuevas colonias encontradas se encuentran mucho más al sur de su cita original.

El primer hallazgo se produjo el día 11-VI-2011, cuando pudimos contabilizar la presencia de tres machos y una hembra en buen estado (Fig. 1). Por fortuna, pudimos comprobar como la hembra efectuaba su puesta sobre la leguminosa *Vicia cracca* (L.), planta muy escasa en nuestra Comunidad pero presente en algunas zonas de esta sierra.

Regresamos el 19-VI-2011 y en esta ocasión prospectamos una serie de prados de ribera a mayor altura, ubicados dentro de una cuadrícula UTM diferente, a una distancia de aproximadamente 6 km respecto a la primera localización. Allí pudimos observar y fotografiar tres machos en un pequeño bebedero, además de avistar una hembra y otros dos machos libando en otro prado colindante (Fig. 2), donde también constatamos la presencia de *Vicia cracca* (L.).

Hasta donde hemos podido estudiar en la bibliografía previa disponible, las citas que se aportan en este trabajo parecen constituir los primeros registros concretos de esta especie en nuestra comunidad desde 1907. Así pues, con los datos que hasta la fecha disponemos y ante la imposibilidad de regresar posteriormente a la zona con el objeto de ampliar en mayor medida nuestros hallazgos, la presencia en Galicia de *P. amandus* se limita provisionalmente a prados hiper-húmedos próximos a bosques riparios del Macizo de Trevinca.

Por último, cabe destacar que hemos considerado necesario, por el momento, mantener en secreto cualquier información que pudiese facilitar la localización de estas colonias hasta conocer con mayor detalle su tamaño poblacional, con el único fin de proteger su delicado estatus en nuestra comunidad.

Bibliografía

Chapman, T.A. 1906. [sin título]. *Transactions of the Entomological Society of London*, 1906: 89.

Chapman, T.A. & Champion, G.C. 1907. Entomology in N.W. Spain (Galicia and Leon). *Transactions of the Entomological Society of London*, 1907: 147-171, láms V-XI.

Fernández Vidal, E.H. 1988. Notas lepidopterológicas del Noroeste Peninsular (VII). Casayo, ochenta años después (1ª Parte). *SHILAP Revista de Lepidopterología*, 16(62): 141-157.

Fernández Vidal, E.H. 1991. *Guía de las mariposas diurnas de Galicia*. Edit. Diputación Provincial. A Coruña, 219 pp.

Iglesias Garrote, J.L. & Astor Camino, X. 1992. *Guía das bolboretas de Galicia*. Edicións Xerais de Galicia. Vigo, 326 pp.



Fig. 1.- a.- Hembra mostrando anverso (11-VI-2011, Macizo de Trevinca, Ourense). b.- Reverso del mismo ejemplar libando.



Fig. 2.- a.- Macho mostrando reverso en posición de reposo (19-VI-2011, Macizo de Trevinca, Ourense). b.- Macho mostrando el anverso (11-VI-2011, Macizo de Trevinca, Ourense).

