

SÍNTOMAS DE LA VOZ Y EL ÓRGANO VOCAL EN LAS TRABAJADORAS SEXUALES DEL RANCHO LA PESEBRERA EN EL AÑO 2006

Melissa Andrea Portilla Garzón*
Universidad Santiago de Cali**

Resumen

El presente documento es una síntesis de la investigación de tipo descriptivo analítico transversal que se está llevando a cabo en 10 mujeres trabajadoras sexuales entre los 21 a los 32 años del rancho la pesebrera en Jamundi-valle en el año 2006, con el fin de identificar los factores de riesgo que afectan el órgano vocal de dichas mujeres que consumen con frecuencia cocaína, alcohol y cigarrillo produciendo en la mayoría de los casos irritaciones a nivel laríngeo lo que altera las cualidades acústicas de la voz entre otras alteraciones, hasta el momento se tiene resultados parciales ya que aun esta en ejecución.

Palabras clave: factores de riesgo, trabajadoras sexuales, alteraciones de la voz.

Abstract

The present document is a synthesis of the transversal analytic descriptive type investigation that is carrying out in 10 sexual working women among the 21 at the age of 32 of the Rancho de la Pesebrera in Jamundi-Valle in the year of 2006. In order to identifying the factors of risk that affect the vocal organ of that women that consume frequently cocaine, alcohol and cigarette producing in most cases irritations in larynx level that alters the acoustics qualities of the voice among others alterations, up to now they has partial results because is still in execution.

Keywords: factors of risk, sexual workers, alterations of the voice.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las trabajadoras sexuales del rancho la pesebrera en Jamundí valle, se encuentran vinculadas al consumo de la cocaína, alcohol y cigarrillo siendo estos factores indispensables para ofrecer sus cuerpos y llegar a consolidar el acto sexual dejando de lado las consecuencias a nivel de su salud y específicamente en la voz produ-

ciendo irritaciones a nivel laríngeo lo que altera las cualidades acústicas de la voz; la cocaína afecta el sistema fonatorio porque genera resequedad, edematización y deshidratación de los pliegues vocales lo que conduce a patologías hipertónicas, donde se puede encontrar edema de reinke, pólipos y a largo plazo cáncer laríngeo; a nivel funcional se reflejan síntomas como: disfonías, odinofonia, carraspeo, secreciones y sensación de cuerpo extraño. Teniendo en cuenta que la frecuencia e intensidad en la ejecución de estos hábitos hace que los problemas de voz se incrementen, además, las

* Semillera de investigación.

** fonoaudio@usc.edu.co

Mujeres Trabajadoras sexuales no acceden a una evaluación integral, un diagnóstico diferencial y un tratamiento adecuado para mejorar su calidad de voz y salud integral.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A partir de la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan la voz de las trabajadoras sexuales del rancho la pesebrera ubicado en el municipio de Jamundí Valle en el año 2006? Se destaca la importancia de esta investigación, porque las trabajadoras sexuales no están contempladas dentro del sistema general de seguridad social en salud, por lo tanto, se ven obligadas a costearse sus servicios médicos con el fin de ejercer su oficio, además, las trabajadoras sexuales hacen parte de la población vulnerable del estado y para poder ejercer su trabajo acuden a los servicios médicos para obtener el reporte de salud donde demuestre que las mujeres están “sanas”. Las mujeres del rancho la pesebrera, al tener la concepción de salud como medio para poder ejercer el trabajo sexual dejan de lado que la salud es más que un requisito, sino por el contrario el estado de bienestar alcanzado mediante el equilibrio, físico y psicosocial, del individuo (OMS). Los estudiantes implicados en esta investigación creen que es deber de los profesionales de la salud y de la fonoaudiología tratar los problemas de comunicación y sus desórdenes, teniendo como base que la voz es el vehículo fundamental de la comunicación.

OBJETIVOS

Identificar los factores de riesgo que afectan el órgano vocal de las trabajadoras sexuales del rancho la pesebrera en Jamundí-valle en el año 2006.

Específicos

Identificar los factores favorecedores y desencadenantes que afectan la voz de las trabajadoras sexuales.

Detectar los síntomas en la voz mediante las sensaciones referidas por las trabajadoras sexuales. Caracterizar sociodemográficamente la población de las trabajadoras sexuales del rancho la pesebrera en Jamundi- valle.

MARCO DE REFERENCIA

La prostitución inició al intercambiar las mujeres entre esposos siendo un acto muy común. En el antiguo Oriente Próximo y en la India, los templos albergaban a un gran número de prostitutas. A menudo estas mujeres eran personas cultivadas, hábiles bailarinas, cantantes, compositoras y poetas, y que, por ironías de la vida, tenían acceso a las artes que se negaban a otras mujeres. La situación actual del trabajo en la prostitución establece que las mujeres se han incorporado con frecuencia en la prostitución obligadas o bajo presión económica por tal razón recurren a la cocaína, el alcohol y el cigarrillo siendo estos factores indispensables para ofrecer sus cuerpos y llegar a consolidar el acto sexual dejando de lado las consecuencias a nivel de salud que pueden adquirir posteriores al consumo del cigarrillo, alcohol y cocaína. Puede aparecer una irritación del tracto gastrointestinal con erosiones en las paredes del estómago debidas a las náuseas y vómitos que pueden ocasionar al largo plazo una lesión de cuerdas vocales por reflujo gastroesofágico enmarcándose patologías como: irritación y resequedad de la mucosa hasta pólipos, edemas y esófago de Barret.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Tipo de Estudio

Descriptivo analítico, de tipo transversal.

Población

En el rancho la pesebrera en Jamundi valle trabajan 25 mujeres cuyo rango de edad oscilan entre las edades de 21 y 32 años, las cuales se desempe-

ñan como trabajadoras sexuales, de las cuales sólo 10 aceptaron pertenecer al estudio.

Variables

- Edad
- Estado civil
- Número de hijos
- Ciudad de origen
- Nivel educativo
- Tiempo de oficio
- Situación económica

RESULTADOS

Se utiliza una entrevista semiestructurada de (20) preguntas y la ejecución de la anamnesis y formato de evaluación de voz. Se encontró que del 100% de la población de trabajadoras sexuales correspondiente a 10 mujeres, se evidenció que el 53% equivalente a 5 mujeres fuman: el 26% que equivale a 3 mujeres ingiere alcohol y el 21% que corresponde a 2 mujeres consumen cocaína además Del 100% de la población correspondiente a 10 mujeres se evidenció que 4 mujeres correspondiente al 40% presentan doble sintomatología (sensa-

ción de constricción del cuello y carraspeo), 2 mujeres presentaron doble sintomatología (dolor de garganta y odinofonía) y las 4 personas restantes correspondiente al 20% presentaron disfonías

No se puede determinar las conclusiones de esta investigación, teniendo en cuenta que está en ejecución por lo tanto solo se presenta los avances de la misma.

REFERENCIAS

Osorno, Sairo; Llanos, Guillermo y Osorno Gabriel, (1998). Epidemiología para Clínicos, Corporación editora Medica del Valle.

Sabino, Carlos (1997). El proceso de Investigación. Santa Fe de Bogotá. Editorial Panamericana.

Roberto Hernández, Sampieri; Carlos Fernando Collado. Metodología De la Investigación. Editorial Mc Graw Hill.

Páginas de Internet, disponibles en www.Logopediagranada.com, www.scielo.samedicina.de.Costa.Rica, www.laringeyvoz.com.

SECCIÓN INVESTIGATIVA

ARETÉ

EJE TEMÁTICO

Estudios Epidemiológicos
en Fonoaudiología



IBEROAMERICANA
Institución Universitaria
P.J. 0458 DEL 28 DE ENERO DE 1982 MEN