

Clara Eugenia Garza Hume  
Caminos mínimos y burbujas de jabón  
Ciencia Ergo Sum, vol. 8, núm. 3, noviembre, 2001  
Universidad Autónoma del Estado de México  
México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10402216>



*Ciencia Ergo Sum*,  
ISSN (Versión impresa): 1405-0269  
[ciencia.ergosum@yahoo.com.mx](mailto:ciencia.ergosum@yahoo.com.mx)  
Universidad Autónoma del Estado de México  
México

¿Cómo citar?

Fascículo completo

Más información del artículo

Página de la revista

[www.redalyc.org](http://www.redalyc.org)

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

# Caminos mínimos y burbujas de jabón

CLARA EUGENIA GARZA HUME\*

**Resumen.** *Se muestra cómo las películas y burbujas de jabón pueden utilizarse para visualizar y “resolver” algunos problemas matemáticos en forma sencilla y divertida.*

**Palabras clave:** *superficies mínimas, caminos mínimos, cálculo de variaciones, burbujas de jabón, películas de jabón.*

## Minimal Paths and Soap Bubbles

**Abstract.** *We show how soap films and bubbles may be used to visualize and “solve” some mathematical problems in a simple and fun way.*

**Key words:** *minimal surfaces, minimal paths, calculus of variations, soap bubbles, soap films.*

*Recepción: 8 de noviembre de 2000*

*Aceptación: 20 de marzo de 2001*

## Introducción

Las burbujas y películas de jabón son objetos de la vida diaria que mirados con cuidado llevan a plantear preguntas muy interesantes y pueden llevar a descubrimientos importantes. Los trabajos de Boys (1959) e Isenberg (1992) son excelentes introducciones al tema; aquí sólo hablaremos de unos cuantos ejemplos.

Empezaremos mencionando un hecho muy bien conocido, pero cuya demostración matemática requiere algo más que cálculo, y después veremos cómo las películas de jabón dan una demostración muy sencilla del hecho conocido y de otros no tan conocidos.

## I. Matemáticas

Se sabe que el camino mínimo (más corto) entre dos puntos es la recta que los une. Para probar matemáticamente este hecho se usa una herramienta llamada *cálculo de variaciones*.

En los cursos de cálculo se aprende a encontrar puntos críticos, máximos, mínimos o puntos silla de funciones.

Para encontrar un camino mínimo hay que encontrar una función que minimiza una “función de funciones”; es decir, un funcional.

Para encontrar el camino mínimo entre dos puntos  $(x_1, y_1)$  y  $(x_2, y_2)$  hay que escribir la distancia a lo largo de cualquier curva que una a los dos puntos dados y encontrar el mínimo de ese funcional. Es usualmente el primer ejercicio que se resuelve en un curso de cálculo de variaciones.

Por el teorema de Pitágoras, el elemento de distancia está dado por

$$ds = [(dx)^2 + (dy)^2]^{1/2}$$

La longitud total del camino que une  $(x_1, y_1)$  con  $(x_2, y_2)$  es

$$s = \int_{x_1}^{x_2} [(dx)^2 + (dy)^2]^{1/2},$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} \left[ 1 + \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 \right]^{1/2} dx.$$

\*IIMAS-UNAM. Correo electrónico: clara@uxmym1.iimas.unam.mx

FIGURA 1. CAMINO MÍNIMO ENTRE DOS PUNTOS Y VARIACIÓN DEL CAMINO.




FIGURA 2. PELÍCULA DE JABÓN MOSTRANDO EL CAMINO MÍNIMO ENTRE DOS PUNTOS.



Necesitamos el mínimo de  $s$ . Para encontrarlo se escribe el camino arbitrario como

$$y(x, \alpha) = y(x, 0) + \alpha \eta(x)$$

donde  $\alpha$  es un parámetro y  $\eta(x)$  es una función arbitraria tal que

$$\eta(x_1) = \eta(x_2) = 0.$$

Luego se deriva con respecto al parámetro y se evalúa en  $\alpha = 0$ . Se obtiene

$$\frac{\partial f}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y_x} \right) = 0,$$

con  $f = (1 + y_x^2)^{1/2}$ . Como  $f$  no depende explícitamente de  $y$  esto se reduce a

$$\frac{d}{dx} \left( \frac{\partial f}{\partial y_x} \right) = 0,$$

e integrando

$$\frac{\partial f}{\partial y_x} = K,$$

es decir

$$\frac{\partial}{\partial y_x} (1 + y_x^2)^{1/2} = K,$$

Esto implica que  $y_x = m$ , e integrando se obtiene

$$y = mx + c,$$

la ecuación de una recta.

Aun el caso más sencillo requiere cierto trabajo.


## II. Jabón y matemáticas

¿Y qué tienen que ver las burbujas de jabón? Son parientes de las películas de jabón, que tienen mucho que ver con los caminos mínimos.

Si uno sumerge en una solución jabonosa dos placas de acrílico unidas por dos tornillos, al sacar las placas se forma una película de jabón entre los tornillos y las placas cuya área es la mínima posible. Si la separación de las placas es constante, esto nos da también la mínima distancia entre los dos tornillos. En la figura 2 se observa que se forma un rectángulo entre las placas y los dos tornillos y la proyección de eso sobre uno de los acrílicos es precisamente la recta que une los dos tornillos. Es decir, el agua con jabón encontró la distancia mínima entre dos puntos.

¿Qué sucederá ahora si en vez de dos puntos tenemos cuatro?, ¿cuál será el camino más corto que une a los cuatro puntos? Esto ya no es tan conocido, aunque es un resultado clásico. Por simplicidad, supongamos que los cuatro puntos se encuentran en los vértices de un cuadrado de lado 1. Entonces el primer camino que mostramos mide 4. Es claro que puede quitarse un lado y todavía se tiene un camino que une los cuatro puntos, pero mide 3. El camino en forma de X mide  $2\sqrt{2} = 2.83$ .

FIGURA 3. ALGUNOS POSIBLES CAMINOS ENTRE 4 PUNTOS.



El camino en forma de H mide 3.

¿Habrá un camino más corto? Si uno trata de resolver el problema usando cálculo de variaciones, se tropieza con un problema: hay que suponer que el camino se puede expresar como una gráfica de una función diferenciable. Pero de todos los caminos que se ocurren, hay muchos que no cumplen ese requisito.

¿Qué pasa si se le “pregunta” a la película de jabón? “Responde” que hay un camino más corto, el que se muestra en la figura 4.

Esta configuración tiene dos puntos en los que se unen tres caminos haciendo un ángulo de  $120^\circ$ . Usando trigonometría se puede calcular la longitud de este camino, que es  $1 + \sqrt{3} = 2.73$ . Efectivamente, este camino mide menos que los que mostramos en la figura 3.

Para otras configuraciones y otros números de puntos, el camino mínimo tiene uniones de tres caminos a  $120^\circ$  y la película de jabón lo encuentra fácilmente.

¿Qué pasa si hay restricciones? Si se quiere encontrar el camino mínimo, digamos entre tres puntos, pero que no pase por un lago? El problema se puede resolver nuevamente usando películas de jabón. La restricción se impone haciendo una perforación en el acrílico.

En general, las películas de jabón encuentran la superficie mínima subtendida por una frontera dada. En términos matemáticos, la ecuación que hay que resolver es no lineal y no trivial y además los métodos clásicos del cálculo de variaciones sólo encuentran las soluciones dadas en forma de función.

Lo que observó Plateau hace más de cien años (ver Nitsche, 1974) fue que en las películas de jabón, si se intersectan los planos lo hacen con ángulos de  $120^\circ$ , y las líneas resultantes se intersectan formando un ángulo de cerca de  $109^\circ$ . Esto se observa muy claramente sumergiendo un

FIGURA 4. CAMINO MÁS CORTO ENTRE CUATRO PUNTOS.





FIGURA 5. CAMINO MÍNIMO ENTRE TRES PUNTOS CON RESTRICCIÓN.



tetraedro en una solución jabonosa, como se observa en la figura 6.


El tratar de entender las superficies mínimas que no pueden verse como superficies tradicionales fue parte de la motivación para desarrollar teorías matemáticas muy complejas, como la teoría geométrica de la medida, el concepto de *varifolios*, de *corriente minimizante*, etc.

Las observaciones de Plateau motivaron el trabajo matemático fundamental de Jesse Douglas en los años de 1930, que le dio la Medalla Fields y la prueba completa requirió una nueva y poderosa herramienta, en parte desarrollada por F. Almgren Jr. (1976), y se logró en la década de 1970 por Jean Taylor (1976).

Las películas de jabón aún se usan para estudiar el problema no lineal y muy complicado de la turbulencia en flujos “casi” bidimensionales. La espuma también presenta problemas importantes no lineales y no resueltos.

Cabe señalar que incluso los colores de las burbujas sólo pueden explicarse completamente usando mecánica cuántica.

FIGURA 6. TETRAHEDRO CON PELÍCULA DE JABÓN.



### Conclusión

Algo tan sencillo, tan atractivo y tan conocido como las burbujas y las películas de jabón puede ser, si se mira con cuidado, fuente de muchas preguntas y muchas respuestas interesantes.

### Sugerencia a los lectores para experimentar con películas de jabón.

Puede usarse una mezcla de agua limpia (algunos dicen destilada), un poco de jabón líquido para trastes y un poco de glicerina pura. Una versión hace referencia a una taza de agua, media de glicerina y un par de cucharadas de jabón, pero las cantidades exactas no son críticas. Para las películas de jabón, basta con un par de cucharadas de glicerina por cada taza de agua. Para hacer burbujas más grandes y duraderas, sí es necesario usar más glicerina.

Si se hacen figuras de alambre, debe usarse alambre forrado para que se adhiera el jabón. También pueden usarse palillos unidos con plastilina o spaghetti (crudo). 🏠



### REFERENCIAS

- Almgren, F. Jr. y J. Taylor (1976). "The Geometry of Soap Films and Soap Bubbles", *Scientific American*, julio.
- Boys, C.V. (1959). *Soap Bubbles, their Colours and the Forces Which Mould Them*. Dover, New York.
- Isenberg, C. (1992). *The Science of Soap Films and Soap Bubbles*. Dover, New York.
- Nitsche, J. (1974). "Plateau's Problems and their Modern Ramifications", *Amer. Math. Monthly* 81, pp. 945-968.
- Taylor, J. (1976). "The Structure of Singularities in Soap-bubble-like and Soap-film-like Minimal Surfaces", *Annals of Math.* 103, pp. 489-539.