

## ESTUDIO FLORÍSTICO DE LOS CERROS CALIZOS COSTEROS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA BACONAO, CUBA

**Luz Margarita Figueredo Cardona, Orlando Joel Reyes Domínguez,  
Félix Acosta Cantillo y María del Carmen Fagilde Espinosa**

*Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad. José A. Saco núm. 601 esq. Barnada.  
CP 90100. Santiago de Cuba 1. Correo electrónico: luz@bioeco.ciges.inf.cu*

### RESUMEN

Se realiza un estudio florístico de los cerros calizos costeros de la reserva de la biosfera Baconao en Cuba, en el cual se reporta un incremento de 4.5% con respecto a las listas florísticas anteriores. En la investigación se analizan el endemismo, la flora amenazada, el uso potencial de las plantas y los tipos biológicos.

**Palabras clave:** flora, endémicos, especies amenazadas, uso potencial, cerros calizos costeros, reserva de la biosfera Baconao, Cuba.

### ABSTRACT

A floristic study of the Coastal Calcareous Hills of the Biosphere Reserve Baconao in Cuba is carried out, in which an increment of 4.5% is reported in relation with the previous floristic list. In the research the endemism, the threatened flora, the potential use of the plants and the biological types are analyzed.


**Key words:** flora, endemic, threatened species, potential use, coastal calcareous hills biosphere reserve Baconao, Cuba.

### INTRODUCCIÓN

Los cerros calizos costeros pertenecientes a la reserva de la biosfera Baconao en Cuba, se ubican en el municipio Santiago de Cuba, de la provincia de igual nombre, entre 10 y 50 kilómetros de la ciudad. Tienen una superficie de 5 376 ha y se extienden a todo lo largo de la ladera sur de la cordillera de la Gran Piedra, desde Aguadores hasta la laguna Baconao, a partir de la línea de costa (Fig. 1).

El área de estudio se ubica en la subdivisión fitogeográfica de Cuba de Borhidi (1991), en el distrito Faja costera y terrazas entre Santiago de Cuba-Guantánamo-Maisí y Barracoa (Guantanamense), del sector Costas del Sur y Nordeste de Oriente (Santiagicum), correspondiente a la subprovincia Cuba Este (Oriento-Cubanicum).

Desde el punto de vista geológico se presentan las formaciones río Maya, Jaimanitas y La Cruz. Desde Siboney hasta la laguna de Baconao, sólo existen restos de la terraza marina emergida, seccionada en pequeños tramos por los numerosos ríos de la vertiente meridional de la sierra de la Gran Piedra. Dichas terrazas forman los llamados cerros litorales o alturas costeras,



que ganan en altitud sobre el resto de la meseta. Las mismas se disponen de forma paralela a la línea de costa, originadas por la erosión marina (Núñez, 1972).

Los suelos son pardos, esqueléticos naturales, poco evolucionados y fersialíticos sobre rocas sin carbonatos (Plutín, 1991); es típica la existencia de diente de perro o lapiés. En la línea de costa el suelo es arenoso cuarcítico, pardo grisáceo y, en algunas partes, pardo amarillento. En las terrazas marinas, en algunas oquedades del diente de perro o lapiés y en suelos muy poco profundos, se muestran de color pardo oscuro y rendzina roja.

El clima es tropical, caracterizado por una temperatura media anual de 26°C (Montenegro, 1991a). Las precipitaciones registran valores alrededor de 700 mm que pueden ser menores de 200 mm (Montenegro, 1991b). La evaporación media anual es de 2 000 mm (Montenegro y Acosta, 1991).

En cuanto a la vegetación se presentan once tipos con el predominio del matorral costero y precostero, con una alta riqueza de endemismos; seguido del bosque semideciduo micrófilo. También se observan los manglares de extensión muy reducida debido a las características abrasivas de las costas orientales (Figueredo, 2007).

En esta zona se encuentran dos áreas protegidas que constituyen zonas núcleos de dicha reserva de la biosfera: la reserva ecológica Siboney-Juticí, con una extensión de 2 075 ha, de las cuales 1 434 ha son terrestres, y la reserva natural El Retiro, con 1 415 ha, de ellas 1 145 ha terrestres (CNAP, 2004).

Entre los primeros estudios de la flora, se encuentran los realizados en un sector de la reserva ecológica Siboney- Juticí, por Viña (1973) y en la reserva natural El Retiro, por Duany y Mariño (1977).

Posteriormente se conformaron listas florísticas de un sector de la reserva ecológica Siboney-Juticí por Bermúdez *et al.* (1984), y en distintos sitios de Baconao por Menéndez *et al.* (1985) y Castilla *et al.* (1985), Pelicié y Hernández (1985, 1988), Menéndez *et al.* (1986) y Capote *et al.* (1987). Recientemente se realizaron estudios florísticos por Reyes *et al.* (1999), Reyes y Acosta (2000), Bermúdez *et al.* (2001) y Martínez y Alverson (2005) en la reserva ecológica Siboney-Juticí.

A pesar de las investigaciones realizadas, se conoce que la flora potencial es superior a las cifras que actualmente se reportan, más de 680 especies florísticas (Martínez y Alverson, 2005) si se tiene en consideración la extensión, variedad y complejidad para el manejo ecosistémico del área. Casi el 50% de la flora presenta algún uso potencial y los estudios etnobotánicos demuestran que la mayoría de las plantas son útiles, principalmente por sus potencialidades medicinales y maderables. Ello ha incrementado el nivel de impacto de las comunidades locales sobre la flora, fundamentalmente en las de gran importancia económica.

De ahí que el objetivo del presente trabajo es realizar un estudio florístico de los cerros calizos costeros de la reserva de la biosfera Baconao en cuanto a la flora presente, el endemismo, el grado de amenaza, la utilidad de las plantas y el tipo biológico. El resultado de la investigación tiene una

gran importancia en la planificación del manejo de las especies vegetales de esta área protegida. Además, constituye una actualización del conocimiento sobre la composición florística del área de estudio.

### MATERIAL Y MÉTODOS

Se procesaron los datos correspondientes a doce expediciones de campo, realizadas en un periodo de dos años en los cerros calizos costeros de la reserva de la biosfera Baconao, durante las cuales se colectó el material botánico cuya identificación rápida en el campo resultaba dudosa.

Se emplearon los métodos tradicionales de identificación de las especies a través de las consultas en el herbario del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad de Santiago de Cuba (BSC) y en el Jardín Botánico Nacional (HAJB). También se revisaron los diferentes tomos de la Flora de Cuba (Alaín, 1964; León, 1946; León y Alaín, 1951, 1953 y 1957) un Suplemento (Alaín, 1974) y fascículos (Rankin, 1998, 2003, 2005a y 2005b; Bässler, 1998; Rodríguez, 2000a, 2000b y 2000c; Gutiérrez, 2000 y 2002; Greuter, 2002; Méndez, 2003; Pérez, 2005; Albert, 2005; Areces, 2007; González, 2008 y Beurton, 2008).

Para la confección de la lista de taxones que sirvió de base para el estudio florístico se utilizaron los datos procesados de las expediciones efectuadas para esta investigación. También se consultaron las listas existentes en el banco de información del herbario BSC y la bibliografía disponible (Bermúdez, 1984; Bermúdez *et al.*, 2001 y Martínez y Alverson, 2005). Para determinar el uso potencial de las plantas se emplearon los criterios de Roig (1975).

El grado de amenaza de las especies se determinó por la Lista Roja de la Flora Vascular Cubana (Berazaín *et al.*, 2005).

Para el análisis del endemismo se consultaron diversas publicaciones (Samek, 1973c; López, 1994, 1998a, 1998b y 2005; Albert y López, 1986; López *et al.*, 1985, 1993, 1994; López y Cejas, 2000). En la clasificación del tipo de endemismo se siguió el criterio de López *et al.* (1994).

Se determinaron los tipos biológicos según Raunkiaer (1934), modificado por Borhidi (1991).

### RESULTADOS

En la lista florística de los cerros calizos costeros de la reserva de la biosfera Baconao se presenta un total de 724 taxones, agrupados en 364 géneros y 89 familias botánicas (tabla 1), lo cual actualiza el inventario más reciente aportado por Martínez y Alverson (2005) en un 4.5%. Ésta constituye una cifra relevante si se considera que la misma representa el 55% del total de la flora reportada por Vega (2001) para la provincia Santiago de Cuba y el 51% de los taxones estudiados por Martínez *et al.* (2001) en el macizo montañoso Sierra Maestra.

El total de géneros representa el 60% de los registrados por Vega (2001) para la provincia Santiago de Cuba, lo cual constituye un dato importante si se tiene en cuenta la extensión superficial del área de estudio (53.8 km<sup>2</sup>) con respecto a los 6 196 km<sup>2</sup> de la provincia.

Las familias con el mayor número de taxones son: Rubiaceae (49), Fabaceae-

Faboidae y Euphorbiaceae (ambas con 48), Boraginaceae (40), Asteraceae (31), Convolvulacaceae y Malvaceae s. str (ambas con 26), Verbenaceae (23) y Apocynaceae (20).

Del total de especies que se presentan en la lista florística, sólo 17 han sido introducidas, un 2%. El 23% son endémicas y la mayoría de las especies, el 75%, son autóctonas, que han logrado adaptarse a las difíciles condiciones ecológicas dadas en las altas temperaturas y evaporación, las bajas precipitaciones y suelos muy pobres.

La mayoría de las plantas introducidas han sido utilizadas para el manejo forestal o como ornamentales, entre ellas *Delonix regia* (Bojer) Raf., *Casuarina equisetifolia* J.R. & G. Forst. y *Pithecellobium dulce* (Roxb.) Benth y por el ganado *Dichrostachys cinerea* Miq. Algunas como *Aloe vera* L., *Leucaena leucocephala* (Lam.) De Wit y *Panicum maximum* Jacq., son plantas colonizadoras en sitios perturbados que se presentan en el área.

El 50% de la flora registrada para el área, o sea 363 especies, presenta

alguna utilidad en cuanto a: maderables, medicinales, melíferas, alimenticias, ornamentales, industriales, tóxicas y con otros usos. De éstas, el 37 y el 38% son consideradas maderables y medicinales, respectivamente.

Existen 131 taxones con otros usos, que representan un 36%, y 51 especies (14%) que poseen látex con alguna propiedad tóxica o venenosa, que pueden ser perjudiciales al hombre y los animales (Roig, 1974). Otras plantas son ornamentales (13%), alimenticias (11%), melíferas (9%) e industriales (6%). Para Siboney-Juticí, Bermúdez et al. (2001) obtuvieron resultados similares.

El 17% de la flora potencialmente útil constituyen especies endémicas y sólo el 3% presenta algún grado de amenaza.

Para los cerros calizos costeros de la reserva de la biosfera Baconao se reportan 168 endémicos (cuadro 1), que representan el 18% de los 916 taxones infragenéricos endémicos de Cuba oriental, si se toman como referencia los datos de López (1998b) y el 5% de los endémicos cubanos, según el reporte de Vales et al. (1998).

**Cuadro 1.** Endémicos de la reserva de la biosfera Baconao.

Tipo de endemismo	Total de endémicos	Porcentaje con respecto al total de endémicos
Distrital o estricto	35	21
Multidistrital oriental	46	27
Multisectorial Cuba oriento-central	24	14
Multisectorial Cuba oriento-occidental	15	9
Total o pancubano	48	29

Los tipos de endémicos encontrados, según su distribución, fueron los siguientes: En estos datos, es notable el predominio de los endémicos totales (29%) y multidistritales orientales (27%); además, el alto porcentaje de distritales o estrictos (21% del total) justifican las acciones de conservación que deben desarrollarse en la zona.

Los endémicos distritales representan el 45% de los reportados por López (2005), para el distrito costero Cabo Cruz-Baconao. Los menores porcentajes corresponden a los multisectoriales con un 23%, sobre todo los multisectoriales Cuba oriento-occidental con un 9%.

**Cuadro 2.** Endémicos por familias.

Familias	Total especies	Endémicos	Porcentaje de endemismo/familia
Rubiaceae	49	25	51
Bignoniaceae	14	11	79
Acanthaceae	12	8	67
Rhamnaceae	15	7	47
Malpighiaceae	13	6	46
Myrtaceae	13	6	46
Asclepiadaceae	16	6	38

El 47% de las familias presentan endémicos y las que mayor número de especies, subespecies y/o variedades registran son: las familias con mayor porcentaje de endémicos, respecto a los 168 taxones endémicos reportados en este estudio son Bignoniaceae (79%), Acanthaceae (67%) y Rubiaceae (51%) (cuadro 2).


Otras familias que poseen un número importante de endémicos, aunque con menor porcentaje, son Euphorbiaceae (16 especies, 33.3%), Boraginaceae (12, 30%), Asteraceae (8, 25.8%), Verbenaceae (7, 30.4%) y Apocynaceae (6, 30%), que además se encuentran entre las más abundantes. Se detectaron un total de 21 especies amenazadas (tabla 2), que representan el 3% del

total. Este porcentaje, es comparable al obtenido por Vega (2001), que encontró que el 3.5% de la flora provincial está amenazada. De ellas, tres especies están en peligro crítico, 14 en peligro y cuatro son vulnerables. Todas se encuentran en la reserva ecológica Siboney-Juticí y en el paisaje natural protegido El Retiro, que constituyen zonas núcleo de la reserva de la biosfera Baconao. Este aspecto es importante si se considera que, en este estudio, el 76% de la flora amenazada son endémicos. Entre las especies más importantes consideradas en peligro, están *Jacquinia verticillaris* Urb., *Eugenia iteophylla* Krug & Urb. y *Lasiocroton gracilis* Britt. & Wils., que además de constituir endémicos distritales, sus poblaciones

son de distribución restringida y presentan muy pocos individuos. Ha sido difícil la relocalización de estas plantas.

Es necesario reconsiderar la categoría actual de *Coccothrinax fagildei* Borhidi et Muñiz, considerada como vulnerable en la Lista Roja Vascular Cubana (Berazaín et al., 2005). Otros autores, especialistas en la familia, presentan las mismas consideraciones (Zona et al., 2007). Al analizar los tipos biológicos se encontró que la flora presenta un porte variado. Predominan los nanofa-

nerófitos (170 especies), los micronanofanerófitos (126), las lianas leñosas (104), los terófitos (99), los microfanerófitos (95), los micromesofanerófitos (39), los mesofanerófitos (29) y las lianas herbáceas (26) (Fig. 2). En menor cuantía se presentan las epífitas facultativas, mayormente resistentes a la sequía (17) y las fanerófitas suculentas (14). Prácticamente escasas se encontraron los mesofanerófitos en roseta apical (3), las hidrófilas epífitas mayormente obligadas (3), las epífitas leñosas (1) y las suculentas enanas de características caméfitas (1).



**Fig. 2.** Tipos biológicos de las especies florísticas de los cerros calizos costeros de la reserva de la biosfera Baconao.

Np = Nanofanerófita, SP = Fanerófita suculenta, N-McP = Micronanofanerófita, Mc-MsP = Micromesofanerófita, MsP = Mesofanerófita, McP = Microfanerófita, Ms-pros = Mesofanerófita en roseta apical, LP = Liana leñosa, LH = Liana herbácea, Ech = Epífita facultativa, Eg-h = Higrófila epífita mayormente obligada, Ch = Caméfita, Th = Terófita.

## DISCUSIÓN

El total de especies de la lista florística supera en 4.5% el reportado por otros autores (Viña Bayés, 1973; Duany y Mariño, 1977; Bermúdez *et al.*, 1984; Menéndez *et al.*, 1985; Castilla *et al.*, 1985; Menéndez *et al.*, 1986; Capote *et al.*, 1987; Bermúdez *et al.*, 2000 y Martínez y Alversen, 2005). En todos estos estudios anteriores se han realizado en pequeños sectores del área y en este caso se ofrece toda la zona costera de la reserva de la biosfera Baconao.

El área presenta una alta riqueza florística si tenemos en cuenta que los cerros calizos costeros representan sólo el 6.6% de la reserva de la biosfera Baconao. Las particularidades geomorfológicas y edafoclimáticas de esta zona han condicionado el desarrollo de una gran variedad de especies. Las mismas están dadas en la existencia de una costa clasificada como estructural (de falla), acantilada, erosiva, abrasiva, acumulativa y en parte biogénica (Núñez, 1972). Los suelos son muy pobres debido a sus características de esqueléticos naturales, poco evolucionados y fersialíticos sobre rocas sin carbonatos (Plutín, 1991). También es típica la existencia de diente de perro o lapiés en casi un 60% del área, sobre el cual crecen numerosas especies cuyas raíces llegan a penetrar las rocas, lo que les permite sobrevivir en ese hábitat.

En el presente estudio se corroboran los resultados obtenidos por otros autores, como es el caso de Menéndez *et al.*, 1986 y Capote *et al.*, 1987, que también refirieron las familias Rubiaceae, Fabaceae-Faboidae y Euphorbiaceae como las más numerosas, para las localidades Daiquirí-Verraco y Verraco-Cazonal. Los estudios florísticos

recientes, realizados por Vega (2001) en la provincia Santiago de Cuba y Martínez y Alversen (2005) en la reserva ecológica Siboney-Juticí, también lo confirman. Esto está determinado porque gran parte de las especies de estas familias, que habitan en estos sitios, presentan características anatómicas que les permiten adaptarse a las características climáticas extremas que se presentan con altas temperaturas, y evaporación y bajas precipitaciones.

El predominio de la esclerofilia y la microfilia constituyen respuestas adaptativas de las plantas a este hábitat; lo cual ha sido demostrado por Fornaris *et al.* (2001).

Otras investigaciones efectuadas en localidades cársicas de Cuba (García *et al.*, 1985, 2001), también reportan a las familias Rubiaceae y Euphorbiaceae entre las más numerosas. Sin embargo, Rodríguez *et al.* (1982), para Imías, expusieron que las familias Agavaceae, Bignoniaceae, Cactaceae, Capparidaceae, Malpighiaceae y Sterculiaceae, son las de mayor índice de abundancia-dominancia de sus individuos.

La mayoría de las familias mencionadas se encuentran entre las mejor representadas en las Antillas Mayores, por el número de géneros que poseen (Acevedo, 1991), lo cual se analizó para la flora de Cuba, por Gómez de la Maza y Roig (1914).

Los datos obtenidos del uso potencial de la flora se corresponden con los reportados para algunos sectores costeros de Baconao, por Menéndez *et al.* (1985), Pelicié y Hernández (1985, 1988) y Capote *et al.* (1987). Resultados similares fueron registrados por Vega (2001), para la provincia Santiago de Cuba.

Se destaca que el 75% de las especies útiles son por sus potencialidades maderable y medicinal, lo cual incrementa los riesgos de disminución de la diversidad vegetal por el nivel de uso por parte de las comunidades locales. Esto se hace significativo si se considera que el 17% de la flora potencialmente útil constituyen endémicos y el 3% presenta algún grado de amenaza.

En los cerros calizos costeros y zonas alejadas existen alrededor de 3 600 habitantes, distribuidos en siete asentamientos poblacionales donde se incluyen dos comunidades artísticas cuya actividad fundamental es la escultura en madera. Esta densidad poblacional genera necesidades de viviendas, fundamentalmente construidas con árboles de la localidad.

La cifra de endémicos, el 23% del total de la flora reportada en la zona de estudio, es comparable con uno de los distritos más ricos en endémicos, la faja costera Maisí-Guantánamo, que presenta un 25% y, además, es considerada como una de las nueve áreas amenazadas de desertificación en Cuba (CITMA, 2003). Tanto esta faja como el área de estudio se encuentran ubicadas en la zona suroriental de Cuba, con características florísticas y de vegetación similares, que facilita una alta propensión a la desertificación y la sequía.

Los criterios establecidos en el Programa Nacional Contra la Desertificación y la Sequía (CITMA, 2003), para la selección de áreas amenazadas de desertificación en la República de Cuba son: poca lluvia (entre 500 y 700 mm), precipitaciones de distribución muy irregular (de 9 a 11 meses secos), presencia del efecto Föhn, temperaturas muy elevadas durante todo

el año (con una media alrededor de 26°C), rocas y suelos muy percolantes y superficiales (areniscas y rocas calcáreas) y vegetación xerofítica con elevado endemismo local, distrital y cubano. Todas estas particularidades se presentan en el área de estudio.

El 74% de los endémicos están presentes en el distrito costero cabo Cruz-Baconao, según los registros de López (2005). Las características edafoclimáticas extremas de esta zona y las adaptaciones desarrolladas por las plantas ante este medio adverso, constituyen factores importantes que han determinado la presencia de numerosas especies endémicas.

También es de destacar que el 48% de los endémicos tienen una distribución restringida a Cuba Oriental, lo que se acerca a lo encontrado por López (1998a, 2005) para los endémicos de esta región, respecto al total de los que se presentan en el archipiélago cubano. Ello fortalece el criterio de que Cuba Oriental fue la “cuna” de la flora cubana (CNAP, 2002).

Los resultados de las familias con mayor número de endémicos coinciden con los obtenidos por Capote *et al.* (1987) para el sector Daiquirí-Verraco y los de Martínez y Alverson (2005) en Siboney-Juticí.

El predominio de los nanofanerófitos (170 especies) se corresponde con las características arbustivas y xeromorfas de la vegetación en la zona estudiada, con abundantes cactáceas columnares, algunas lianas herbáceas y aislados emergentes microfanerófitos y micromesofanerófitos. Los nanofanerófitos constituyen el tipo biológico de mayor riqueza de especies,

dado a que en las formaciones vegetales más extensas del área, como el matorral costero y precostero (Figueredo, 2008) predomina el estrato arbustivo.

En estudios florísticos similares, realizados por Weeden y Duany (1978) para El Retiro, se manifiesta la misma coincidencia en cuanto a los nanofanerófitos como un tipo biológico predominante. Un resultado semejante encontraron Capote *et al.* (1987) para el sector Daiquirí-Verraco, los cuales incluyen en la dominancia a las especies micronanofanerófitas. Lo anterior coincide con lo analizado para Cuba por Borhidi (1996).

### CONCLUSIONES

El área de estudio presenta una alta composición florística si se tiene en cuenta su pequeña extensión, 6.6%, con respecto al total del área que ocupa la reserva de la biosfera Baconao. Las familias mejor representadas en número de especies, subespecies y/o variedades son Rubiaceae, Fabaceae-Faboidae y Euphorbiaceae.

El porcentaje de endemismo es alto, predominan los endémicos multidistritales orientales y los distritales o estrictos, los menores son los multisectoriales Cuba oriento-occidental. Las familias, con mayor porcentaje de endémicos son Bignoniaceae, Acanthaceae y Rubiaceae.

El tipo biológico predominante es el nanofanerófito, lo cual se corresponde con las características arbustosas de la vegetación.

Las especies amenazadas constituyen el 3% de la flora encontrada. Este porcentaje

es importante, ya que en el mismo predominan las especies con la categoría de en peligro y vulnerable y las tres cuartas partes constituyen endémicos.

### LITERATURA CITADA

- Acevedo, P., 1991. "Angiosperms in the Greater Antilles". En: *Flora of the Greater Antilles Newsletter*, 1: 3-5.
- Alain, Hno., 1964. *Flora de Cuba 5. Rubiaceae-Asteraceae*. Asoc. Est. Cien. Biol. Publ. Univ. La Habana. Cuba. 362 pp.
- \_\_\_\_\_, 1974. *Flora de Cuba. Suplemento. Tomo 1*. Instituto Cubano del Libro. La Habana. 150 pp.
- Albert, D., 2005. "Meliaceae". In Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 10 (5) - Ruggell, Liechtenstein. Gantner. 44 pp.
- Albert, D. y A. López, 1986. "Distribución de las fanerógamas endémicas de la Sierra Maestra". *Reporte de Investigación del Instituto de Botánica* No.11: 27 pp.
- Areces, F. & Fryxell, P., 2007. "Malvaceae". In Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 13- Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 228 pp.
- Bässler, M., 1998. "Mimosaceae". *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 2. Ruggell, Liechtenstein. Gantner. 202 pp.

- Berazaín, R., 2006. "Comentarios sobre los géneros endémicos cubanos". En: *Memorias del X Encuentro de Botánica "Johannes Bisse In Memoriam"*, 1-4 Diciembre, Camagüey. Cuba.
- Berazaín, R., F. Areces, J.C. Lazcano y L.R. González, 2005. *Lista roja de la flora vascular cubana*. Documentos 4. Jardín Botánico Atlántico de Gijón. España. 86 pp.
- Bermúdez, F., 1984. *Contribución al Conocimiento Florístico de la Vegetación Xeromorfa Costera y Subcostera de Siboney-Justicí-Sardinero, desde 1973-1984*. Inédito. Documentos del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO). 34 pp.
- Bermúdez, F., L.M. Figueredo, O.J. Reyes, A. González y L. Viña Dávila, 2001. *Estudio florístico de la Reserva Ecológica Siboney-Juticí*. Inédito. Documentos del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad.
- Beurton, C., 2008. "Rutaceae". In Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). *Flora de la República de Cuba*. Serie A, Plantas Vasculares. Fascículo 14 (3) - Ruggell, Liechtenstein. Gantner. 134 pp.
- Borhidi, A., 1991. *Phytogeography and Vegetation Ecology of Cuba*. Akademiai Kiado Budapest. 858 pp.
- Borhidi, A., 1996. *Phytogeography and Vegetation Ecology of Cuba*. 2a ed. Akademiai Kiado Budapest. 956 pp.
- Capote, R.P., N. Ricardo, D. Vilamajó, R. Oviedo y E.E. García, 1987. "Flora y vegetación de la zona costera entre Daiquirí y Verraco, Parque Baconao, Santiago de Cuba". *Acta Botánica Cubana*. No.48. Academia de Ciencias de Cuba. 28 pp.
- Castilla, R., R. Menéndez, R. Berazaín, L.A. Kuznetsov, O. Pelicié, Reyes, D. y M. Rodríguez, 1985. "Comparación de la flora y la vegetación de dos zonas xerófitas del Parque Baconao". *Memorias del Primer Simposio de Botánica*. Tomo III. pp. 99-103.
- CITMA, 2003. *Programa Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Sequía*. AMA. CIGEA. CITMA. La Habana. Cuba. 52 pp.
- CNAP (Centro Nacional de Áreas Protegidas), 2002. *Plan 2003-2008 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas*. Centro Nacional de Áreas Protegidas. Agencia de Medio Ambiente. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La Habana. 223 pp.
- CNAP (Centro Nacional de Áreas Protegidas), 2004. *Las áreas protegidas de Cuba*. Centro Nacional de Áreas Protegidas. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 34 pp.
- Duany, D. y C. Mariño, 1977. *Estudio de la composición florística de la vegetación espinar tropical de la Estación de la Reserva Natural "El Retiro"*. Trabajo de Curso. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 9 pp.
- Fornaris, E., O.J. Reyes y F. Acosta, 2001. "Funcionamiento de las principales formaciones boscosas de los macizos

- montañosos orientales". En: *Informe del proyecto "Diversidad biológica de los macizos montañosos de Cuba oriental"*. Tomo II. Programa Nacional Científico-Técnico "Desarrollo sostenible de la montaña". BIOECO. pp. 431-458.
- García, E., N. Ricardo, R. Oviedo y R.P. Capote, 1985. "Flora y vegetación del área de Morrillo Chico, Santiago de Cuba". *Memorias del Primer Simposio de Botánica*. Tomo III. C. Habana, Cuba. pp. 1-14.
- García, J.P., A. Orozco y E.R. Bécquer. (2001). "Estudio de la flora y vegetación de una localidad cárstica de la Reserva Ecológica "Alturas de Banao", Sancti Spíritus". *Rev. Jard. Bot. Nac. Univ. Habana*, **22**(1): 31-42.
- Gómez de la Maza, A. y J.T. Roig, 1914. *Flora de Cuba* (Datos para su estudio). Imp. y Pap. de Rambla, Bouza y Cia., La Habana, Cuba. 182 pp.
- González, P., 2008. "Oleaceae". In Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 14 (2). Ruggell, Liechtenstein. Gantner. 52 pp.
- Greuter, W., 2002. "Phytolaccaceae". In Greuter, W. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 6(3) - Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 37 pp.
- Gutiérrez, J., 2000. "Flacourtiaceae". In Greuter, W. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*.
- res. Fascículo 5(1) - Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 76 pp.
- Gutiérrez, J., 2002. "Sapotaceae". In Greuter, W. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 6(4) - Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 59 pp.
- Hernández, J., 2001. "Uso de las plantas". En: *Informe del proyecto Diversidad biológica de los macizos montañosos de Cuba oriental*. Programa Nacional Científico-Técnico "Desarrollo sostenible de la montaña". Tomo II. BIOECO. pp. 549-623.
- León Hno., 1946. *Flora de Cuba 1. Gimnospermas. Monocotiledóneas*. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle". La Habana, No. 8. 441 pp.
- León, Hno. y Hno. Alain, 1951. *Flora de Cuba 2. Dicotiledóneas: Casuarináceas a Meliáceas*. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle". La Habana, No. 10. 502 pp.
- \_\_\_\_\_, 1953. *Flora de Cuba 3. Dicotiledóneas: Malpighiaceas a Myrtáceas*. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Coll. La Salle, La Habana, No. 13. 502 pp.
- \_\_\_\_\_, 1957. *Flora de Cuba 4. Melastomatáceas a Plantagynáceas*. Contr. Ocas. Mus. Hist. Nat. Colegio "De La Salle", La Habana, No. 16. 556 pp.
- López, A., 1989. "Distribución distrital del endemismo". En: *Nuevo Atlas Nacional de Cuba*. Sección X-2. Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias

- de Cuba e Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía. La Habana.
- López, A., 1994. “El endemismo vegetal en Moa-Toa-Baracoa (Cuba Oriental)”. *Fonqueria*, **39**: 433-474.
- \_\_\_\_\_, 1998a. “Algunas características del endemismo en la flora de Cuba Oriental”. En: *La diversidad biológica de Iberoamérica II*. Volumen Especial, Acta Zoológica Mexicana, Nueva Serie. Ed. Gonzalo Halffter. Instituto de Ecología de Xalapa. México. pp. 47-82.
- \_\_\_\_\_, 1998b. “Diversidad de la flora endémica de Cuba Oriental: Familias con endemismos distritales”. *Moscosoa*, **10**: 136-163.
- \_\_\_\_\_, 2005. “Nueva perspectiva para la regionalización fitogeográfica de Cuba: Definición de los sectores”. En: *Regionalización biogeográfica en Iberoamérica y tópicos afines: Primeras Jornadas Biogeográficas de la Red Iberoamericana de Biogeografía y Entomología Sistemática (RIBES XII.I-CYTED)*. Ed. J. Llorente y J. J. Morrone. Las Prensas de Ciencias, Facultad de Ciencias, UNAM, México. pp. 417-428.
- López, A. y F. Cejas, 2000. “El endemismo en la flora vascular de Guanacahabibes (Cuba Occidental)”. *Fonqueria*, **55**(1): 1-11.
- López, A., B.L. Toscano y M. Llerena, 1985. “Las fanerógamas endémicas de Pinar del Río”, En: *Memorias del Primer Simposio de Botánica*: Tomo 1. Academia de Ciencias de Cuba, La Habana. pp. 55-90.
- López, A., M. Rodríguez y A. Cárdenas, 1993. “El endemismo vegetal en Maisí-Guantánamo (Cuba Oriental)”. *Fonqueria*, **36**: 399-420.
- \_\_\_\_\_, 1994. “El endemismo vegetal del Turquino (Cuba Oriental)”. *Fonqueria*, **39**: 395-431.
- Martínez, E. y W.S. Alverson, 2005. “Plantas vasculares terrestres”. En: *Rapid Biological Inventories*. Report 10. Cuba: Siboney-Juticí. Eds: Fong, A.; D. Maceira; W. S. Alverson and J. M. Shopland. The Field Museum, Chicago. pp. 52-54.
- Martínez, E., Fagilde, M. C. y F. Bermúdez, 2001. “Fanerógamas”. En: *Informe del proyecto Diversidad biológica de los macizos montañosos de Cuba oriental*. Tomo II. Programa Nacional Científico-Técnico “Desarrollo sostenible de la montaña”. BIOECO. Inédito. pp. 503-516.
- Méndez, I., 2003. “Verbenaceae”. In Greuter, W. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 7(3) - Ruggell, Liechtenstein. Gantner. 126 pp.
- Menéndez, R., R. Castilla, O. Pelicié, D. Reyes y M. Rodríguez, 1985. *Ecología de las maniguas xerofíticas costeras del Parque Baconao*. Informe de Investigación. Instituto Superior Pedagógico “Frank País”. pp. 11-16.

- Menéndez, R., R. Castilla, O. Pelicié, D. Reyes; R. Berazaín y L.A. Kuznetzov, 1986. "Introducción al estudio de la vegetación y la flora de la parte costera de la región de Baconao". *Rev. Jard. Bot. Nac. Univ. Habana*, 7(1): 37-47.
- Pelicié, O. y J. Hernández, 1985. "Estudio etnobotánico del matorral xeromorfo costero comprendido entre las playas Verraco y Cazonal de Santiago de Cuba". *Memorias del Primer Simposio de Botánica*, Tomo II, Palacio de las Convenciones, La Habana. 510-521 pp.
- \_\_\_\_\_, 1988. "Plantas medicinales del matorral xeromorfo costero comprendido entre las playas Verraco y Cazonal. Provincia Santiago de Cuba". *Revista Plantas Medicinales*, vol 8. 17 pp.
- Pérez, J., 2005. "Dilleniaceae". In Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 10(3) - Ruggell, Liechtenstein. 25 pp.
- Rankin, R., 1998. "Aristolochiaceae". In Manitz, H. & Gutjahr, A. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 1(2)-Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 39 pp.
- \_\_\_\_\_, 2003. "Polygalaceae". In Greuter, W. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 7(1) - Ruggell, Liechtenstein. 52 pp.
- Rankin, R., 2005a. "Capparaceae". In Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 10(1) - Ruggell, Liechtenstein. Gantner. 24 pp.
- Rankin, R., 2005b. "Cleomaceae". In Greuter, W. & Rankin, R. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 10(2) - Ruggell, Liechtenstein. Gantner. 24 pp.
- Reyes, O.J. y F. Acosta, 2000. "Flora y vegetación". En: *Caracterización y manejo de la Reserva Ecológica Siboney*. Informe del proyecto. Inédito. 87 pp.
- Reyes, O.J., F. Acosta, R. Oviedo y F. Bermúdez, 1999. *La Reserva Florística Manejada Justicí y sus alrededores, notas sobre su flora y vegetación*. Editorial Academia, Biodiversidad de Cuba Oriental. Vol. III: 26-30 pp.
- Rodríguez, A., 2000. "Familia Sterculiaceae". En: *Flora de la República de Cuba*, Fascículo 3(4). pp. 8.
- \_\_\_\_\_, 2000a. "Elaeocarpaceae". In Greuter, W. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 3(3) - Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 12 pp.
- \_\_\_\_\_, 2000b. "Sterculiaceae". In Greuter, W. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 3(4) - Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 68 pp.
- \_\_\_\_\_, 2000c. "Tiliaceae". In Greuter, W. (ed.). *Flora de la República de Cuba. Serie A, Plantas Vasculares*. Fascículo 3(5) - Koeltz Scientific Books, Koenigstein. 38 pp.

- Rodríguez, N., S. Muñoz, A.M. Fernández y R. Orta, 1982. "Estudio ecológico y fitogeográfico de una región xerofítica de Cuba Oriental". *Rev. Jard. Bot. Nac. Univ. Habana*, **3**(1):33-44.
- Roig, J.T., 1975. *Diccionario Botánico de nombres vulgares cubanos*. Editorial Pueblo y Educación. Tomos I y II.
- Samek, V., 1973c. *Regiones Fitogeográficas de Cuba*. Acad. Cienc. Cuba, Habana. Serie Forestal No. 15. La Habana. 63 pp.
- Vales, M., A. Álvarez, L. Montes y A. Ávila (comp.), 1998. *Estudio Nacional sobre la Diversidad Biológica en la República de Cuba*. PNUMA, Cen-Bio, IES, AMA, CITMA. La Habana. CESYTA, Madrid. 480 pp.
- Vega, M., 2001. *Contribución al conocimiento de las fanerófitas de la provincia Santiago de Cuba*. Tesis en Opción al Título de Licenciado en Ciencias Biológicas. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. 24 pp.
- Viña Bayés, N., 1973. *Estudio Integral de la Reserva Natural de Siboney*. Tesis en Opción al grado de Doctor en Ciencias Geográficas. Inédito. 254 pp.
- Weeden, C. y D. Duany, 1978. *Análisis fisionómico de la composición florística de la vegetación espinar tropical al sureste de Santiago de Cuba*. Trabajo de Diploma de la Universidad de Oriente. 19 pp.
- Zona, S., R. Verdecia, A.T. Leiva, C.E. Lewis y M. Maunder, 2007. "The conservation status of West Indian palms (Arecaceae)". *Oryx*, **41**(3): 300-305.

Recibido: 23 septiembre 2008. Aceptado: 4 agosto 2009.

**Tabla 1.** Lista florística de los cerros calizos costeros de la reserva de la biosfera Baonao.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Apassalus cubensis</i> (Urban) Kobuski		End	Th
	<i>Barleriola saturejoides</i> (Griseb.) Mazza		End	Np
	<i>Barleriola solanifolia</i> (L.) Oerst. ex Lindau		Nat	Np
	<i>Dicliptera vahliana</i> Nees	gallitos	Nat	Th
	<i>Drejerella calcicola</i> Urb.		End	Th
	<i>Drejerella origanooides</i> (Nees) Lindau		End	Th
	<i>Drejerella maestrensis</i> Urb.		End	Th
	<i>Oplonia tetrasticha</i> (Wr. ex Griseb.) Steam.	no me toques	End	Np
	<i>Oplonia tetrasticha</i> (Wr. ex Griseb.) Steam. ssp. <i>polyce</i>		End	Np
	<i>Stenandrium crenatum</i> Urb.		End	Th
	<i>Stenandrium scabrosum</i> (Sw.) Nees		Nat	Th
	<i>Ruellia tuberosa</i> L.		Nat	
	<i>Agave albescens</i> Trelease		End	SP
	<i>Agave underwoodii</i> Trelease		End	SP
	<i>Furcraea hexapetala</i> (Jacq.) Urb.	pita magüey	Nat	SP
	<i>Furcraea macrophylla</i> Baker	pita sábila	Int	SP
	<i>Aloe vera</i> L.	verdologa de mar	Nat	Np
	<i>Sesuvium portulacastrum</i> L.	rabo de gato	Nat	Np
	<i>Triantema portulacastrum</i> L.		End	Np
AGAVACEAE	<i>Achyranthes aspera</i> var. <i>aspera</i> L.		Nat	Np
ALOACEAE	<i>Alternanthera axillaris</i> (Hornem.) D. Dietr.		Nat	Np
ALZOACEAE	<i>Alternanthera tenella</i> Coll.		Nat	Np
AMARANTHACEAE	<i>Alternanthera serpyllifolia</i> Urb.		Nat	Np
	<i>Amaranthus crassipes</i> Schleid.	bledo de clavo	Nat	Th
	<i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell	bledo	Nat	Th

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	bledo espinoso	Nat	Th
	<i>Blutaparon verniculare</i> (L.) Mears	perejil de costa	Nat	Th
	<i>Chamissoa altissima</i> (Jacq.) H.B.K.	guaniquique	Nat	LP
	<i>Gomphrena serrata</i> L.	San Diego	Nat	Th
	<i>Iresine flavescentis</i> H. & B. ex Willd.	cimarrón	Nat	Np
	<i>Comocladia dentata</i> Jacq.	jiquilete	Nat	N-McP
	<i>Comocladia platyphylla</i> A. Rich. ex Griseb.	guao prieto	Nat	N-McP
	<i>Mangifera indica</i> L.	guao blanco	End	N-McP
	<i>Metopium brownei</i> (Jacq.) Urb.	mango	Nat	Mc-MsP
	<i>Metopium toxiferum</i> (L.) Krug & Urb.	guao de costa	Nat	MsP
	<i>Metopium venustum</i> Engl.	guao de costa	End	McP
	<i>Spondias mombin</i> L.	jobo	Nat	N-McP
	<i>Spondias purpurea</i> L.	ciruela	Int	Mc-MsP
	<i>Anona squamosa</i> Delile	anón	Int	N-McP
	<i>Oxandra lanceolata</i> (Sw.) Baill.	yaya	Nat	Mc-MsP
	<i>Anechites nerium</i> (Aubl.) Urban		Nat	LP
	<i>Angadenia lindeniana</i> (Muell. Arg.) Miers.		End	LP
ANACARDIACEAE		curamagiíey	Nat	LP
		blanco		
APOCYNACEAE		bejuco prieto	Nat	LP
		bejuco lechoso	Nat	LP
		rosa de sabana	Nat	LP
			Nat	Np
		clavelitos	Nat	LP
		lirio	End	N-McP
			End	N-McP

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Plumeria obtusa</i> L.	lirio	Nat	McP
	<i>Plumeria rubra</i> L.	lirio tricolor	Int	McP
	<i>Plumeria stenophylla</i> Urb.		End	N-McP
	<i>Plumeria trinitensis</i> Britton		End	N-McP
	<i>Plumeria turberculata</i> Lodd.	lirio de costa	Nat	N-McP
	<i>Rauvolfia ligustrina</i> Willd. ex Roem. & Schult.	frutillo	Nat	Np
	<i>Rauvolfia nitida</i> Jacq.	huevo de gallo	Nat	Mc-MsP
	<i>Rauvolfia tetraphylla</i> L.	palo boniato	Nat	N-McP
	<i>Strempeliopsis strempelioides</i> (Griseb.) K. Schrum.	palo boniato	End	Np
	<i>Vallesia antillana</i> Woodson	palo boniato	Nat	N-McP
ARECAEAE	<i>Coccothrinax sagittifera</i> Borthidi et Muñiz		End	Ms-pros
	<i>Coccothrinax fragans</i> Burret		Nat	Ms-pros
	<i>Roystonea regia</i> (H.B.K.) O.F. Cook	palma real	Nat	Ms-pros
	<i>Aristolochia ringens</i> Vahl	galito, pitico, flor de pato	Nat	LH
ARISTOLOCHIACEAE	<i>Aristolochia elegans</i> Mast	flor de pato	Nat	LH
ASCLEPIADACEAE	<i>Asclepias curassavica</i> L.	flor de calentura	Nat	Th
	<i>Asclepias nivea</i> L.	flor de calentura blanca	Nat	Th
	<i>Calotropis procera</i> (Aiton) R. Br.	algodón de seda	Int	N-McP
	<i>Cynanchum brachystephnum</i> (Griseb.) Alain		End	LP
	<i>Cynanchum caribaeum</i> Alain		Nat	LP
	<i>Cynanchum eggersii</i> (Schlr.) Alain		Nat	LP
	<i>Cynanchum graminifolium</i> (Griseb.) Alain		End	LP
	<i>Cynanchum penicillatum</i> (Griseb.) Alain		End	LP
	<i>Cynanchum pubipetalum</i> Alain		End	LP
	<i>Cynanchum urbanianum</i> (Schlt.) Alain		End	LP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Fischeria crispiflora</i> (Sw.) Schit.	curamagüey de costa	Nat	LP
	<i>Marsdenia clausa</i> R. Br.	curamagüey blanco	Nat	LP
	<i>Marsdenia satunaejaefolia</i> A. Rich.		Nat	LP
	<i>Matelea alainii</i> Voods		End	Np
	<i>Oxypetalum cordifolium</i> (Vent.) Schlecht.		Nat	LP
	<i>Sarcostemma clausum</i> (Jacq.) Roem. & Schult.	bejuco revienta chivo	Nat	LP
	<i>Acanthospermum humile</i> (Sw.) DC.	pinedo, abrojo, quita zapato	Nat	Th
	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	celestina azul	Nat	Th
	<i>Ambrosia hispida</i> Pursh	carguesa	Nat	Th
	<i>Baccharis dioica</i> Vahl	romerillo	Nat	Th
	<i>Bidens pilosa</i> L. var. <i>pilosa</i>	romero de playa	Nat	Np
	<i>Borreria arborescens</i> (L.) DC.		Nat	Np
	<i>Chaptalia dentata</i> (L.) Cass		Nat	N-McP
	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) King & Robins.	rompezara-güey	Nat	N-McP
	<i>Chromolaena sinuata</i> (Lam.) King & Robins.	rompezara-güey	Nat	Np
	<i>Cirsium mexicanum</i> DC.	cardo, serrucho	Nat	Np
	<i>Critonia aromatisans</i> (DC.) King & Robins.	trébol de olor	Nat	N-McP
	<i>Elephantopus scaber</i> L.	lengua de vaca	Nat	Th
	<i>Gochmania calcicola</i> (Britton)	cordobancillo	End	Np
	<i>Gochmania ilicifolia</i> Less		Nat	Np
	<i>Gochmania microcephala</i> (Griseb.) Jervis et Alain var. <i>microcephala</i>		Np	
	<i>Iva cheiranthifolia</i> H.B.K.	artemisa de playa	Nat	Np

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Iva imbricata</i> Walt.		Nat	Th
	<i>Koanophyllum helianthemoideus</i> (B.L. Robins.) King & Robins.		End	Np
	<i>Koanophyllum villosum</i> (Sw.) King & Robins.	albahaca de sabana	Nat	N-McP
	<i>Neuroleena lobata</i> (L.) Cass.	salvia, victoriana	Nat	N-McP
	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	artemisa, confitillo	Nat	Th
	<i>Pectis cubensis</i> (A. Rich.) Griseb.	romero cimarrón	End	Th
	<i>Pluchea carolinensis</i> (Jacq.) G. Don	salvia de playa	Nat	N-McP
	<i>Pseudaelephantopus spicanus</i> (Aubl.) Gleason	lengua de vaca	Nat	Th
	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	trentanueces	Nat	Th
	<i>Tridax procumbens</i> L.	romerillo	Nat	LH
	<i>Vernonia gnaphaliifolia</i> A. Rich.		Np	
	<i>Vernonia cinerea</i> (L.) Less		Nat	Th
	<i>Vernonia complicata</i> Griseb.		End	Np
	<i>Vernonia corallophila</i> Gleas		End	Th
	<i>Vernonia menthaefolia</i> (Poep. Ex Spreng.) Less.	mangle prieto	End	N-McP
	<i>Avicennia germinans</i> (L.) Stearn.		Nat	McP
AVICENNIACEAE	<i>Distictis gnaphalantha</i> (A. Rich.) Urb.		End	LP
BIGNONIACEAE	<i>Distictis rhynchosarpa</i> Urb.	bejuco lagarti	End	LP
	<i>Jacaranda coerulea</i> (L.) Griseb.		Nat	Mc-MsP
	<i>Macrocalympha punctata</i> Britt.	roblillo, roble de olor	Nat	McP
	<i>Spirostoma spiralis</i> (Wr. Ex Griseb.) Pichon	roble yanilla	End	N-McP
	<i>Synapsis ilicifolia</i> Griseb.	chicharrón	End	McP
	<i>Tabelouia affinis</i> Britt. & Alain	roble blanco	End	N-McP
	<i>Tabelouia anisophylla</i> Urb.		End	N-McP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Tabebuia arenicola</i> Britt.	roble de playa	End	McP
	<i>Tabebuia jaucensis</i> Bisse		End	McP
	<i>Tabebuia myrtifolia</i> (Griseb.) Britt.		End	McP
	<i>Tabebuia petrophila</i> Greenm		End	N-McP
	<i>Tabebuia polymorpha</i> Urb.		End	N-McP
	<i>Tecoma stans</i> (L.) H.B.K.	sauco amarillo	Nat	McP
BOMBACACEAE	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn,	ceiba	Nat	Mc-MsP
BORAGINACEAE	<i>Bourreria setosa-hispida</i> O. E. Schulz		End	N-McP
	<i>Bourreria ovata</i> Miers.		Nat	N-McP
	<i>Bourreria taylorii</i> Britt.		End	McP
	<i>Bourreria virgata</i> (Sw.) G. Don	raspalengua	Nat	N-McP
	<i>Cordia angiocarpa</i> A. Rich.	roble ateje	End	McP
	<i>Cordia curbeloi</i> Alain	ateje blanco	End	N-McP
	<i>Cordia galeottiana</i> A. Rich	anacahuita	End	N-McP
	<i>Cordia leucosebastena</i> Griseb.		End	N-McP
	<i>Cordia pulverulenta</i> (Urb.) Alain	vomitel colorado	End	McP
	<i>Cordia sebestena</i> L.		Nat	McP
	<i>Cordia triangularis</i> Urb.	roblo prieto	End	Np
	<i>Ehretia tinifolia</i> L.	uvita, ateje	Nat	MsP
		amarillo	Nat	McP
	<i>Gerascanthus albiflora</i> (Jacq.) Borhidi Mattos	varia	Nat	MsP
	<i>Gerascanthus collococcus</i> (L.) Boro.	ateje	Nat	Mc-MsP
	<i>Gerascanthus gerascanthoides</i> (H.B.K.) Borhidi	varia	Nat	Mc-MsP
	<i>Heliotropium curassavicum</i> L.	alacrancillo de playa	Nat	Th

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
ACANTHACEAE	<i>Apassalus cubensis</i> (Urban) Kobuski		End	Th
	<i>Barleriola saturejooides</i> (Griseb.) Mazza		End	Np
	<i>Barleriola solanifolia</i> (L.) Oerst. ex Lindau		Nat	Np
	<i>Dicliptera vahliana</i> Nees	gallitos	Nat	Th
	<i>Drejerella calicicola</i> Urb.		End	Th
	<i>Drejerella origanoides</i> (Nees) Lindau		End	Th
	<i>Drejerella maestrensis</i> Urb.		End	Th
	<i>Oploania tetrasicha</i> (Wr. ex Griseb.) Stearn.	no me toques	End	Np
	<i>Oploania tetrasicha</i> (Wr. ex Griseb.) Stearn. ssp. <i>polyceae</i>		End	Np
	<i>Stenandrium crenatum</i> Urb.		End	Th
AGAVACEAE	<i>Stenandrium scabrosum</i> (Sw.) Nees		Nat	Th
	<i>Ruellia tuberosa</i> L.		Nat	SP
	<i>Agave albescens</i> Trelease		End	SP
	<i>Agave underwoodii</i> Trelease		End	SP
	<i>Furcraea hexapetala</i> (Jacq.) Urb.	pita magüey	Nat	SP
ALOACEAE	<i>Furcraea macrophylla</i> Baker	pita	Nat	SP
	<i>Aloe vera</i> L.	sábia	Int	SP
	<i>Sesuvium portulacastrum</i> L.	verdolaga de mar	Nat	Np
AIZOACEAE	<i>Triantema portulacastrum</i> L.	rabo de gato	Nat	Np
	<i>Achyranthes aspera</i> var. <i>aspera</i> L.		End	Np
	<i>Alternanthera axillaris</i> (Hornem.) D. Dietr.		Nat	Np
AMARANTHACEAE	<i>Alternanthera tenella</i> Coll.		Nat	Np
	<i>Alternanthera serpyllifolia</i> Urb.		Nat	Np
	<i>Amaranthus crassipes</i> Schidl.	bledo de clavo	Nat	Th
	<i>Amaranthus dubius</i> Mart. ex Thell	bledo	Nat	Th

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Catopsis nitida</i> Griseb.	end	Nat	Ech
	<i>Catopsis nutans</i> (Sw.) Griseb.	curujey	Nat	Ech
	<i>Guzmania lingulata</i> Mez	“curujey lengua de vaca”	Nat	Ech
	<i>Tillandsia argentea</i> Griseb.	curujey	Nat	Ech
	<i>Tillandsia balbisiana</i> Schult.	curujey	Nat	Ech
	<i>Tillandsia bulbosa</i> Hook.	curujey	Nat	Ech
	<i>Tillandsia fasciculata</i> Sw. var. <i>fasciculata</i>	curujey	Nat	Ech
	<i>Tillandsia flexuosa</i> Sweet	curujey flor de aire	Nat	Ech
	<i>Tillandsia polystachya</i> L.	curujey	Nat	Ech
	<i>Tillandsia recurvata</i> L.	curujey	Nat	Ech
	<i>Tillandsia setacea</i> Sw.	curujey	Nat	Ech
	<i>Tillandsia turquiniensis</i> Willinger & Michálek	End	Ech	
	<i>Tillandsia usneoides</i> L.	guajaca	Nat	Ech
	<i>Tillandsia utriculata</i> L.	curujey	Nat	Ech
	<i>Tillandsia valenzuelana</i> A. Rich.	“curujey”	Nat	Ech
	<i>Bursara simaruba</i> (L.) Sargent.	almácigo	Nat	Mc-Msp
	<i>Commiphora glauca</i> (Griseb.) Moncada Ferrera	almacigullo	End	Mc-Msp
	<i>Buxus glomerata</i> Muell. Arg.	pití	Nat	N-Mcp
	<i>Consolea macracantha</i> (Griseb.) Berger	tuna de cruz	End	SP
	<i>Cylindropuntia tunicata</i> (Lehm.) Knuth	patana	Nat	SP
	<i>Dendrocereus nudiflorus</i> (Engelm.) Britt. & Rose	flor de copa	Nat	SP
	<i>Harrisia eriophora</i> (Pfeiff.) Britt.	jijira	End	SP
	<i>Hylocereus undatus</i> (Haw.) Britt. & Rose	flor de cáliz	Nat	LH
	<i>Lepiocereus maximiliani</i> Britt. & Rose	End	SP	SP
	<i>Melocactus harlowii</i> (Britt. & Rose) León	melón de costa	End	Sch

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Opuntia stricta</i> (Haw.) Haw. var. <i>dillenii</i> (Ker Gawl.) L.D. Benson	tuna	Nat	SP
	<i>Pilosocereus brooksianus</i> (Vaupel) Byles & Rowley	jitira	Nat	SP
	<i>Rhipsalis baccifera</i> (J.S. Muell.) Stearn.	disciplinilla	Nat	EP
	<i>Pereskia zinniiflora</i> De Candolle	abrojo	Nat	SP
	<i>Ritterocereus hisprix</i> (Haw.) Backeb.	cardón	Nat	SP
	<i>Selenicereus urbanianus</i> (Gurke & Weing.) Britt. & Rose	pitahaya	Nat	LH
	<i>Cassia emarginata</i> L.	carbonero	Nat	McP
	<i>Caesalpinia bahamensis</i> Lam.	brasilete	Nat	N-McP
	<i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb.	guacalote cenizo	Nat	LP
	<i>Caesalpinia coriaria</i> (Jacq.) Willd.	dividivi	Nat	Np
	<i>Caesalpinia pauciflora</i> (Griseb.) C. Wright	falso brasilete	Nat	Np
	<i>Caesalpinia subglauca</i> Britt.	tambalisa	End	Np
	<i>Caesalpinia vesicaria</i> L.	Brasil	Nat	N-McP
	<i>Caesalpinia violacea</i> (Mill.) Standl	yarúa	Nat	N-McP
	<i>Delonix regia</i> (boj. Ex Hook) Raf.	framboyán	Int	Mc-MsP
	<i>Haematoxylon campechianum</i> L.	palo campeche	Nat	McP
	<i>Senna atomaria</i> (L.) Irwin & Barneby	cañafistula	Nat	N-McP
	<i>Senna obtusifolia</i> (L.) Irwin & Barneby	cimarrona	Nat	
	<i>Senna occidentalis</i> (L.) Link	guanina	Nat	Th
	<i>Senna uniflora</i> (L.) Irwin & Barneby	hierba hedionda	Nat	Th
	<i>Tamarindus indica</i> L.	guanina	Nat	Np
CANELLACEAE	<i>Canella winterana</i> (L.) Gaertn	tamarindo	Nat	MsP
CAPPARACEAE	<i>Capparis cynophallophora</i> L.	cúrbana	Nat	Mc-MsP
	<i>Capparis ferruginea</i> L.	mostacilla	Nat	Mc-MsP
		olivo	Nat	McP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
CLEOMACEAE	<i>Capparis flexuosa</i> L.	palo barba de indio	Nat	McP
CASUARINACEAE	<i>Cleome spinosa</i> Jacq.	volantín	Nat	Th
CECROPIACEAE	<i>Cleome viscosa</i> L.	volantín viscoso	Nat	Th
	<i>Casuarina equisetifolia</i> J. R. & G. Forst.	casuarina	Int	Mc-Msp
	<i>Cecropia peltata</i> L.	yagrumo	Nat	Mc-Msp
	<i>Cassine xylocarpa</i> Vent var. <i>attenuata</i> (A. Rich.) Kuntze		Nat	Mc-Msp
CELASTRACEAE	<i>Crossopetalum aquifolium</i> (Griseb.) As. Hitchc	jinca pata	Nat	Np
	<i>Crossopetalum rhacomia</i> Hitchc		Nat	McP
	<i>Maytenus buxifolia</i> Griseb	cana de vaca	Nat	N-McP
	<i>Maytenus elaeodendroides</i> Griseb.	sangre de toro	End	N-McP
	<i>Maytenus phyllanthoides</i> Benth	verdolaga	Nat	N-McP
	<i>Schaefferia efedroides</i> Urb.		Nat	N-McP
CLUSIACEAE	<i>Clusia rosea</i> Jacq.	copey espuela de rey	Nat	McP
	<i>Garcinia ruscifolia</i> Griseb.		Nat	MsP
	<i>Garcinia fruticosa</i> (Wr.) A. Borbidi		Nat	Np
COMBRETACEAE	<i>Conocarpus erectus</i> L. var. <i>erectus</i>	mangle de fondo	Nat	MsP
	<i>Conocarpus erectus</i> L. var. <i>sericea</i> Forst ex DC.	mangle de fondo	Nat	MsP
	<i>Laguncularia racemosa</i> Gaertn. f.	mangle blanco	Nat	MsP
COMMELINACEAE	<i>Commelina diffusa</i> Burm.F.	canutillo	Nat	Th
	<i>Commelina erecta</i> L.	canutillo	Nat	Th
CONVOLVULACEAE	<i>Evolvulus arboreus</i> Poir. var. <i>arboreus</i>	tebenque	Nat	Np
	<i>Evolvulus arboreus</i> Poir. var. <i>canus</i> (Ooststr.) H. Maniz	tebenque	Nat	Np
	<i>Ipomoea acuminata</i> (Vahl.) Roem & Schult.	aguinaldo morado	Nat	LP

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Ipomea alba</i> L.	flor de Y	Nat	LP
	<i>Ipomea carolinina</i> L.	bejuco de indio	Nat	LP
	<i>Ipomea cubensis</i> (House) Urb.		End	LP
	<i>Ipomea heredifolia</i> L.	cambustera de hojas anchas	Nat	LP
	<i>Ipomea incerta</i> (Britton) Urb.		End	LP
	<i>Ipomea mutabilis</i> Ker Gawl.		Nat	LP
	<i>Ipomea pes-caprae</i> (L.) R. Br.	boniato de playa	Nat	LP
	<i>Ipomea stolonifera</i> J. F. Gmel	boniato de playa	Nat	LP
	<i>Ipomea tiliacea</i> (Willd.) Choisy	bejuco marrullero	Nat	LP
	<i>Ipomea trifida</i> (H.B.K.) D. Don	marrullero	End	LP
	<i>Ipomea triloba</i> L.	aguinaldo marrullero	Nat	LP
	<i>Ipomea tuba</i> (Schlcht.) G. Don	flor de Y	Nat	LP
	<i>Jacquemontia havanensis</i> (Jacq.) Urb.		Nat	Np
	<i>Jacquemontia jamaicensis</i> (Jacq.) Hall. F.		Nat	Np
	<i>Jacquemontia nodiflora</i> G. Don		Nat	Np
	<i>Jacquemontia pentanthia</i> (Jacq.) G. Don.		Nat	LP
	<i>Jacquemontia verticillata</i> (L.) Urb	aguinaldo velludo	Nat	LP
	<i>Merremia aegyptia</i> (L.) Urb.	aguinaldo de almendra	Nat	Np
	<i>Merremia cissoides</i> (Lam.) Hall. F.	aguinaldo de almendra	Nat	LP
	<i>Merremia dissecta</i> (Jacq.) Hall. F.	aguinaldo de almendra	Nat	Np
	<i>Merremia quinquefolia</i> (L.) Hall. F.	aguinaldo amarillo	Nat	LP
	<i>Merremia umbellata</i> (L.) Hall. F.	aguinaldo de pascuas	Nat	LP
	<i>Turina corymbosa</i> (L.) Raf.			

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
CUCURBITACEAE	<i>Cayaponia racemosa</i> (Sw.) Cogn. <i>Cucumis dipsacus</i> Ehrenb. Ex Spach. <i>Melothria pendula</i> L.	brionia pepino cimarrón cundeamor	Nat Nat Nat	LP NP LH
CUSCUTACEAE	<i>Monordica charantia</i> L. <i>Psiguria pedata</i> (L.) Howard <i>Cuscuta americana</i> L.	pepino cimarrón fideillo	Nat Nat	LH LH
CYPERACEAE	<i>Scleria lithosperma</i> (L.) Sw. <i>Scleria</i> sp.	fideillo	Nat	Th
DILLENIACEAE	<i>Tetracera volubilis</i> L.	Th	Th	Th
DIOSCOREACEAE	<i>Rajania wrightii</i> (Uline ex R.) Knuth	bejuco guará	Nat	LP
EBENACEAE	<i>Diospyros crassinervis</i> (Krug & Urb.) Standl. <i>Diospyros grisebachii</i> (Hiern.) Standl. <i>Diospyros halesioides</i> Griseb.	mame cimarrón ébano carbonero ébano real ébano blanco	Nat Nat End End	LP N-McP McP N-McP
ELAEOCARPACEAE	<i>Muntingia calabura</i> L.	capuli	Nat	McP
EUPHORBIACEAE	<i>Acalypha alopecuroides</i> Jacq. <i>Acidocroton lobulatus</i> Urb. <i>Acidocroton oligostemon</i> Urb. <i>Adelia ricinella</i> L.	rabo de gato rompe ropa jía platado	Nat Th End Nat	Th N-McP LP McP
Argythamnia	<i>Argythamnia candicans</i> Sw. var. <i>candicans</i> <i>Argythamnia candicans</i> Sw. var. <i>serratifolia</i> Urb.	platado	Nat	NP
Bernardia	<i>Bernardia dichotoma</i> (Willd.) Muell. Arg.	platado	End	NP
Bonania	<i>Bonania cubana</i> A. Rich. <i>Bonania elliptica</i> Urb.	caepul filigrana de costa	End End	N-McP NP
Bonania	<i>Bonania microphylla</i> Urb.	espinode costa	End	NP
Chamaesyce	<i>Chamaesyce baxifolia</i> (Lam.) Small	leche marina	Nat	Th

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Chamaesyce crassinodus</i> (Urb.) Millsp.	lechera	End	Th
	<i>Chamaesyce hirta</i> (L.) Millsp.	hierba de la niña	Nat	Th
	<i>Chamaesyce hypericifolia</i> (L.) Millsp.	hierba de la niña	Nat	Th
	<i>Chamaesyce hyssopifolia</i> (L.) Small	hierba de la niña	Nat	Th
	<i>Chamaesyce prostrata</i> (Ait.) Small	hierba de la niña	Nat	Th
	<i>Chamaesyce torralbasii</i> (Urb.) Millsp.	Nat	Np	
	<i>Croton betulinus</i> Vahl	guásima roja	Nat	McP
	<i>Croton corylifolius</i> Lam.	romero de costa	Nat	
	<i>Croton linearis</i> Jacq.	frailecillo	End	Np
	<i>Croton litoralis</i> Urb.	cimarrón	Nat	
	<i>Croton lobatus</i> L.	cuabilla	Th	
	<i>Croton lucidus</i> L.	Nat	N-McP	
	<i>Croton myricifolius</i> Griseb.	End	Np	
	<i>Croton pachysepalus</i> Griseb.	Nat	Np	
	<i>Croton rosmarinoides</i> Millsp.	Nat	Np	
	<i>Croton sagraeanus</i> Muell. Arg.	aceitillo	End	Np
	<i>Croton stenophylloides</i> Griseb.	clavellina	End	N-McP
	<i>Croton tenuiramus</i> Urb.	Nat	LH	
	<i>Dalechampia scandens</i> L.	hierba lechosa	Nat	
	<i>Euphorbia heterophylla</i> L.	yaiti	Nat	McP
	<i>Gymnanthes lucida</i> Sw.	Nat	Np	
	<i>Hura crepitans</i> L.	Nat	Np	
	<i>Jatropha gossypijifolia</i> L.	frailecillo	Nat	
	<i>Lasiocroton bahamensis</i> Pax & Hoffm.	cuba jatía	McP	
	<i>Lasiocroton gracilis</i> Britt. & Wils.	End	McP	
	<i>Omphalea trichotoma</i> Muell. Arg.	huevo de perro	End	N-McP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Phyllanthus epiphyllanthus</i> L.	panetela	Nat	N-McP
	<i>Phyllanthus glabellus</i> (L.) Fawc. & Rendle		Nat	N-McP
	<i>Phyllanthus pruinosis</i> Poepp.		Nat	Th
	<i>Picrodendron baccatum</i> (L.) Krug. & Urb.	yana prieta	Nat	McP
	<i>Savia bahamensis</i> Britt.	hoja redonda	Nat	McP
	<i>Savia sessiflora</i> (Sw.) Willd	ahorca jíbaro	Nat	McP
	<i>Securinega aciculocrotan</i> (L.) Fawc. & Rendle		Nat	N-McP
	<i>Tragia hexandra</i> Jacq.	ortiguilla, ortiga, ortigon	End	LP
	<i>Tragia volubilis</i> L.	candellilla	Nat	LH
	<i>Erythroxylum cf. alaternifolium</i> A. Rich	arabo prieto, arabillo	End	N-McP
ERYTHROXYLACEAE	<i>Erythroxylum areolatum</i> L.	jiba macho	Nat	N-McP
	<i>Erythroxylum confusum</i> Britt.	arabo	Nat	McP
	<i>Erythroxylum havanense</i> Jacq.	jiba	End	N-McP
	<i>Erythroxylum minutifolium</i> Griseb.	sibanicú piedra	Nat	N-McP
	<i>Erythroxylum rotundifolium</i> Lunan	arabillo	Nat	McP
	<i>Abrus precatorius</i> L.	peonia	Nat	LP
FABACEAE-FABOIDAE	<i>Aeschynomene americana</i> L. var <i>americana</i>	tamarindo	Nat	Np
	<i>Alysicarpus vaginalis</i> (L.) DC.	mani cimarrón	Nat	Th
	<i>Andira inermes</i> (Sw.) H.B.K.	yaba	Nat	McP
	<i>Ateleia cubensis</i> Griseb.	rala de gallina	Nat	N-McP
	<i>Brya ebenus</i> (L.) DC.	granadillo de sabana	Nat	McP
	<i>Calopogonium caeruleum</i> (Benth) Wright ex Sauvage	jícama dulce	Nat	LH
	<i>Canavalia maritima</i> Thou	mate de costa	Nat	LH

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Centrosema plumieri</i> (Turb.) Benth	bejuco de chivo	Nat	LP
	<i>Centrosema pubescens</i> Benth	azulado	Nat	LP
	<i>Centrosema virginianum</i> (L.) Benth.		Nat	LP
	<i>Clitonia ternata</i> L.		Nat	LP
	<i>Clitonia rubiginosa</i> Juss. ex Pers	garbancillo	Nat	Th
	<i>Crotalaria incana</i> L.	maromera	Nat	Th
	<i>Crotalaria retusa</i> L.	cascabelillo	Nat	Th
	<i>Crotalaria verrucosa</i> L.	bejuco serná	Nat	N-McP
	<i>Dalbergia brownei</i> (Jacq.) Urb.	amor seco	Nat	Th
	<i>Desmodium axillare</i> (Sw.) DC.		Nat	Th
	<i>Desmodium distortum</i> (Aubl.) Macbr.		Nat	Th
	<i>Desmodium incanum</i> DC.	empanadilla	Nat	Th
	<i>Desmodium tortuosum</i> (Sw.) DC.	amor seco	Nat	Th
	<i>Desmodium triflorum</i> (L.) DC	amor seco	Nat	Th
	<i>Galactia cuneata</i> Alain	End	Np	LP
	<i>Galactia monophylla</i> Griseb.		Nat	LP
	<i>Galactia parvifolia</i> A. Rich.		Nat	Np
	<i>Galactia rudolphioides</i> (Griseb.) Benth & Hook		Nat	Np
	<i>Galactia striata</i> (Jacq.) Urb.	añil azul,	Nat	Np
	<i>Indigofera suffruticosa</i> Miller	añil	Nat	Np
	<i>Indigofera tinctoria</i> L.		Nat	Np
	<i>Indigofera trita</i> L. ssp. <i>scabra</i> (Roth) De Kort & Thijssse	añil	Nat	Np
	<i>Lonchocarpus longipes</i> Ur. & Ekman	guamá prieto	Nat	McP
	<i>Macropitium lathyroides</i> (L.) Urban	pico de aura	Nat	Th
	<i>Mucuna urens</i> (L.) Fawcett & Rendle	ojo de buey	Nat	LP
	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	frijol caballero	Nat	LP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Pictetia mucronata</i> (Griseb.) Beyra & Lavin	yamaquey negro	End	N-McP
	<i>Pictetia marginata</i> C. Wright	yamaguey de tres hojas	End	Np
	<i>Pictetia spinosa</i> (A. Rich) Beyra & Lavin	yamaquey de loma	End	N-McP
	<i>Rhynchosia minima</i> (L.) DC.	peonia chica	Nat	LP
	<i>Rhynchosia pyramidalis</i> (Lam.) Urban	peonia criolla	Nat	LP
	<i>Rhynchosia reticulata</i> (Sw.) DC.	peonia blanca	Nat	LP
	<i>Sophora tomentosa</i> L.	tambalisa	Nat	Np
	<i>Stizolobium pruriens</i> (L.) Medik	pica pica	Nat	LH
	<i>Stylosanthes hamata</i> (L.) Taubert	barbesco	Nat	Th
	<i>Tephrosia cinerea</i> (L.) Pers	barbesco	Nat	Th
	<i>Tephrosia senna</i> H.B.K.		Nat	Th
	<i>Teramnus labialis</i> (L. f.) Spreng	cresta de gallo	Nat	LP
	<i>Teramnus uncinatus</i> Sw.	blanca	Nat	LP
	<i>Banara minutiflora</i> (A. Rich) Sleumer		Nat	N-McP
	<i>Casearia aculeata</i> Jacq.	Jia brava	Nat	N-McP
	<i>Casearia nitida</i> (L.) Jacq.		Nat	N-McP
	<i>Casearia emarginata</i> C. Wright ex Griseb		Nat	Np
	<i>Casearia guianensis</i> (Aubl.) Urb.	raspalengua, jía amarilla	Nat	McP
	<i>Casearia spinescens</i> (Sw.) Griseb.	jía prieta	Nat	N-McP
	<i>Casearia sylvestris</i> Sw. subsp. <i>sylvestris</i> Sw.	samilla	Nat	N-McP
	<i>Prockia crucis</i> P. Browne ex L.	guasimilla	Nat	McP
	<i>Samyda ramossima</i> (C. Wright ex Griseb) J.Urb.		End	N-McP
	<i>Xylosma buxifolia</i> A. Gray	hueso de costa	Nat	N-McP
	<i>Xylosma infesta</i> Griseb.	hueso espinoso	End	Np
FLACOURTIACEAE				

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
GESNERIACEAE	<i>Bellonia spinosa</i> Sw. <i>Rhytidophyllum acunae</i> Morton <i>Rhytidophyllum intermedium</i> Urb. & Ekm.		Nat End End	N-McP Np Np
GOODENIACEAE	<i>Scaevola plumieri</i> Blume	salvilla, boca de león	End	Np
HIPPOCRATEACEAE	<i>Hippocratea volubilis</i> L.	bejuco de vieja	Nat	Np
LAURACEAE	<i>Cassytha filiformis</i> L.	bejuco de fideo	Nat	LP
LAMIACEAE	<i>Hypisia americana</i> (Poir.) Briq.	salvia marina	Nat	LH
LOGANIACEAE	<i>Hypisia pectinata</i> (L.) Poit. <i>Spigelia anthelmia</i> L.	almucena	Nat	Np
MALPIGHIACEAE	<i>Bunchosia emarginata</i> Acuña & Roig <i>Banisteria pauciflora</i> (H.B.K.) C. B. Robs. <i>Heteropteris laurifolia</i> (L.) A. Juss. <i>Malpighia martiana</i> Acuña & Roig <i>Malpighia pallens</i> Small <i>Malpighia suberosa</i> Small <i>Malpighia linearis</i> Jacq.	icaquillo	End	Np
MALVACEAE s. str.	<i>Stigmaphyllon ledifolium</i> (H.B.K.) Small. <i>Stigmaphyllon periplocifolium</i> (Desv.) Juss. <i>Stigmaphyllon sagittatum</i> A. Juss. <i>Stigmaphyllon lineare</i> Wr. <i>Stigmaphyllon sericeum</i> Wr. <i>Tripteris rigida</i> Sw.	bejuco de tortuga	Nat	LP
MALVACEAE	<i>Abutilon hirium</i> (Lam.) Sw. <i>Abutilon indicum</i> (L.) Sweet <i>Abutilon permolle</i> (Willd.) Sweet	palo bronco	End	LP
		botón de oro	Nat	Np
		botón de oro	Nat	Np
			Nat	Np

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Abutilon umbellatum</i> (L.) Sweet	violeta	Nat	Np
	<i>Anoda acerifolia</i> (Zucc.) DC.		Nat	LH
	<i>Bastardia bivahis</i> (Cav.) Kunth ex Griseb.		Nat	Np
	<i>Bastardia viscosa</i> (L.) H.B.K.	escoba de bruja	Nat	LH
	<i>Gaya occidentalis</i> (L.) Sweet	boíón de oro	Nat	Np
	<i>Herissantia crispa</i> (L.) Brizicky	friega plato	Nat	Np
	<i>Hibiscus brasiliensis</i> L.	palo peregrino	Nat	Np
	<i>Hibiscus elatus</i> D.C.	majagua	Nat	MsP
	<i>Hibiscus clypeatus</i> L. ssp. <i>cryptocarpus</i> (A. Rich.) O. Blanchard	algodón de ratón	Nat	N-McP
	<i>Malvastrum americanum</i> (L.) Torrey	malva negra	Nat	Np
	<i>Malvastrum coronandelianum</i> (L.) Garcé	tabano	Nat	Np
	<i>Pavonia fruticosa</i> (Mill.) Fawc. & Rendle		Nat	Np
	<i>Pavonia heterostemon</i> Urb.		End	Np
	<i>Pavonia spinifex</i> (L.) Cav.	majagüilla de costa	Nat	N-McP
	<i>Sida acuta</i> Burm. F.	malva de caballo	Nat	Np
	<i>Sida ciliaris</i> L.	malva	Nat	Np
	<i>Sida cordifolia</i> L.		Nat	Np
	<i>Sida rhombifolia</i> L.	malva de cochino	Nat	Np
	<i>Sida urens</i> L.	malva peluda	Nat	Np
	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol ex Correa	majagua de la Florida	Nat	N-McP
	<i>Urena lobata</i> L.	malva blanca	Nat	Np
	<i>Wissadula amplissima</i> (L.) R. F. Fries		Nat	Np
	<i>Wissadula periplocifolia</i> (L.) Presl		Nat	McP
	<i>Cedrela odorata</i> L.	cedro	Nat	Nat
MELIACEAE				

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
MENISPERMACEAE	<i>Swiertenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	coba de Cuba	Nat	Mc-Msp
FABACEAE-	<i>Cissampelos pareira</i> L.	béjucu terciopelo	Nat	LP
MIMOSOIDAE	<i>Acacia chorophylla</i> Benth.	tamarindillo, frijolillo	Nat	McP
	<i>Acacia macracantha</i> H. & B. ex Willd.	guatapaná	Nat	McP
	<i>Acacia tortuosa</i> (L.) Willd.		Nat	N-McP
	<i>Acacia farnesiana</i> (L.) Willd.		Nat	N-McP
	<i>Acacia mescalococephala</i> Griseb.		Nat	LP
	<i>Albizia cubana</i> Britt. & Wilson	bacona	End	Mc-Msp
	<i>Albizia lebbeck</i> Benth.	aroma francesa	Int	Mc-Msp
	<i>Calliandra callettoides</i> Griseb.		Nat	Np
	<i>Cojoba arborea</i> (L.) Britt. & Rose	moruro rojo	Nat	Mc-Msp
	<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	adormidera	Nat	Th
	<i>Dichrostachys cinerea</i> Miq.	marabú, aroma africana	Int	N-McP
	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lam.) De Wit	aroma blanca	Int	N-McP
	<i>Lysiloma latisiliquum</i> (L.) Benth	sabicú	Nat	Mc-Msp
	<i>Lysiloma sabicu</i> Benth	sabicú	Nat	MsP
	<i>Mimosa pudica</i> L.	sensitiva, dormidera	Nat	Th
	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth	tamarindo chino o inga dulce	Int	McP
	<i>Prosopis juliflora</i> (Sw.) DC.	cambrón, algarrobo del	Nat	McP
	<i>Sphinga prehensilis</i> (C. Wright) Barneby & J. W. Grimes	Brasil, mezquite amorosa	Nat	Np

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Zapoteca formosa</i> (Kunth) H. M. Hern		Nat	McP
	<i>Zapoteca gracilis</i> (Griseb.) Bassler		Nat	McP
	<i>Chlorophora tinctoria</i> (L.) Gaudich. ex Benth	fustete	Nat	Mc-MsP
MORACEAE	<i>Ficus aurea</i> Nutt.	jagüey hembra	Nat	MsP
	<i>Ficus citrifolia</i> P. Mill.	jagüey	Nat	Mc-MsP
	<i>Ficus maxima</i> P. Mill.	jagüey macho	Nat	MsP
	<i>Ficus perforata</i> L.	jagüeicillo	Nat	Mc-MsP
	<i>Ficus trigonata</i> L.	jagüey	Nat	MsP
	<i>Trophis racemosa</i> (L.) Urb.	ramón	Nat	Mc-MsP
	<i>Calyptranthes pallens</i> (Poir.) Griseb.		Nat	McP
	<i>Eugenia ambiophylla</i> Urb.	guairaje	End	N-McP
	<i>Eugenia axillaris</i> (Sw.) Willd.		Nat	Mc-MsP
	<i>Eugenia cowelli</i> Britt. & Wils		End	Np
	<i>Eugenia floribunda</i> West		Nat	McP
	<i>Eugenia iteophylla</i> Krug & Urb.	guairaje, guairaje blanco	End	N-McP
	<i>Eugenia maleolens</i> Pers.		Nat	McP
	<i>Eugenia oonophylla</i> Urban		End	N-McP
	<i>Eugenia procera</i> (Sw.) Poir	mije	Nat	McP
	<i>Eugenia rhombaea</i> (Berg) Krug & Urb.	hoja menuda, pimienta	Nat	Mc-MsP
MYRTACEAE	<i>Myrcia citrifolia</i> (Aubl.) Urb.	cimarrona	End	N-McP
	<i>Myrtexmania adenoclada</i> Urb.	pimientica,	End	N-McP
	<i>Myrtexmania filipes</i> Urb.	limoncito		
	<i>Psidium guajava</i> L.	guayaba	Nat	McP

**Tabla 1.** Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
NYCTAGINACEAE	<i>Boerhaavia coccinea</i> L.	tostón, mata pavo	Nat	Np
	<i>Boerhaavia erecta</i> L.	tostón	Nat	Np
	<i>Commicarpus scandens</i> (L.) Standl.	bejuco de purgación	Nat	Np
	<i>Guapira discolor</i> (Spreng.) Britt.	barrehorno	Nat	Mc-MsP
	<i>Guapira obusata</i> (Jacq.) Little	sapo, macagüey	Nat	N-McP
	<i>Guapira rufescens</i> (Griseb.) Lundell var. <i>lanceolatus</i>	hilacho, H de Charrasco	End	N-McP
OLACACEAE	<i>Neea shafferi</i> Standl.		End	
	<i>Pisonia aculeata</i> L.	zarza, uña de gato	Nat	N-McP
	<i>Schoepfia chrysophylloides</i> (A. Rich.) Bewch	manzanilla	Nat	McP
OLEACEAE	<i>Ximenia americana</i> L.	ciruelillo, jíua	Nat	
	<i>Chionanthus bumeliae</i> (Griseb.) Stearn.	ramón de costa, jiquicillo	Nat	McP
ORCHIDACEAE	<i>Forestiera rhamnifolia</i> Griseb.	hueco blanco, careycillo	Nat	McP
	<i>Forestiera segregata</i> (Jacq.) Krug & Urb.	yanilla blanca	Nat	McP
	<i>Broughtonia lindenii</i> (Lindl.) Dressler	San Pedro	Nat	Eg-h
	<i>Vanilla dilloniana</i> Correll		Nat	Eg-h
PASSIFLORACEAE	<i>Passiflora berteriana</i> Balb.	pasionaria	Nat	LP
	<i>Passiflora cuprea</i> L.	sabey de costa	Nat	Np
	<i>Passiflora foetida</i> L.	pasionaria	Nat	LH
	<i>Passiflora holosericea</i> L.	hedionda	Nat	
		pasionaria	Nat	Np

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Passiflora multiflora</i> L.	fruta de perro, pasionaria vainilla	Nat	LP
	<i>Passiflora penduliflora</i> Bertero ex DC.	pasionaria	Nat	LH
	<i>Passiflora rubra</i> L.	pasionaria de cerca	Nat	LH
	<i>Passiflora santiagana</i> (Kilip.) Borhidi	pasionaria santaggera	End	LH
	<i>Passiflora suberosa</i> L.	huevo de gallo, meloncito	Nat	LH
PLUMBAGINACEAE	<i>Plumbago scandens</i> L.	malacara, pega pollo	Nat	LP
	<i>Rivina humilis</i> L.	coralito, ojo de ratón	Nat	NP
PHYTOLACCACEAE	<i>Trichostigma octandrum</i> (L.) H. Walt.	bejuco de canasta	Nat	LP
	<i>Picramnia pentandra</i> Sw.	agedita	Nat	McP
PICRAMNIACEAE	<i>Picrodendron macrocarpum</i> (A. Rich.) Britton	yamilla, yana	Nat	McP
	<i>Andropogon caucicus</i> L.	prieta	Int	Th
POACEAE	<i>Aristida ternipes</i> Cav.	espatillo, pelo de burro	Nat	Th
	<i>Bothriochloa pertusa</i> (L.) A. Camus	herba camagüeyana, hierba de línea	Nat	Th
	<i>Brachiaria fasciculata</i> (Sw.) Parodi	súbana	Nat	Th
	<i>Cenchrus brownii</i> Roem. & Schult.	guizazo	Nat	Th
	<i>Cenchrus echinatus</i> L.	guizazo, guizazo de perro	Nat	Th

**Tabla 1.** Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Chloris barbata</i> Sw.	barba de indio, pata de gallina	Nat	Th
	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	hierba fina, grama, bermuda	Nat	Th
	<i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Richt.	pata de gallina	Nat	Th
	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	pata de gallina, grama de caballo	Nat	Th
	<i>Glycerium sagittatum</i> Beauv.		Nat	Th
	<i>Leptochloa panicoides</i> (Retz.) Ohwi	plumilla	Nat	Th
	<i>Panicum maximum</i> Jacq.	herba de guinea	Int	Th
	<i>Rhynchosciurus repens</i> (Willd.) Hubbard	barba de indio	Int	Th
	<i>Setaria leonis</i> (Engelm.) León, comb. Nov.		Nat	Th
	<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.	espatillo, pitillo chico, alambillo	Nat	Th
	<i>Securidaca elliptica</i> Turcz.	maravedí	End	LH
	<i>Securidaca virgata</i> Sw.	bejuco verraco, maravedí, flor de cruz	Nat	LH
	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	coralillo, coralillo rosado	Int	LH
POLYGALACEAE	<i>Coccocloba diversifolia</i> Jacq.	uvilla, uverillo	Nat	McP
	<i>Coccocloba retusa</i> Griseb. Cat.	icaquillo, uvilla	End	McP
	<i>Coccocloba wifera</i> (L.) Griseb.	uva caleta	Nat	Mc-MsP
	<i>Portulaca oleracea</i> L.	verdolaga	Nat	Th
	<i>Portulaca phaeosperma</i> Urban	verdolaga	Nat	Th
	<i>Portulaca pilosa</i> L.	diez del día	Nat	Th

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Auerodendron cubense</i> (Britt. & Wilks.) Urb.	cocuyo de costa, grajo	End	McP
	<i>Auerodendron northropianum</i> (Urb.) Urb.	cocuyo noble, sangre toro	Nat	McP
	<i>Colubrina cubensis</i> (Jacq.) Brongn	bijáguara	Nat	N-McP
	<i>Colubrina elliptica</i> (Sw.) Brizicki & Stern.	jayajabico,	Nat	McP
	<i>Colubrina reclinata</i> Brongn	carbonero de costa	Nat	McP
	<i>Doerpfeldia cubensis</i> (Britton) Urb.	carbonero	Nat	MsP
RHAMNACEAE	<i>Gouania lupuloides</i> (L.) Urb.	bejuco leñatero, jaboncillo	End	McP
	<i>Krugiodendron ferreum</i> (Vahl) Urb.	carey de costa, palo del diablo	Nat	McP
	<i>Reynosia septentrionalis</i> Urb.		Nat	McP
	<i>Ziziphus havanensis</i> H.B.K. var. <i>bullata</i> (Urb.) M.C. Johnst.	bruja	End	LP
	<i>Ziziphus havanensis</i> H.B.K. var. <i>havanensis</i>	bruja, azofaifa de costa	End	McP
	<i>Ziziphus acutifolia</i> (Griseb.) M. C. Johnst	azofaifa de costa	End	Np
	<i>Ziziphus grisebachiana</i> M. C. Johnst	azofaifa de playa	End	LP
	<i>Ziziphus mauritiana</i> Lam.		Nat	Mc-MsP
	<i>Ziziphus obovata</i> (Urb.) M. C. Johnston	bruja de costa	End	N-McP
RHIZOPHORACEAE	<i>Rhizophora mangle</i> L.	mangle rojo	Nat	McP
RUBIACEAE	<i>Anirhea aristata</i> (Britt.) Urb.	chicharrón	End	McP
	<i>Anirhea lucida</i> (Sw.) Benth.	lloron, raízú, almorrana	Nat	Mc-MsP

**Tabla 1.** Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Casasia calophylla</i> A. Rich.	jicarita, rascabarriga	End	McP
	<i>Casasia clusiæfolia</i> (Jacq.) Urban	amarilla, guaya- cancillo de loma	Nat	McP
	<i>Catesbaea flaviflora</i> Urb.		End	McP
	<i>Catesbaea holocantha</i> Wr. ex Griseb.		End	N-McP
	<i>Catesbaea longispina</i> A. Rich.		End	LP
	<i>Catesbaea spinosa</i> L.	huevo de aura, huevo vegetal	Nat	N-McP
	<i>Chiococca alba</i> (L.) Hitchc.		Nat	N-McP
	<i>Diodia lippoides</i> Griseb.		End	Th
	<i>Diodia rigida</i> (Willd.) R. & S.	hierba de garro	Nat	Th
	<i>Diodia serrulata</i> (P. Beauv.) G. Taylor		Nat	Th
	<i>Diodia teres</i> Walt.		Nat	Th
	<i>Erithalis fruticosa</i> L.	cuaña prieta, vibona, jajabico	Nat	N-McP
	<i>Erithalis vacciniifolia</i> (Griseb.) Wr. ex Sauv.		Nat	N-McP
	<i>Ernodea littoralis</i> Sw.		Nat	Np
	<i>Exostema caribaeum</i> (Jacq.) Roem. & Schult.	lirio santana, cerillo, macagua de costa	Nat	LP
	<i>Exostema parviflorum</i> L. C. Rich. ex H. & B.		End	N-McP
	<i>Exostema spinosum</i> (Le Vavass) Krug & Urb.		End	Np
	<i>Exostema velutinum</i> Standl		End	McP
	<i>Guettarda brevimodis</i> Urb.		End	McP
	<i>Guettarda calyprata</i> A. Rich.		End	N-McP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Guettarda cueroensis</i> Britt.	guayabillo de costa	End	N-McP
	<i>Guettarda combisii</i> Urban		Nat	MsP
	<i>Guettarda coxiiana</i> Britt.	cuerpo duro, grosella de costa	End	N-McP
	<i>Guettarda rigida</i> A. Rich.		End	N-McP
	<i>Isidorea elliptica</i> Alain		End	Np
	<i>Machaonia microphylla</i> Griseb.		End	N-McP
	<i>Machaonia variifolia</i> Urb.		End	N-McP
	<i>Miracarpus sagraeanus</i> DC.		Nat	Th
		píñipíni, ruibarbo de la tierra, raíz de indio	Nat	Np
	<i>Morinda royoc</i> L.			
	<i>Phialanthus myrtilloides</i> Griseb.		Nat	N-McP
	<i>Psychotria revoluta</i> DC.	lengua de vaca	Nat	Np
	<i>Rachicallis americana</i> (Jacq.) Hitchc.	cubilla de costa	Nat	Np
	<i>Randia aculeata</i> L.	café cimarrón, agalla de costa	Nat	McP
	<i>Randia ciliolata</i> Wr. ex Sauv.		End	Np
	<i>Randia spinifex</i> (R. & S.) Standl.	agalla, espuela de caballero	End	N-McP
	<i>Rondeletia apiculata</i> Urban		End	N-McP
	<i>Rondeletia combsii</i> Greenm		End	N-McP
	<i>Rondeletia hypoleuca</i> Griseb.		End	Np
	<i>Rondeletia norlandii</i> Urb.		End	Np
	<i>Rondeletia rugelii</i> Urb.		End	N-McP

**Tabla 1.** Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
RUTACEAE	<i>Scolosanthus bahamensis</i> Britt. <i>Scolosanthus crucifer</i> Wr. ex Sauv.	hierba de garro, garro morado	Nat End	Np N-McP
	<i>Spermacoce assurgens</i> R & P		Nat	Th
	<i>Spermacoce dentiflora</i> (Uc) Alain		Nat	Np
	<i>Strumpfia maritima</i> Jacq.		Nat	Np
	<i>Terebraria resinosa</i> (Vahl) Sprague	palo rosa, lirio doce	Nat	McP
	<i>Amyris balsamifera</i> L.	cuba, C. blanca, C. de monte	Nat	N-McP
	<i>Amyris diatrypa</i> Spreng.	cubilla	Nat	McP
	<i>Amyris elemifera</i> L.	cuba amarilla de costa, C. de costa	Nat	Mc-MsP
	<i>Citrus aurantifolia</i> Swingle	limón criollo, lima mexicana	Int	McP
	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.	limón	Nat	McP
	<i>Murraya paniculata</i> (L.) Jack.		Nat	McP
	<i>Plethadenia cubensis</i> Urb.		End	Np
	<i>Plethadenia granulata</i> (Krug. & Urb.) Urban		Nat	Np
	<i>Zanthoxylum coriaceum</i> A. Rich.	ayuda, bravo	Nat	N-McP
	<i>Zanthoxylum elephantiasis</i> Macfd.	ayúa baría, bayúa, ayúa amarilla	Nat	Mc-MsP
	<i>Zanthoxylum fagara</i> (L.) Sargent	chivo, amoroso, aruña gato,	Nat	McP
	<i>Zanthoxylum martinicense</i> (Lam.) DC.	limoncillo		
		ayúa, ayúa macho, ayuda	Nat	MsP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
SAPINDACEAE	<i>Zanthoxylum pistaciifolium</i> Griseb.	bálsamo	End	Np
	<i>Allophylus cominia</i> (L.) Sw.	palo de caja	Nat	McP
	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L. var. <i>halicacabum</i>	farolito	Nat	LP
	<i>Cupania glabra</i> Sw. var. <i>glabra</i>	guara de costa, guarana, guara macho	Nat	Mc-MsP
	<i>Exotheca paniculata</i> (Juss.) Radlk.	yaicuaje, guamaca hueso de costa,	Nat	MsP
	<i>Hypelate trifoliata</i> Sw.	cuba de ingenio, vera	Nat	Mc-MsP
	<i>Melicoccus bijugatus</i> Jacq.	mamoncillo, anoncillo	Int	MsP
	<i>Paulinbia fuscescens</i> H.B.K.	bejuco de vieja, B. colorado	Nat	LP
	<i>Paulinbia pinnata</i> L.	azucarito	Nat	LP
	<i>Serjania atrolineata</i> Sauv.		Nat	LP
SAPOTACEAE	<i>Serjania crassinervis</i> Radlk		End	LP
	<i>Serjania diversifolia</i> (Jacq.) Radlk	bejuco colorado, bejuco baracoa	Nat	LP
	<i>Serjania subdentata</i> Juss.	bejuco de borrales, bejuco prieto	Nat	LP
	<i>Thouinia elliptica</i> Radlk.		End	N-McP
	<i>Thouinia patentinvris</i> Radlk		End	N-McP
SAPOTACEAE	<i>Thouinia pseudopunctata</i> Lippold		End	N-McP
	<i>Thouinia trifoliata</i> Poit.	negra cuba, canelillo, copalillo caimitillo	Nat	N-McP
SAPOTACEAE	<i>Chrysophyllum oliviforme</i> L		Nat	MsP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Pouteria aristata</i> (Britt. & Wils.) Baehni	chicharrón, chicharrón de costa	End	McP
	<i>Pouteria domingensis</i> (Gaertn. f.) Baechni	sapote culebra, siguapa	Nat	McP
	<i>Sideroxylon celastrinum</i> (Kunth) T.D. Penn.	zalamera	Nat	McP
	<i>Sideroxylon foetidissimum</i> Jacq. ssp. <i>foetidissimum</i>	jocuma, caguani	Nat	MsP
	<i>Sideroxylon horridum</i> (Griseb.) T.D. Penn.	jiquí espinoso	Nat	Np
	<i>Sideroxylon salicifolium</i> Gaertn. f.	cuya, almendrillo	Nat	MsP
SCROPHULARIACEAE	<i>Capraria biflora</i> L.	escabiosa	Nat	Th
	<i>Smilax havanensis</i> Jacq.	alambrillo, bejuco ñame	Nat	LP
	<i>Smilax lanceolata</i> L.	raíz de China	Nat	LP
SIMARUBACEAE	<i>Suriana maritima</i> Linn	cuabilla de costa	Nat	Np
SOLANACEAE	<i>Physalis angulata</i> L.	vejiga de perro, farolito, tomatillo	Nat	Th
	<i>Physalis pubescens</i> L.	vejiga de perro, farolito	Nat	Th
	<i>Physalis turbinata</i> Medik	farolito, tomatillo	Nat	Th
	<i>Solanum aculeatum</i> (Jacq.) O.E. Schulz		Nat	Np
	<i>Solanum antillarum</i> O. E. Schulz	ajicillo	Nat	Np
	<i>Solanum bahamensis</i> L.	ajicón	Nat	Np
	<i>Solanum didymcanthum</i> Mill.sp.		Nat	Np
	<i>Solanum erianthum</i> D. Don	pendeja macho, <i>P. hedionda</i>	Nat	N-McP
	<i>Solanum havanensis</i> Jacq.	lila, aji de China	Nat	Np
	<i>Solanum jamaicense</i> Mill.	ajicón	Nat	N-McP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
STAPHYLEACEAE	<i>Solanum nodiflorum</i> Jacq.	yerba mora	Nat	Np
	<i>Solanum polyacanthos</i> Lam.	pendejera	Nat	N-McP
	<i>Solanum torvum</i> Sw.	pendejera macho	Nat	N-McP
	<i>Solanum umbellatum</i> Mill.	sauco cimarrón	Nat	McP
	<i>Turpinia paniculata</i> Vent.		Nat	MsP
	<i>Ayenia velutina</i> Urb.		End	Np
	<i>Byttneria microphylla</i> Jacq.		Nat	LP
	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lam.	guásima, guásima de caballo	Nat	MsP
	<i>Helicteres jamaicensis</i> Jacq.	majagüilla de costa	Nat	N-McP
	<i>Helicteres semitriloba</i> Bertero	majagüilla de costa, taculo	Nat	N-McP
STERCULIACEAE	<i>Helicteres trapezifolia</i> A. Rich.	cuernecillo	End	Np
	<i>Melochia nodiflora</i> Sw.	malva colorada	Nat	N-McP
	<i>Melochia parvifolia</i> Fenzl		Nat	Np
	<i>Melochia pyramidata</i> L.	malva común,	Nat	Np
	<i>Melochia tomentosa</i> L.	malva de caballo	Nat	N-McP
THEACEAE	<i>Neoregnellia cubensis</i> Urb.	malva	Nat	Np
	<i>Waltheria indica</i> L.	malva blanca	Nat	Np
	<i>Ternstroemia parviflora</i> Krug & Urban	vigueta naranjo	End	N-McP
THEOPHRASTACEAE	<i>Ternstroemia peduncularis</i> DC.	copey vera	Nat	N-McP
	<i>Deherainia cubensis</i> (Radlk.) Mez	contraguaño	End	Np
	<i>Jacquinia aculeata</i> (L.) Mez	cimarrón espuela de caba- lero, E. de rey	End	Np

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Jacquinia brevifolia</i> (Griseb.) Urb.	espuela de caballero, rosellita de costa hueso	End Nat	McP Np
	<i>Jacquinia keyensis</i> Mez	espuela de caballero de costa, manajucillo	Nat	Np
	<i>Jacquinia stenophylla</i> Urb.			
	<i>Jacquinia verticillaris</i> Urb.			
	<i>Corchorus hirsutus</i> L.	malva blanca de costa, grénguere malva te, te de Tierra	Nat	Np
	<i>Corchorus siliquosus</i> L.	guizazo de cochino	Nat	Np
	<i>Triumfetta lappula</i> L.	guizazo, guizazo de caballo	Nat	Np
	<i>Triumfetta semirrioba</i> Jacq.			
	<i>Turnera diffusa</i> Wild.			
	<i>Turnera ulmifolia</i> L.	marilope	Nat	Np
	<i>Ampelocera cubensis</i> Griseb.	jatía blanca	Nat	McP
	<i>Celtis bertoiana</i> Urban	gallinasa	Nat	McP
	<i>Celtis iguanaea</i> (Jacq.) Sarg.	zarza blanca, uña de gato, baboyana, manca monte	Nat	LP
TURNERACEAE		ramón de costa,		
ULMACEAE		guasiriano, hueso, guanasa	Nat	Np
	<i>Phyllostylon brasiliensis</i> Capanema	jatía	Nat	McP

**Tabla 1.** Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
URTIACEAE	<i>Trema lamarckiana</i> (R. & S.) Blume	capuli cimarrón guasimilla, cimarrona, g. boba, capuli cimarrón ortiguilla	Nat Nat	McP McP
	<i>Trema micrantha</i> (L.) Blume			
VITACEAE	<i>Fleurya cuneata</i> (A. Rich.) Wedd. <i>Ampelocissus robinsonii</i> Panch.	bejuco ubi macho, ubi agrio	Nat Nat	Th LP
	<i>Cissus caustica</i> Juss.	bejuco ubi	Nat	LP
	<i>Cissus trifoliata</i> L.	parra cimarrona, bejuco de agua	Nat	LP
VERBENACEAE	<i>Cissus verticillata</i> (L.) Nicholson & C. E. Jarvis	verbena cimarrona	Nat	Np
	<i>Vitis tiliifolia</i> H. & B. ex Willd		End	Np
	<i>Bouchea prismatica</i> (L.) Kuntze var. <i>prismatica</i>		Nat	Np
	<i>Callicarpa bucheri</i> Mold.	filigrana	End	Np
	<i>Callicarpa cubensis</i> Urb. var. <i>cubensis</i>		Nat	Np
	<i>Callicarpa grisebachii</i> Urb.		End	Np
	<i>Citharexylum fruticosum</i> L. var. <i>fruticosum</i>	guayo blanco, pend, canilla de venado	Nat	Mc-Msp
	<i>Lantana arida</i> Britt.	addedica	Nat	N-McP
	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>camara</i>	filigrana	Nat	N-McP
	<i>Lantana insularis</i> Mold.	dama entre galanes	Nat	Np
	<i>Lantana involucrata</i> L.	filigrana cimarrona, te de costa	Nat	N-McP

Tabla 1. Continuación.

Familia	Nombre científico	Nombre vulgar	Status	Tipo biológico
	<i>Lantana microcephala</i> A. Rich.		Nat	Np
	<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Brigg.		Nat	N-McP
	<i>Lantana involucrata</i> L.		Nat	N-McP
	<i>Lantana reticulata</i> Pers.	orégano cimarrón	Nat	Np
	<i>Lantana trifolia</i> L.	filigrana de piña	Nat	Np
	<i>Lippia micromera</i> Shauer	oreganito, oreganillo	Nat	Np
	<i>Priya lappulacea</i> (L.) Pers	farolito, amor seco, pega pollo	Nat	Np
	<i>Pseudocarpidium avicinoides</i> (A. Rich.) Millsp.		End	McP
	<i>Pseudocarpidium ilicifolium</i> (A. Rich.) Millsp.	yanilla blanca, granadillo de costa	End	McP
	<i>Pseudocarpidium multidens</i> (Urb.) Mold.	chicharrón	End	McP
	<i>Pseudocarpidium wrightii</i> Millsp.	chicharrón	Nat	McP
	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl.	verbena azul	Nat	Np
VISCACEAE	<i>Vitex clementis</i> Britt. & Wils.	roble güero	End	N-McP
	<i>Vitex tomentulosa</i> Moldenke		End	N-McP
	<i>Phoradendron randidae</i> (Bello) Britt.		Nat	Eg-h
	<i>Guaiacum officinale</i> L.	guayacán, guayacán negro	Nat	McP
ZYGOPHYLLACEAE	<i>Kallstroemia maxima</i> (L.) T. & S.	abrojo, abrojo terrestre	Nat	Th
	<i>Tribulus cistoides</i> L.	abrojo	Nat	Th

**Tabla 2.** Lista de especies amenazadas de los Cerros Calizos Costeros de la Reserva de Biosfera Baconao. CR = En Peligro Crítico, EN = En peligro y VU = Vulnerable.

Especie	CR	EN	VU
<i>Albizia cubana</i> Britt. & Wilson		X	
<i>Bernardia dichotoma</i> (Willd.) Muell. Arg.		X	
<i>Coccothrinax fagildei</i> Borhidi et Muñiz		X	
<i>Consolea macracantha</i> (Griseb.) Berger			X
<i>Dendrocereus nudiflorus</i> (Engelm.) Britt. & Rose		X	
<i>Doerpfeldia cubensis</i> (Britton) Urb.	X		
<i>Drejerella maestrensis</i> Urb.			X
<i>Eugenia amblyphylla</i> Urb.		X	
<i>Eugenia iteophylla</i> Krug & Urb.		X	
<i>Jacquinia verticillaris</i> Urb.		X	
<i>Lasiocroton gracilis</i> Britt. & Wils.		X	
<i>Leptocereus maxonii</i> Britt. & Rose			X
<i>Melocactus harlowii</i> (Britt. & Rose) León		X	
<i>Pereskia zinniiflora</i> De Candolle		X	
<i>Pouteria aristata</i> (Britt. & Wils.) Baehni		X	
<i>Rondeletia apiculata</i> Urban		X	
<i>Rondeletia rugelii</i> Urb.		X	
<i>Synapsis ilicifolia</i> Griseb.	X		
<i>Tabebuia polymorpha</i> Urb.		X	
<i>Tillandsia bulbosa</i> Hook.			X
<i>Zanthoxylum coriaceum</i> A. Rich.	X		
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>4</b>