

Pioderma gangrenoso como primeira manifestação de doença sistémica

Gangrenous pyoderma as a first expression of systemic disease

Doente de 24 anos, assintomática do ponto de vista gastrointestinal, em que o diagnóstico de Doença de Chron (DC) ocorreu na sequência da investigação das doenças associadas ao Pioderma Gangrenoso (PG). O tratamento dirigido à DC melhora, habitualmente, o PG. Neste caso, optou-se pela corticoterapia sistémica, com resolução completa da dermatose. Verificou-se melhoria parcial das lesões intestinais, pelo que se optou por iniciar azatioprina 150 mg/dia, para melhor controlo da DC.

Bibliografia

1. Pioderma gangrenosum, www.uptodate.com [Jun 2013].
2. Bologna JL, Jorizzo JL, Rapini RP. Pyoderma gangrenosum. *Dermatology*. 2003;1:415-418.
3. Ahronowitz I, Harp J, Shinkai K. Etiology and management of pyoderma gangrenosum: a comprehensive review. *Am J Clin Dermatol*. 2012;13(3):191-211.
4. Callen JP. Pyoderma gangrenosum. *Lancet*. 1998;351:581-5.

Diagnóstico:

**Pioderma gangrenoso
associado a Doença de Chron**

Sara Estrela¹, Patrícia Santos²

¹Centro Hospitalar do Médio Tejo

²Hospital Divino Espírito Santo)

Correspondencia: saraestrela2@gmail.com

Como citar este artigo: Estrela S, Santos P

Pioderma gangrenoso associado a Doença de Chron. *Galicin Clin* 2016; 77 (3): 148

Recibido: 29/12/15; Aceptado: 03/02/16

Figura 1



Figura 2

