

## ARTIGO / ARTÍCULO / ARTICLE

## Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica) V: Arctiinae. (Lepidoptera: Erebidae).

Eliseo H. Fernández Vidal

Plaza de Zalaeta, 2, 5ºA. E-15002 A Coruña (ESPAÑA). e-mail: lisuco1@hotmail.com

**Resumen:** Se elabora un listado comentado y puesto al día de los árctidos (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) presentes en O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica), recopilando los datos bibliográficos existentes (para 18 especies) a los que se añaden otros nuevos como resultado del trabajo de campo del autor, alcanzando un total de 31 especies. Entre los nuevos registros aportados se incluyen tres primeras citas provinciales: *Apaudia mesogona* (Godart, [1824]) para Lugo y Ourense y *Eilema lutarella* (Linnaeus, 1758) para Lugo. Incluimos también nuevas citas de Arctiinae de otras localidades gallegas y aprovechamos para revisar un reciente catálogo de los de la Serra de Ancares (Lugo).

**Palabras clave:** Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, O Courel, Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica.

**Abstract:** Lepidoptera from O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) V: Arctiinae (Lepidoptera: Erebidae). An updated and annotated list of the tiger moths (Lepidoptera: Erebidae, Arctiinae) known to occur in O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) is made, compiling the existing bibliographic records (for 18 species) and reaching up to 31 species after adding new ones as a result of field work undertaken by the author. The new data reported include three first provincial records: *Apaudia mesogona* (Godart, [1824]) for Lugo and Ourense and *Eilema lutarella* (Linnaeus, 1758) for Lugo. New records of tiger moths from other localities from Galicia are also included, taking also this opportunity to review a recent catalog of which that occurs in the Serra de Ancares (Lugo).

**Key words:** Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, O Courel, Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula.

**Recibido:** 31 de diciembre de 2016

**Aceptado:** 8 de enero de 2017

**Publicado on-line:** 12 de enero de 2017

## Introducción

Los Arctiinae Leach [1815], considerados hasta hace menos de dos décadas una familia aparte entre los Noctuoidea, se han visto involucrados en una serie de cambios taxonómicos basados en análisis filogenéticos y moleculares muy bien compendiados en Yela & Zahiri (2011), que apenas han variado desde entonces en sus conclusiones. Actualmente se engloban en la familia Erebidae Leach, [1815] como una de sus subfamilias.

El conocimiento que se tiene sobre los Arctiinae de Galicia está compendiado en Fernández Vidal *et al.* (1992) en donde, aparte de ofrecer una sinopsis histórica, se comentan y catalogan 35 especies presentes en su territorio. A partir de entonces no se ha publicado ningún trabajo monográfico de cierta entidad sobre esta subfamilia en Galicia sino relaciones de las especies que pueblan determinadas áreas y enclaves (Fernández Vidal, 2010; Hiernaux *et al.*, 2010; Rodríguez de Rivera Ortega, 2010; Pino Pérez & Castro González, [2013]; etc.), pero sin que se dé a conocer la presencia de nuevas especies excepto *Eilema lutarella* (Linnaeus, 1758) en Fernández Vidal (2011), que no en Pino-Pérez *et al.* (2016) como se comentará más adelante, además se han añadido de forma sucesiva al catálogo de Galicia: *Setina cantabrica* Freina & Witt, 1985 en Fernández Vidal *et al.* (2003), *Watsonarctia casta* (Esper, 1784) en Ylla Ullastre *et al.* (2010) y Pino Pérez *et al.* (2010), *Dysauxes punctata* (Fabricius, 1781) en Pino-Pérez *et al.* (2011) y *Thaumatha senex* (Hübner, [1808]) en Pino-Pérez *et al.* (2016). Con tales datos queda el

catálogo de los Arctiinae de Galicia compuesto por 40 especies, el 57% de las que pueblan la Península Ibérica, 70 según Vives Moreno (2014), algunas de las cuales restringidas a contados enclaves pirenaicos, meridionales y levantinos.

En sólo tres títulos encontramos citas de las que pueblan O Courel: en Fernández Vidal *et al.* (1992), 9 especies; en Fernández Vidal *et al.* (2003), una más; y otras 9 en Rubio *et al.* (2016), una de las cuales ya lo estaba de dicha zona. En total, hasta ahora, estaba documentada la presencia de 18 especies de Arctiinae en O Courel (ver detalle y localidades en el listado específico del presente trabajo), poco más del 50% de las que pueblan Galicia y faltando por citarse algunas comunes por todo su territorio. A todas luces, debido a falta de trabajo de campo, un catálogo más ajustado a lo real estaba pendiente de hacerse, algo que subsanamos ahora si bien considerando que probablemente no sea completo.

Siguiendo con nuestra intención de dar a conocer todos los datos lepidopterológicos obtenidos personalmente en O Courel desde 1989, añadiendo los bibliográficos previos, según hemos expresado en Fernández Vidal (2016), elaboramos ahora la quinta entrega de esta serie, que comprende exclusivamente los Arctiinae. Aprovechamos además para reseñar nuevas citas de otras áreas de Galicia en caso de especies interesantes y escasamente citadas de su territorio.

## Material y método

---

Hemos examinado todo el material relacionado, que obra casi en su totalidad en la colección del autor extendido en cajas entomológicas o bien conservado en sobres y/o triángulos de papel con sus correspondientes datos de identificación y recolecta. Para evitar innecesarias reiteraciones obviamos indicar en su listado que todo es Eliseo H. Fernández Vidal *leg.*, si fue recolectado con anterioridad al año 2002, y Eliseo H. Fernández Vidal & Antonia Rodríguez Fandiño *leg.*, si lo fue con posterioridad a dicho año. Nuestras labores de recolecta estuvieron amparadas por los correspondientes permisos de la Xunta de Galicia desde que éstos se hicieron preceptivos.

Presentamos los resultados en forma de listado comentado según el siguiente esquema: 1º. Nombre y autoría específica. 2º. Indicación de que no existen citas bibliográficas previas para el área en estudio, o bien relación de las precedentes, ordenadas cronológicamente y reseñando localidades y/o localizaciones. 3º. Nuevas citas: las inéditas que aportamos en el presente trabajo, incluyendo relación de ejemplares examinados, localidades y/o localizaciones y fechas de recolección (por orden alfabético de lugares y cronológico de recolecta. 4º. Método de recolecta: de día con manga entomológica (d); de noche a las luces de edificaciones y/o alumbrado público (l); de noche con trampas lumínicas (t). 5º. Indicación, dado el caso, si el material no lo hemos conservado (desechado) por estar en mal estado (ds); y/o indicación del que dimos libertad *in situ* (ls). 6º. Indicación de si al menos uno de los ejemplares se ha determinado mediante análisis genital (g). 6º. Comentarios que procedan, incluyendo para algunas especies citas de otros lugares de Galicia.

En la nomenclatura taxonómica, adscripción genérica y ordenamiento específico seguimos a Ylla Ullastre *et al.* (2010). Obviamos toda indicación tribal y subgenérica. Para la determinación específica no nos ha sido necesario consultar bibliografía alguna salvo para la de algunos ejemplares dudosos de especies del género *Eilema* Hübner, 1819, que hemos identificado mediante examen genital (11 preparaciones que obran en la colección del autor). Para la corología hemos consultado la bibliografía al uso de la que, por lo prolijo, sólo reseñamos aquella en la que nos hemos basado puntualmente para la de determinadas especies, así como en sus correspondientes comentarios.

Aprovechamos oportunamente esta ocasión para comentar las inexactitudes y errores contenidos en los trabajos de Pino-Pérez *et al.* (2016), Rubio *et al.* (2016) y Ortiz *et al.* (2016) respecto a los Arctiinae de Galicia, lo que incluimos en los comentarios específicos si se trata de taxones presentes en O Courel, o bien en el apartado final (Conclusiones y comentarios) si no es así.

Al objeto de asegurar las primeras citas presentadas, hemos consultado presumiblemente toda la bibliografía concerniente a ártidos de Galicia, así como verificado la inexistencia de ninguna otra

disponible en versión on-line en Internet en la fecha de publicación del presente trabajo. Los datos geográficos de las localidades citadas en el texto se detallan en la Tabla I.

## Resultados

### *Paidia rica* (Freyer, [1858] 1855)

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Carbedo (*supra*): 1♂, 1-IX-2014 (t). Moreda: 1♀, 24-VII-2006 (l); 1♂, 29-VII-2006 (t); 1♂, 12-VIII-2006 (t). Seoane: 2♂♂, 24-VII-2006 (l); 1♂, 2-VIII-2008 (l).

### *Apaidia mesogona* (Godart, [1824])

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Seoane: 1♂, 2-X-2011 (l); 1♂, 29-IX-2016 (l).

En el primer mapa de distribución geográfica ibérica para esta especie (Gómez Bustillo, 1979: 198), calcado en Freina & Witt (1987: 621, mapa 24), se "mancha" hipotéticamente casi toda la provincia de Lugo y una pequeña zona septentrional coruñesa, algo que no estaba sustentado por ningún dato bibliográfico. En Pérez De-Gregorio *et al.* (2001: 177) se extiende su presencia a toda Galicia sin excepción territorial. En Ylla Ullastre *et al.* (2010: 38), se restringe su distribución galaica a una estrecha franja sudoriental orensana, lo mismo que se contempla en Gastón *et al.* (2013). Tal disparidad de criterios nos parece indicativa de falta de información fidedigna sobre su presencia en Galicia, de donde en realidad sólo existía hasta ahora una única cita (Fernández Vidal *et al.*, 1992), de A Carreira (A Coruña), que no se contempla en Ylla Ullastre *et al.* (2010.). Desde entonces, además de la localidad coureliana reseñada, la hemos recolectado en los siguientes lugares: Melide (A Coruña), 1♂, 25-IX-2012 (l); Samos (Lugo), 1♂, 17-IX-2011 (l); y Verín (Ourense), 1♂ y 1♀, 3-IX-2010 (l). Resulta nueva para las provincias de Lugo y Ourense. Dado el escaso número de ejemplares recolectado a lo largo de bastantes años, parece que en Galicia es especie localizada y rara. Siempre la hemos encontrado en paredes pintadas de blanco u otros colores claros iluminadas por variadas fuentes de luz cercanas. Como se hace obvio por las fechas de recolecta de nuestros ejemplares, nunca hemos encontrado en Galicia ejemplares de su primera generación que, según la bibliografía consultada, abarca de abril a junio.

### *Miltochrista miniata* (Forster, 1771)

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♂ (f. *virginea* Delahaye, 1896), 8-VII-2015 (t). Esperante: 1♂, 18-VIII-2007 (t). Fonte de Carbedo: 1♂ y 1♀ (f. *flava* Priessecker, 1909), (♂, ls), 29-VI-2015 (t); 5♂♂ y 3♀♀ (4♂♂ y 2♀♀, ls), (muy abundante, 30% f. *flava*), 9-VII-2015 (t); 16♂♂ y 18♀♀ (12♂♂ y 16♀♀, ls), (muy abundante, 40% f. *flava*), 11-VII-2015 (t); 13♂♂ y 11♀♀ (♂♂ y 12♀♀, ls) (30% f. *flava*), 10-VIII-2015 (t). Moreda: 3♂♂, 29-VII-2006 (t). Seoane: 2♂♂ (f. *virginea*), 3-VIII-2008 (l); 1♂, 7-IX-2015 (t).

### *Cybosia mesomella* (Linnaeus, 1758)

**Citas previas:** Paderne (Rubio *et al.*, 2016)

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♂♂, 18-VI-2015 (t); 1♂, 28-VI-2015 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 29-VI-2015 (t); 2♂♂, 9-VII-2015 (t).

Especie eurosiberiana de amplia distribución geográfica que en la Península Ibérica puebla una más o menos ancha franja septentrional. Su peculiar *habitus* la hacen inconfundible. Hasta recientemente su presencia en Galicia no se contemplaba con rotundidad, siendo así que la primera cita de su territorio (Casado Pasamontes, 1990), de los alrededores de Celanova (Ourense) no se

reseña en el mapa presentado en Ylla Ullastre *et al.* (2010: 47) autores que, a pesar de contemplar en su mapa que está presente en parte del norte de Ourense y sudeste lucense, sólo indican que "muy posiblemente [su distribución geográfica ibérica] se extienda hasta Galicia". Con posterioridad, aparte de la cita coureliense anotada, sólo se había citado en Pino Pérez & Castro González, [2013] de una localización de los alrededores de Monforte (Lugo). Esta escasez de citas justifica que relacionemos ahora dónde, aparte de O Courel, la hemos recolectado en territorio gallego: Samos (Lugo), 1♂, 2-VI-2002 (l); Becerreá (Lugo), 2♂♂, 28-VI-2008 (l); y Rozadais (Ourense), 1♂, 31-V-2012 (t). Todos los ejemplares relacionados se adscriben a la f. *flava* Preissecker, 1909.

En Ortiz *et al.* (2016) se afirma erróneamente que esta especie en Galicia sólo estaba hasta entonces citada de la provincia de Lugo, omitiéndose el trabajo de Casado Pasamontes (1990) y asignándonos a nosotros (Fernández Vidal *et al.*, 1992) una cita inexistente.

### *Lithosia quadra* (Linnaeus, 1758)

**Citas previas:** Moreda (Fernández Vidal *et al.*, 1992).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♀, 9-VIII-2015 (t). Carbedo (*supra*): 1♂, 24-VIII-2014 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 9-VII-2015 (t); 1♀, 11-VII-2015 (t); 1♂, 10-VIII-2015 (t). Moreda: 3♀♀, 29-VII-2006 (t). Seoane: 3♂♂ y 3♀♀ (2♂♂ y ♀♀, ls), 2-IX-2007 (l); 1♂ y 1♀, 2-VIII-2008 (l).

### *Eilema depressa* (Esper, 1787)

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♂♂, 1-IX-2014 (t), (g); 1♂ y 1♀, 6-IX-2015 (t). Esperante: 1♂ (ds), 28-IX-2016 (t), (g).

### *Eilema lurideola* (Zincken, 1817)

**Citas previas:** Paderne (Rubio *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♂♂ y 1♀ (abundante), 23-VIII-2014 (t); 1♀, 30-VIII-2014 (t); 8♂♂ (5 ls), 8-VII-2015 (t), (g); 3♂♂ (2 ls), 10-VII-2015 (t); 5♂♂ y 5♀♀ (ls), 9-VIII-2015 (t). Carbedo (*supra*): 1♂ (muy abundante), 24-VIII-2014 (t); 1♂ (muy abundante), 1-IX-2014 (t). Esperante: 10♂♂ y 3♀♀ (9♂♂ y 2♀♀, ls), 18-VIII-2007 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 9-VII-2015 (t); 1♀, 7-IX-2015 (t). Seoane: 1♂ (muy abundante), 19-VIII-2007 (l); 1♀ (muy abundante), 25-VIII-2007 (l); 1♂ (muy abundante), 2-IX-2007 (l); 1♀, 16-IX-2007 (l); 1♀, 12-IX-2010 (l); 1♂ (frecuente), 24-VIII-2014 (t); 1♂, 31-VIII-2014 (l).

### *Eilema complana* (Linnaeus, 1758)

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♂, 8-VII-2015 (t), (g); 1♀, 9-VIII-2015 (t). Fonte de Carbedo: 2♂♂, 11-VII-2015 (t).

En Ortiz *et al.* (2016) se afirma erróneamente que esta especie en Galicia sólo estaba citada hasta entonces de la provincia de Lugo, omitiéndose el trabajo de Casado Pasamontes (1990) donde se da a conocer por primera vez de su territorio, de los alrededores de Celanova (Ourense). Además incluyen un párrafo que parece evidenciar que estos autores no han acudido, entre otros, a análisis genital alguno: "En el caso de *Eilema complana* subsp. *complana* se han identificado varias formas que se corresponderían con *Eilema pseudocomplana* (Daniel, 1939), según YLLA & MACIÁ (2005). Sin embargo, debido a las dificultades que implica su correcta identificación y separación de las diferentes formas de la especie (WITT & RONKAY, 2011), se ha decidido considerarlas como *E. c. complana*". Vaya por delante que por todos los Ancares, personalmente sólo hemos encontrado *E. complana complana* presentando mínima variabilidad fenotípica alar (examen de material en nuestra colección procedente de recolectas en las localidades ancarienses de Albergue Club Ancares, Degrada, Doiras, Os Cabaniños, Pista al Tres Obispos, Piornedo y Ponte Vales); así como en O Courel,

aunque uno de nuestros ejemplares (el reseñado del Alto do Couto) parece adscribirse a *E. complana iberica* Mentzer, 1980. Las dificultades que implica la diferenciación entre *E. complana* y *E. pseudocomplana* se limitan a la simple observación de la presencia o ausencia de escamas androconiales en la costa del reverso de las alas anteriores y de la sufusión grisácea del área costal del reverso de las inferiores y/o acudir a análisis genital (véase Witt & Ronkay, 2011 e Ylla Ullastre *et al.*, 2010). En Witt & Ronkay (2011) no se indica dificultad alguna al respecto sino que la variabilidad interpoblacional (geográfica en sentido amplio), no intrapoblacional, de *E. complana* es considerable en *habitus* y genitalia, lo que no es lo mismo ni por asomo. En todo caso, una población de *E. pseudocomplana* en los Ancares, tan dislocada del resto de las ibéricas (en el cuadrante nordeste) y, sobre todo, ocupando hábitats y biotopos tan drásticamente disimilares a los propios de esta especie xerotérmica no parece plausible.

#### *Eilema caniola* (Hübner, [1808])

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Carbedo (*supra*): 1♂, 24-VIII-2014 (+). Esperante: 2♂♂, 28-IX-2016 (+).

#### *Eilema palliatella* (Scopoli, 1763)

**Citas previas:** Moreda y Seara (Fernández Vidal *et al.*, 1992).

**Nuevas citas:** Carbedo (*supra*): 1♂, 24-VIII-2014 (+); 1♂, 25-VIII-2014 (+).

#### *Eilema pygmaeola* (Doubleday, 1847)

**Citas previas:** Moreda (Fernández Vidal *et al.*, 1992), como *Eilema pallifrons moredensis* (*descript.*).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♂, 23-VIII-2014 (+), (g); 1♀, 9-VIII-2015 (+). Esperante: 1♀, 8-VI-2016 (+). Fonte de Carbedo: 1♂, 11-VII-2015 (+), (g).

Ilustramos un ejemplar y su genitalia procedente de Alto do Couto (Fig. 1).

#### *Eilema lutarella* (Linnaeus, 1758)

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♂♂ (volados), 23-VIII-2014 (+), (g). Carbedo (*supra*): 1♂, 15-VIII-2002 (d), (g); 1♂, 31-VII-2006 (d), (g); 1♂, 9-VII-2015 (d), (g). Moreda: 1♂, 3-VIII-2008 (+).

Nueva para la provincia de Lugo. Ilustramos un ejemplar y su genitalia procedente de *supra* Carbedo (Fig. 2).

Especie mediterráneo-asiática de amplia distribución europea que en la Península Ibérica ocupa una estrecha franja septentrional y contados enclaves centro-orientales. Su presencia en Galicia no se concreta por primera vez en Pino-Pérez *et al.* (2016) de O Pontón das Olgas, A Veiga (Ourense), como proclaman estos autores pues, en realidad, ya estaba citada de Cecebre (A Coruña) en Fernández Vidal (2011), omisión que hace que la aventurada disertación con la que introducen su primicia los deje en evidencia (así como a sus revisores).

Como es bien sabido, esta especie suele confundirse con su congénérica *E. pygmaeola*, con la que a menudo es simpátrica y sincrónica como en O Courel; la única cita zamorana existente (Jambrina *et al.*, 2008) se ha comprobado que pertenecía a esta última especie (Ylla Ullastre *et al.*, 2010), por lo que se hace necesario casi siempre acudir a análisis genital para una correcta determinación. Valga como demostración, que los ejemplares que se ilustran en este trabajo (Figs. 1 y 2) los habíamos determinado provisionalmente a ojo equivocadamente, es decir, *lutarella* por *pygmaeola*, o viceversa.

Se trata de especie de gran plasticidad ecológica "*inhabiting a wide range of biotopes*" (Witt & Ronkay, 2011). En O Courel parece que habita, como en muchos otros enclaves de su área de distribución geográfica meridional, "*biotopos montañosos, soleados, sobre terrenos calcáreos*", por decirlo con palabras de Ylla Ullastre *et al.* (2010).

El *habitus* de nuestros ejemplares courelienses es coincidente con los de la subespecie *luqueti* Leraut, 2006, descrita del departamento francés de Savoie, que puebla también varias áreas ibéricas centro-orientales, y que mientras en Ylla Ullastre *et al.* (2010) se considera una simple forma de la subespecie tiponimial, en Witt & Ronkay (2011) se contempla su buena subespecificidad.

***Eilema sororcula*** (Hufnagel, 1766)

**Citas previas:** Paderne (Rubio *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♂♂, 18-VI-2015 (t); 1♂, 19-VI-2015 (t). Esperante: 1♂, 8-VI-2016 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 29-VI-2015 (t); 14♂♂ (10 ls), 9-VII-2015 (t). Seoane: 1♂, 29-VI-2015 (l).

***Eilema uniola*** (Rambur, 1866)

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Carbedo (*supra*): 1♀, 24-VIII-2014 (t); 2♂♂ y 7♀♀ (4♀♀, ls), 1-IX-2014 (t); 4♂♂ (3 ls), 7-IX-2015 (t). Castelo de Carbedo: 2♂♂, 6-IX-2015 (t). Moreda: 1♀, 11-IX-2010 (l). Seoane: 2♀♀, 12-IX-2010 (l); 1♂, 24-VIII-2014 (l); 1♂, 7-IX-2015 (t).

***Setina flavicans*** (Hübner-Geyer, [1836])

**Citas previas:** Alto do Couto (Fernández Vidal *et al.*, 2003).

Desde que en julio de 1991 y 1993 recolectamos tres ejemplares de esta especie en horario diurno en dicha localización (siempre a orillas de un pequeño regato tupido por la vegetación, hoy encauzado hacia un estanque), no la hemos vuelto a encontrar a pesar de haber prospectado la zona posteriormente en horario diurno numerosas veces y recolectado en ubicaciones muy próximas (a menos de 200 m) con trampas lumínicas también en numerosas ocasiones; constituye algo que siempre nos ha intrigado, ya que no existen causas graves de origen antrópico que incidieran en su posible desaparición en esta zona, salvo pequeños incendios en años posteriores que, por otra parte, no afectaron sensiblemente al resto de la lepidopterofauna del lugar.

***Phragmatobia fuliginosa*** (Linnaeus, 1758)

**Citas previas:** Paderne (Rubio *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♂, 30-VIII-2014 (t); 1♀ (ls), 9-VIII-2015 (t); 1♂, 7-IX-2015 (t). Seoane: 1♂, 2-IX-2007 (l); 1♀, 31-VIII-2014 (t).

***Cymbalophora pudica*** (Esper, 1785)

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Seoane: 1♂, 11-IX-2010 (l).

Esta común y abundante especie tardo-estival, ampliamente distribuída por toda Galicia según las citas existentes (de todas sus provincias), no parece ser muy frecuente en O Courel a juzgar por nuestra única captura. Por lo general, en Galicia es mucho más frecuente y abundante en áreas abiertas que en las arboladas, como por ejemplo en áreas costeras.

***Parasemia plantaginis*** (Linnaeus, 1758)

**Citas previas:** Devesa da Rogueira (Fernández Vidal *et al.*, 1992).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♂♂, 15-VI-1996 (d), 1♂ (ls), 3-VII-2005 (d), 4♂♂, 28-V-2015 (d).

En Ortiz *et al.* (2016) se omite que esta especie heliófila está presente en los Ancares gallegos, de donde está citada, en Fernández Vidal *et al.* (1992), de Donís, Monte Mostallar y Río Ortigal. Añadimos ahora que es especie común y abundante por casi todos los Ancares gallegos por encima de los 1000 m, habiéndola recolectado además personalmente en Albergue Club Ancares, Monte Mostallar, Piornedo, Pista al Tres Obispos y Ponte Vales.

***Spilosoma lutea* (Hufnagel, 1766)**

**Citas previas:** Paderne (Rubio *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 19♂♂ y 3♀♀ (ls), 18-VI-2015 (t); 6♂♂ (5 ls), 19-VI-2015 (t); 1♂, 28-VI-2015 (t); 1♂, 9-VI-2016 (t). Esperante: 1♂, 8-VI-2016 (t). Seoane: 1♂, 10-VI-2016 (l).

***Spilosoma lubricipeda* (Linnaeus, 1758)**

**Citas previas:** Folgoso do Courel (Fernández Vidal *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Esperante: 4♂♂ (1 ls), 8/9-VI-2016. Fonte de Carbedo: 2♂♂ (1 ls), 28-V-2015 (t). Seoane: 1♂, 28-V-2015 (l); 1♂, 9-VI-2016 (l).

***Diaphora mendica* (Clerck, 1759)**

**Citas previas:** Folgoso do Courel (Fernández Vidal *et al.*, 1992).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♀, 4-VII-1993 (d); 1♀, 9-VII-1994 (d); 1♀, 15-VI-1996 (d); 1♂, 20-VI-1998 (d). Carbedo: 1♂, 2-VI-2001 (d). Fonte de Carbedo: 1♂, 4-VI-1995 (d). Moreda: 1♂, 19-V-2001 (d). Pacios: 2♂♂, 12-VII-1996 (d); 1♀, 19-V-2001 (d).

***Diacrisia sannio* (Linnaeus, 1758)**

**Citas previas:** Paderne (Rubio *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♂♂, 15-VI-1996 (d); 2♂♂, 22-VII-1997 (d); 1♂, 18-VI-2015 (t); 2♂♂, 19-VI-2015 (t); 1♂, 28-VI-2015 (t). Seoane: 1♂, 2-IX-2007 (l).

Especie común por toda Galicia que en O Courel hemos avistado con cierta frecuencia en vuelo diurno (♂♂ y ocasionalmente alguna ♀), varios años en junio-julio, en los prados de Esperante, Moreda, Pacios y Romeor, sin que hayamos hecho capturas ni llevado cuenta de avistamientos.

En Rubio *et al.* (2016) se presume de citarla por primera vez para la provincia de Lugo lo que no es correcto, pues ya lo estaba de Guitiriz, Monte Mostallar y Viveiró en Fernández Vidal *et al.* (1992), obra que incomprensiblemente estos autores listan en su bibliografía como consultada, siendo aún más incomprensible que posteriormente y también citándonos en su bibliografía, estos mismos autores (Ortiz *et al.*, 2016), omitan que ya estaba citada de los Ancares gallegos volviéndola a citar otra vez "por primera vez" para la provincia de Lugo.

***Hyphoraia dejeani* (Godart, 1822)**

**Citas previas:** Folgoso do Courel y Seoane (Fernández Vidal *et al.*, 1992); Paderne (Rubio *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Seoane: 1♂, 19-V-2001 (l); 1♂, 12-V-2015 (l).

***Atlantarctia tigrina* (Villers, 1789)**

**Citas previas:** Seoane (Fernández Vidal *et al.*, 1992).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♂♂, 18-VI-2015 (t); 1♂, 19-VI-2015 (t).

***Arctia caja* (Linnaeus, 1758)**

**Citas previas:** Devesa da Rogueira (Fernández Vidal *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♂ (ls), 9-VIII-2015 (t). Fonte de Carbedo: 1♂ (ls), 10-VIII-2015 (t). Moreda: 1♂, 12-VIII-2006 (t). Seoane: 1♂ y 1♀, 2-IX-2007 (l); 1♂ (ls), 31-VIII-2014 (l).

Esta especie es común en O Courel, habiéndola encontrado numerosas veces a las luces de Folgoso do Courel, Paderne, Seoane, etc., y siendo atraída por trampas lumínicas en todas las localidades prospectadas sin que hayamos procedido casi nunca a recolectarla ni a llevar cuenta de avistamientos.

***Arctia villica* (Linnaeus, 1758)**

**Citas previas:** Paderne (Rubio *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♂ (volado), 19-VI-2015 (t). Esperante: 3♂♂, 8/9-VI-2016 (t). Pacios: 1♂, 23-V-2004 (d, en horas de la mañana en la ventana de una vivienda, seguramente atraído por sus luces durante la noche).

Esta especie está muy poco citada de Galicia, aunque se conoce su presencia en todas sus provincias (Fernández Vidal *et al.*, 1992), en donde siguiendo a Agenjo (1942) se adscribe todo el material estudiado (15 ejemplares de 8 localizaciones) a la subespecie *britannica* Oberthür, 1911, taxón que en Freina & Witt (1987) se había sinonimizado al tiponimial descrito de Suecia, criterio aceptado actualmente por autores significativos (Ylla Ullastre *et al.*, 2010; Witt *et al.*, 2011), que nosotros ahora también adoptamos.

Como es bien sabido (ver la bibliografía reseñada en el anterior párrafo y otra al uso), gran parte del sur y sudeste de la Península Ibérica hasta rozar Galicia, incluyendo todo Portugal (Corley, 2015), véase mapa muy preciso en Ylla Ullastre *et al.* (2010), está poblado por la subespecie *angelica* Boisduval, 1829, que presenta las características máculas amarillo-blanquecinas del anverso de sus alas anteriores más o menos fusionadas, lo que la hacen inconfundible y cuyo rango taxonómico nadie discute; nosotros sólo la hemos recolectado en Feces de Abaixo, Verín (Ourense), 2♂♂, 10-V-2014 (I); en la misma noche recolectamos otros dos ♂♂ en la localidad lusa muy cercana de Quinta de Samaiões, Chaves (Vila Real). Los ejemplares de la Serra do Courel, como los que hemos recolectado en los Ancares (Degrada, Piornedo y Pista al Tres Obispos) y Trevinca (Casaio y O Trigo) se adscriben a la subespecie tiponimial (ver Fig. 3). Sería muy interesante investigar cómo se presenta su *habitus* en las áreas de hipotético contacto entre ambas subespecies en Galicia si es que éstas existen, puesto que desde Agenjo (1942) hasta Ylla Ullastre *et al.* (2010) se resalta que nunca se ha encontrado un lugar donde ambas subespecies estén presentes juntas, lo que refuerza el considerar a *angelica* como una buena subespecie, además de evidenciar su diferente origen y establecimiento, disertación que se escapa ahora de contexto.

#### ***Callimorpha dominula* (Linnaeus, 1758)**

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 2♀♀ (f. *lusitanica* Staudinger, 1894), 22-VII-1997 (d); 2♀♀ (f. *bieli* Staudinger, 1894), 10-VII-1999 (d); 1♀ (f. *lusitanica*), 20-VII-2000 (d); 1♀ (f. *lusitanica*), 8-VII-2015 (t). Fonte de Carbedo: 1♀, 9-VII-2015 (d). Pacios: 1♂, 8-VII-2015 (d).

#### ***Euplagia quadripunctaria* (Poda, 1761)**

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 3♂♂ y 1♀ (Is), 23-VIII-2014 (t); 2♀♀ (Is), 9-VIII-2015 (t). Carbedo (*supra*): 1♀ (Is), 24-VIII-2014 (t). Fonte de Carbedo: 2♂♂ (Is), 10-VIII-2015 (t). Moreda: 2♂♂ y 1♀, 7-VIII-1992 (d). Seoane: 2♂♂ (Is), 19-VIII-2007 (I); 3♂♂ (Is), 15-IX-2007 (I); 1♀ (Is), 31-VIII-2014 (I). Transecto Ferrería de Seoane-Moreda: 10 ♂♂ y 14♀♀ (Is, muy abundante), 29-VII-2006 (d).

A esta conspicua especie la hemos avistado frecuentemente en julio-septiembre en vuelo diurno, a menudo abundante, en todas las localizaciones visitadas del Courel, mayormente en zonas umbrías. A veces posadas gregariamente en las floraciones de *Epilobium* sp. Acude también profusamente a las luces. Las directivas proteccionistas de la Unión Europea (*Bern Convention* y *Habitats Directive*) adoptadas por España y aplicadas en todo su territorio, no se sostienen respecto a esta común y abundante especie que no está amenazada en absoluto, no sólo por lo que toca al Courel sino a toda Galicia.

#### ***Tyria jacobaeae* (Linnaeus, 1758)**

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♀, 2-VI-2001 (d).

A esta común especie por toda Galicia la hemos avistado ocasionalmente en vuelo diurno en Alto do Couto, transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira, Devesa da Rogueira, transecto Seoane-Moreda, Seara y Pacios, sin que hayamos efectuado capturas ni llevado cuenta de avistamientos. Predando *Senecio* sp., hemos visto sus orugas en Carbedo, Pacios y Nocedo.

### *Spiris striata* (Linnaeus, 1758)

No existen citas previas.

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 1♀, 22-VII-2001 (d). Moreda: 2♂♂, 12-VII-1996 (d); 4♂♂, 22-VII-2001 (d).

A esta especie heliófila la hemos visto a menudo en praderíos de Pacios y de los transectos Seoane-Alto do Couto y Seoane-Moreda- Devesa da Rogueira, en junio-julio, sin que hayamos hecho otras capturas que las anotadas ni llevado cuenta de los avistamientos. La consideramos común por toda el área.

### *Coscinia cribraria* (Linnaeus, 1758)

**Citas previas:** Paderne (Rubio *et al.*, 2016).

**Nuevas citas:** Alto do Couto: 8♂♂ y 4♀♀ (6♂♂ y 2♀♀, ls), 23-VIII-2014 (t); 8♀♀ (5 ls), 30-VIII-2014 (t); 1♂, 10-VII-2015 (t). Carbedo (*supra*): 2♂♂ y 3♀♀ (♂♂ y 2♀♀, ls), 24-VIII-2014 (t); 3♂♂ y 2♀♀ (♂♂ y 1♀, ls), 1-IX-2014 (t). Esperante: 1♂, 18-VIII-2007 (t). Fonte de Carbedo: 1♂, 10-VIII-2015 (t). Moreda: 3♂♂, 29-VII-2006 (t); 5♂♂ (4ls), 12-VIII-2006 (t). Seoane: 1♀, 24-VII-2006 (l); 1♂, 19-VIII-2007 (l); 3♂♂ y 3♀♀ (1♂ y 1♀, ls), 2-IX-2007 (l); 2♂♂ (ls), 15-IX-2007 (l).

## Conclusiones y comentarios

Hemos elaborado un catálogo provisional de los ártidos presentes en O Courel (Lugo) listando los reseñados en la bibliografía precedente (18 especies recogidas en tres títulos), así como relacionando pormenorizadamente 164 nuevos registros (citas), correspondientes a 437 ejemplares de 30 especies. Con tales datos se eleva el número de especies de esta subfamilia presentes en dicha comarca en 13 (de 18 a 31), confirmándose todas las previamente citadas excepto una (*Setina flavicans*) y citándose *Apaidia mesogona* por primera vez para las provincias de Lugo y Ourense y *Eilema lutarella* por primera vez para Lugo. En resumen, de las 40 especies de Arctiinae citadas hasta ahora de Galicia hemos documentado la presencia de 31 en O Courel, es decir, el 77,5%, constatándose así la relevante riqueza de este grupo faunístico en dicha comarca. De hecho, se erige por el momento en la más diversa al respecto de toda Galicia, siendo además muy probable que algunas otras especies ya citadas de áreas galaicas cercanas, como de los macizos montañosos de Trevinca y/o Ancares, también puedan poblar partes de su territorio ya que algunos de sus significativos enclaves, que aún no han sido prospectados del todo (temporal ni espacialmente), son susceptibles ecológicamente para que puedan estar presentes especies como *Setina cantabrica*, *Chelis maculosa* (Gerding, 1780), *Watsonarctia casta*, etc., incluso otras aún no citadas de Galicia que, por demasiado hipotético, eludimos comentarlas.

Respecto a que nos hayamos ocupado en poner en evidencia errores y omisiones contenidas en Ortiz *et al.* (2016) sobre los Arctiinae de Ancares, lo que pudiera considerarse algo fuera de contexto geográfico, estimamos oportuno hacerlo ahora ya que el asunto toca a los de área muy cercana al Courel. Hemos de significar también que de ese catálogo todavía quedan por denunciar dos importantes omisiones, de especies que no se han encontrado por el momento en O Courel pero sí en Ancares. La primera se trata de *Setina cantábrica*, que está citada concretamente de Moreira, Río Ortigal y Xantes, como *S. irrorella* (Linnaeus, 1758), en Fernández Vidal *et al.* (1992) y de Ponte Vales en Fernández Vidal *et al.* (2003) y asimismo indicada en Ylla Ullastre *et al.* (2010). La segunda, de *Chelis maculosa*, citada de Pista al Tres Obispos en Fernández Vidal (2012) y recogido en Magro (2013).

## Agradecimiento

A nuestro editor Fernando Prieto Piloña por su aportación bibliográfica. A mi esposa Antonia Rodríguez Fandiño, que me acompañó en todas las salidas de campo desde el año 2002, recolectando personalmente buena parte del material reseñado en este trabajo, amén de extender y etiquetar muchos ejemplares, facilitándome así las determinaciones y/o elaboración de su listado, ocupándose además de la fotografía y elaboración de las composiciones (sigue sin querer figurar como coautora aunque ciertamente le correspondería).

## Bibliografía

Agenjo, R. 1942. Acerca del verdadero concepto de la raza *angelica* Boisd., de *Arctia villica* (L.) y de la validez específica de *Hyphoraia testudinaria* (Fourc.), *Hyphoraia dejeani* (Godt.) y *Chelis simplonica* (Boisd.). *EOS, Revista Española de Entomología*, **18**: 347-380, láms. VII-X.

Casado Pasamontes, F. 1990. Capturas en la provincia de Orense y Zamora que se consideran de interés. In *Noticias Generales. SHILAP Revista de lepidopterología*, **18**(70): 193-194.

Corley, M.F.W. 2015. *Lepidoptera of Continental Portugal. A fully revised list*: 282 pp. Martin Corley. Faringdon.

Fernández Vidal, E.H. 2010. Lepidopterofauna de la Torre de Hércules (A Coruña, Galicia, España) (Lepidoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **46**: 285-298.

Fernández Vidal, E.H. 2011. Lepidopterofauna lucípeta de la Fraga de Cecebre (A Coruña, Galicia, España) (Lepidoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **48**: 163-182.

Fernández Vidal, E.H. 2012. Precisiones sobre el status taxonómico de las poblaciones noroccidentales ibéricas de *Chelis maculosa* (Gerning, 1780) (Lepidoptera, Arctiidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **50**: 431-434.

Fernández Vidal, E.H. 2016. Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica) I: Geometridae. (Lepidoptera). *Archivos Entomológicos*, **15**: 297-320.

Fernández-Vidal, E.H.; López-Vaamonde, C. & Pino-Pérez, J.J. 1992. Contribución al conocimiento de los Arctidos de Galicia. (Lepidoptera: Arctiidae). *SHILAP Revista de lepidopterología*, **20**(77): 51-91.

Fernández Vidal, E.H.; Macià, R. & Ylla, J. 2003. Sobre la validez específica de *Setina cantabrica* Freina & Witt, 1985, sus caracteres diferenciadores y distribución geográfica (Lepidoptera, Arctiidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **33**: 73-77.

Freina, J.J. de & Witt, T.J. 1987. *Die Bombyces und Sphinges der Westpalaearktis. (Insecta: Lepidoptera). Band I*: 708 + 1 pp. Forschung & Wissenschaft Verlag GmbH. München.

Gastón, J.; Morente-Benítez, F.J. & Redondo, V. 2013. Presencia en la Península Ibérica de *Apaidia barbarica* Legrand, 1939 y revisión de su categoría como especie válida (Lepidoptera: Erebidae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **52**: 219-225.


Gómez Bustillo, M.R. 1979. *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros (II). Superfamilia Noctuoidea. (Primera parte)*: 280 pp. ICONA. Madrid.

- Hiernaux, L.; Hurtado, A. & Fernández, J. 2010. Catálogo de Lepidoptera Heterocera del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (España) (Insecta: Lepidoptera). *SHILAP Revista de lepidopterología*, **38**(150): 177-185.
- Jambrina, J.A.; Garretas, V.A. & Calzada, A. 2008. Adiciones al Catálogo de la Fauna de los Lepidópteros de Zamora, con nuevos registros de heteróceros para Castilla y León (España) (Lepidoptera). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **42**: 257-260.
- Magro, R. 2013. Atlas provisional de los lepidópteros heteróceros de Castilla y León, España: precisiones sobre la distribución del género *Chelis* Rambur, 1866 (Lepidoptera: Aganidae: Arctiinae). *Arquivos Entomológicos*, **8**: 191-208.
- Ortiz, A.S.; Rubio, R.M.; Garre, M. & Guerrero, J.J. 2016. Los Noctuoidea (Lepidoptera) del Parque Natural de la Serra dos Ancares (Lugo, España). *Boletín de la Asociación española de Entomología*, **40**(3-4): 393-437.
- Pérez De-Gregorio, J.J.; Muñoz, J. & Rondós, M. 2001. *Atlas fotográfico de los lepidópteros macroheteróceros íbero-baleares*. 2: 210 pp. Argania editio. Barcelona.
- Pino Pérez, J.J. & Castro González, J. [2013]. Algunos lepidópteros gallegos de la colección del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña). *Boletín BIGA*, **11**: 53-68.
- Pino-Pérez, J.J.; Martínez Fernández, A. & Pino-Pérez, R. 2016. Primera cita de *Eilema lutarella* (Linnaeus, 1758), (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Lithosiini), para Galicia (NO España). *Nova Acta Científica Compostelana (Biología)*, **23**: 21-23.
- Pino-Pérez, J.J.; Pino-Pérez, R. & Camaño Portela, J.L. 2010. Primera cita de *Watsonarctia deserta* (Bartel, 1902) para Galicia (España). (Lepidoptera: Arctiidae). *SHILAP Revista de lepidopterología*, **38**(151): 337-339.
- Pino-Pérez, J.J.; Pino-Pérez, R. & Pino-Cancelas, A. 2011. Primera cita de *Dysauxes punctata* (Fabricius, 1781) para Galicia (España) (Lepidoptera: Arctiidae, Syntominiinae). *SHILAP Revista de lepidopterología*, **39**(155): 263-266.
- Rodríguez de Rivera Ortega, Ó. 2010. *Inventario Entomológico del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Lepidópteros nocturnos (Heteróceros)*. Escuela Politécnica de Mieres. Universidad de Oviedo: 208 pp.
- Rubio, R.M.; Guerrero, J.J.; Garre, M. & Ortiz, A.S. 2016. Contribución al conocimiento de los Noctuoidea (Lepidoptera) de la Serra do Courel (Lugo, NO Península Ibérica). *Arquivos Entomológicos*, **16**: 85-89.
- Vives Moreno, A. 2014. Catálogo sistemático y sinonímico de los Lepidoptera de la Península Ibérica, de Ceuta, de Melilla y de las Islas Azores, Baleares, Canarias, Madeira y Salvajes (Insecta: Lepidoptera). *Suplemento de SHILAP Revista de lepidopterología*: 1-1184 pp.
- Witt, T.J.; Speidel, W.; Ronkay, G.; Ronkay, L. & László, G.M. 2011. Subfamilia Arctiinae. In Witt, T.J. & Ronkay, L. *Noctuidae Europaeae. Volume 13. Lymantriinae and Arctiinae including Phylogeny and Check List of the Quadrifid Noctuoidea of Europe*: 81-258, 271-361. Entomological Press. Sorø.
- Yela, J.L. & Zahiri, R. 2011. Phylogenetic overview of Noctuidae sensu lato. In Witt, T.J. & Ronkay, L. *Noctuidae Europaeae. Volume 13. Lymantriinae and Arctiinae including Phylogeny and Check List of the Quadrifid Noctuoidea of Europe*: 17-22. Entomological Press. Sorø.
- Ylla Ullastre, J.; Macià Vilà, R. & Gastón Ortiz, F.J. 2010. *Manual de identificación y guía de campo de los Ártidos de la Península Ibérica y Baleares*: 290 pp. Argania editio. Barcelona.



Fig. 1.- *Eilema lutarella*, ♂, procedente de supra Carbedo (Lugo), 9-VII-2015, y su genitalia (Prep. 2882) en vista lateral con el aedeagus separado.

1




2882



Fig. 2.- *Eilema pygmaeola*, ♂, procedente del Alto do Couto (Lugo), 23-VIII-2014, y su genitalia (Prep. 2884) en vista lateral con el aedeagus separado.

2



2884




Fig. 3.- Ejemplares ♂♂ de *Arctia villica* de Galicia. a y b.- Feces de Abaixo (Ourense), 10-V-2014; c y d.- Esperante (Lugo), 8-VI-2016; e.- O Trigal (Ourense), 21-V-2011; f.- Degrada (Lugo), 8-VI-2008.

Tabla I. - Localidades y/o localizaciones de Galicia citadas.

Nombre	Municipio	Provincia	Altitud	UTM 10x10
A Carreira	Narón	A Coruña	70	29TNJ62
Cecebre	Cambre	A Coruña	50	29TNJ59
Melide	Melide	A Coruña	470	29TNH85
Albergue Club Ancares	Cervantes	Lugo	1380	29TPH74
Alto do Couto	Folgoso do Courel	Lugo	1300-1340	29TPH51
Becerreá	Becerreá	Lugo	675	29TPH44
Carbedo	Folgoso do Courel	Lugo	740	29TPH52
Carbedo (Castelo)	Folgoso do Courel	Lugo	915	29TPH52
Carbedo ( <i>supra</i> )	Folgoso do Courel	Lugo	1050	29TPH52
Degrada	Cervantes	Lugo	1100	29TPH74
Devesa da Rogueira	Folgoso do Courel	Lugo	730-1200	29TPH52
Doiras	Cervantes	Lugo	875	29TPH74
Donís	Cervantes	Lugo	800	29TPH74
Esperante	Folgoso do Courel	Lugo	797	29TPH52
Ferrería de Seoane	Folgoso do Courel	Lugo	535	29TPH52
Folgoso do Courel	Folgoso do Courel	Lugo	612	29TPH41
Fonte de Carbedo	Folgoso do Courel	Lugo	730	29TPH52
Guitiriz	Guitiriz	Lugo	450	29TNH88
Monforte de Lemos	Monforte de Lemos	Lugo	350	29TPH20
Monte Mostallar	Cervantes	Lugo	1450-1550	29TNH74
Moreda	Folgoso do Courel	Lugo	900-950	29TPH52
Moreira	Cervantes	Lugo	620	29TPH75
Nocedo	Folgoso do Courel	Lugo	968	29TPH52
Os Cabaniños	Cervantes	Lugo	1018	29TPH74
Pacios	Pedrafita do Cebreiro	Lugo	820	29TPH52
Paderne	Folgoso do Courel	Lugo	780	29TPH42
Piornedo	Cervantes	Lugo	1100	29TPH74
Pista al Tres Obispos	Cervantes	Lugo	1400-1600	29TPH74
Ponte Vales	Cervantes	Lugo	895	29TPH74
Río Ortigal	Cervantes	Lugo	1100	29TPH74
Romeor	Folgoso do Courel	Lugo	915	29TPH52
Samos	Samos	Lugo	540	29TPH33
Seara	Folgoso do Courel	Lugo	710	29TPH51
Seoane	Folgoso do Courel	Lugo	640	29TPH52
Viveiró	Muras	Lugo	680	29TPJ11
Xantes	Cervantes	Lugo	900	29TPH74
Casaio	Carballeda de Valdeorras	Ourense	974	29TPG89
Celanova	Celanova	Ourense	670	29TNG86
Feces de Abaixo	Verín	Ourense	384	29TPG33
O Pontón das Olgas	A Veiga	Ourense	1182	29TPG78
O Trigal	Carballeda de Valdeorras	Ourense	698	29TPH79
Rozadaís	Carballeda de Valdeorras	Ourense	1420	29TPG88
Verín	Verín	Ourense	373	29TPG24