

ARTIGO / ARTÍCULO / ARTICLE

Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica) XIV: Satyridae (*sensu classico*). (Insecta: Lepidoptera).

Eliseo H. Fernández Vidal

Plaza de Zalaeta, 2, 5ºA. E-15002 A Coruña (ESPAÑA). e-mail: lisuco1@hotmail.com

Resumen: Se elabora un listado comentado y puesto al día de los ropalóceros de la familia Satyridae (*sensu classico*) (Lepidoptera) presentes en O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica), recopilando los datos bibliográficos existentes (fidedignos para 22 especies), a los que se añaden otros nuevos como resultado del trabajo de campo del autor desde el año 1989 a la actualidad. Entre los nuevos registros aportados se incluye el primero de *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894) para la comarca de O Courel.

Palabras clave: Lepidoptera, Satyridae, O Courel, Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica.

Abstract: Lepidoptera from O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) XIV: Satyridae (*sensu classico*). (Insecta: Lepidoptera). An updated and annotated list of the Rhopalocera family Satyridae (*sensu classico*) (Lepidoptera) known to occur in O Courel (Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula) is made, compiling the existing bibliographical records (reliable for 22 species) and adding new ones as a result of the fieldwork undertaken by the author since the year 1989 to present. Amongst the new data, the first record of *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894) for this region is reported.

Key words: Lepidoptera, Satyridae, O Courel, Lugo, Galicia, Spain, NW Iberian Peninsula.

Recibido: 21 de octubre de 2017

Aceptado: 31 de octubre de 2017

Publicado on-line: 27 de noviembre de 2017

Introducción

Teniendo en cuenta solamente bibliografía que contenga datos originales y a lo que alcanzamos, el conocimiento que se tiene sobre los satíridos de O Courel está recogido en los siguientes trabajos, en donde se documenta la presencia de 23 especies en su territorio:

1. En Fernández Vidal (1983) se indica por primera vez la presencia de *Erebia triaria* (De Prunner, 1798) y *Erebia palarica* Chapman, 1905, en la "Sierra del Caurel", sin concretar localizaciones. Constituía también la primera noticia sobre los lepidópteros de esta relevante comarca natural, sin duda la más biodiversa de Galicia, resultando sorprendente que hasta entonces no se conociera aún ni un ápice de su lepidopterofauna.
2. En Fernández Vidal (1984) se cita *E. triaria* de dos localidades courelienses concretas por primera vez.
3. En Fernández Vidal (1988a) se cita *Melanargia russiae* (Esper, 1784) de una localidad coureliense concreta por primera vez.
4. En Fernández Vidal (1988b) se vuelve a indicar sin mayor precisión la presencia de *E. palarica*, también la de *Coenonympha iphioides* Staudinger, 1870 y se cita de localidad concreta coureliense *Hyponephele lycaon* (Kühn, 1774), resultando nuevas para la comarca éstas dos últimas.

5. En Fernández Vidal (1991), se citan del "Monte Formigueiros" [transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira] *Hipparchia alcyone* ([Denis & Schiffermüller], 1775, *Hipparchia semele* (Linnaeus, 1758), *Neohipparchia statilinus* (Hufnagel, 1766), *E. palarica*, *Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758), *Maniola jurtina* (Linnaeus, 1758), *Pyronia tithonus* (Linnaeus, 1771), *Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758), *Coenonympha dorus* (Esper, 1782), *Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767) y *Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758). Todas ellas resultaban nuevas para O Courel excepto *E. palarica*, para la que se concretaba una localización coureliense por primera vez.
6. En López Vaamonde *et al.* (1991) se cita *Brintesia circe* (Fabricius, 1775) por primera vez de una localización concreta coureliense.
7. En Fernández Vidal (1992), tuvimos naturalmente en cuenta todas las citas e indicaciones precedentes anteriormente reseñadas, pero sólo explicitamos la presencia en O Courel sin concretar localizaciones de *M. russiae* (con una foto), *E. triaria* y *E. palarica*. Ya conocíamos en ese momento la de otras especies de satíridos aún no citadas por entonces de esta comarca pero no lo explicitamos. También reseñábamos la presencia (p. 157) de *Hipparchia fagi* (Scopoli, 1763), con foto incluida del único ejemplar "coureliense" que nos era conocido (p. 176); se trataba de un ♂ de esta especie, examinado geníticamente, que nos fue entregado asegurándonos que procedía de los alrededores de Visuña; lamentablemente dimos credibilidad a esta cita que, con bastante posterioridad, averiguamos que no correspondía a un ejemplar recolectado en Galicia, seguramente catalán.
8. En SGHN (2001) se indica la presencia de *Melanargia lachesis* (Hübner, 1790) con un punto en la cuadrícula 29TPH51 (que abarca sin excepción territorio coureliense), pero sin concretar localización.
9. En Vila (2004) se cita varias veces la presencia en el Courel de *E. triaria* y *E. palarica*, sin concretar localizaciones. Este trabajo constituye una tesis doctoral, sustentada básicamente en estudios genéticos moleculares y mitocondriales que, como cuerpo principal, engloba siete artículos y notas, de los que sólo uno ya estaba editado aparte (posteriormente se fueron editando otros en varias publicaciones; asunto del actual formato de algunas tesis doctorales). Comoquiera que en tales trabajos se repiten de igual manera las citas courelianas de *E. triaria* y/o *E. palarica*, para evitar reiteraciones innecesarias estimamos suficiente reseñar sólo la propia tesis, que los engloba a todos.
10. En Pino Pérez *et al.* (2008) se cita *Aphantopus hyperantus* (Linnaeus, 1758) por primera vez de una localización coureliense.
11. En Pino Pérez & Castro González (2012) se citan, de una localización coureliense por especie, *B. circe*, *H. alcyone*, *N. statilinus* y *M. russiae*. Ninguna de ellas resultaba nueva para la comarca.
12. En Mostert (2013) se citan de A Seara y sus cercanías 20 especies de satíridos, cuatro de ellas por primera vez para O Courel: *Arethusana arethusana* ([Dennis & Schiffermüller], 1775), *Pseudotergumia fidia* (Linnaeus, 1767), *Erebia meolans* (De Prunner, 1798) y *Pyronia bathseba* (Fabricius, 1793); y *M. lachesis* por primera vez de una localización coureliense concreta.
13. En Dincă *et al.* (2015) se cita *E. triaria* de localización donde ya se conocía su presencia.

Así que, descontando *H. fagi*, por lo ya dicho, y aceptando la cita de *E. meolans* de las cercanías de A Seara, aunque estimemos que necesita comprobación porque existe la probabilidad que se trate de una confusión con ejemplares de pequeño tamaño (envergadura) de *E. palarica*, frecuentes en O Courel, el catálogo conocido de satíridos courelianos alcanza a 22 especies. Por otra parte se hace evidente que los autores anteriores a Mostert (2013) obviaron indicar la presencia de otras más o menos comunes, sin duda por considerar que no constituían datos sobresalientes al estar ampliamente distribuidas por gran parte o todo el territorio gallego. Por la misma razón, no hemos dado a conocer la presencia en O Courel de *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1894) hasta el presente trabajo.

Damos a conocer ahora todas nuestras citas inéditas de satíridos obtenidas personalmente en O Courel desde el año 1989 al presente. Este trabajo constituye la decimocuarta entrega de la serie que

iniciamos en Fernández Vidal (2016), quinta y última sobre los ropalóceros o "mariposas diurnas" (Papilionoidea). Aunque a estas alturas no contenga novedades supralocales, servirá sin duda para aquilatar mejor la distribución espacial y fenología de las especies en dicha comarca y, por extensión, de Galicia y la Península Ibérica.

Material y método

Hemos examinado todo el material que relacionamos, recolectado salvo excepción en horario diurno con la típica red cazamariposas. Aproximadamente el 50% del mismo obra en la colección del autor extendido en cajas entomológicas o bien todavía conservado en sobres y/o triángulos de papel con las correspondientes anotaciones de recolecta y determinación. El resto lo regalamos a varios colegas o lo empleamos en su día para obtener otro de comparación mediante intercambios, al objeto de proceder a estudiar (adscribir y/o describir dado el caso) algunos taxones gallegos. Para evitar innecesarias reiteraciones, obviamos indicar en su listado que todo es Eliseo H. Fernández Vidal *leg.*, si fue recolectado con anterioridad al año 2002 y Eliseo H. Fernández Vidal y Antonia Rodríguez Fandiño *leg.*, si lo fue con posterioridad a dicho año. Reseñamos también los avistamientos en determinados lugares y fechas de ejemplares de especies inconfundibles, observados en vuelo o posados. Nuestras labores de recolecta estuvieron amparadas por los correspondientes permisos al efecto de la Xunta de Galicia desde que éstos se hicieron preceptivos.

Presentamos los resultados en forma de listado comentado según el siguiente esquema: 1º. Nombre y autoría específica. 2º. Citas bibliográficas previas para O Courel, ordenadas cronológicamente y con expresión de localidades y/o localizaciones. 3º. Citas inéditas aportadas en el presente trabajo, incluyendo relación de ejemplares recolectados, localidades y/o localizaciones, y fechas de recolección (por orden alfabético de lugares y cronológico de recolecta), incluyendo también observaciones resaltables entre paréntesis y datos de ejemplares observados con seguridad: (a) si fue sólo uno, o (aa) si fueron varios; así como de los que hemos capturado y dado libertad *in situ* (Is). 4º. Indicación de que hemos comprobado mediante examen genital la determinación del ejemplar, o al menos de uno de los ejemplares reseñados para una fecha determinada (g). 5º. Comentarios que procedan.

En los agrupamientos y adscripciones genéricas seguimos nuestro propio criterio, así como en el ordenamiento específico. Obviamos toda indicación subfamiliar, tribal y subgenérica. Nuestra "clásica" clasificación taxonómica, parcialmente desacorde a la que mayormente se contempla hoy en día, no afecta en absoluto a la composición y comprensión del catálogo de especies.

Comoquiera que todos los aspectos bionómicos de las especies listadas están recogidos y repetidos hasta la saciedad en multitud de bibliografía al uso, los obviamos eludiendo transcribirlos y sólo resaltamos en ciertos casos particularidades de cómo se presentan para algunas especies en O Courel según nuestros propios datos y experiencia. En general no hizo falta consultar bibliografía alguna para la determinación de las especies, con la excepción de aquellas para las que creímos conveniente acudir a análisis genital: varios ejemplares enanos de *E. palarica* que pudieran pasar por *E. meolans* y varios de *H. alcyone* para comprobar qué número de varillas del "órgano de Jullien" mostraban los de O Courel; para ello, entre otra bibliografía al uso, acudimos a Warren (1936), Agenjo (1961), Higgins (1975), Kudrna (1977) y García-Barros *et al.* (2013). En total efectuamos 12 preparaciones genitales que obran en la colección del autor.

Los datos de las localidades y/o localizaciones gallegas citadas en el texto se recogen detalladamente en la Tabla I.

Al objeto de asegurar la bondad de la primera cita local de *Pyronia cecilia* (Vallantin, 1984), hemos consultado presumiblemente toda la bibliografía concerniente a satíridos de Galicia, así como verificado la inexistencia de ninguna otra disponible en versión on-line en Internet en la fecha de publicación del presente trabajo.

Resultados

Brintesia circe (Fabricius, 1775)

Citas previas: Devesa da Rogueira (López Vaamonde *et al.*, 1991; Pino Pérez & Castro González, 2012); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Campelo (encinar): 1♀, 11-VIII-1990; 1♂, 20-VII-1991; 1♂ y 1♀ (aa), 7-VIII-1993. Carbedo (*supra*): 5♀♀ (ls), 2-IX-2001 (muy volada). Monte Cido: 1♀ (ls), 2-X-2011 (volada y rota). Pacios: (aa), 28-VII-2002. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: (aa), 24-VII-1993; (aa), 28-VII-2002; 1♂ (aa), 15-VIII-2002. Transecto Seoane-Moreda: (aa), 13-VIII-2006.

Arethusana arethusa ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Citas previas: A Seara (Mostert, 2013).

Probablemente se deba a que no hemos prospectado lugares idóneos para la presencia de esta especie en su época de vuelo que no la hayamos encontrado en el área coureliana abarcada por nosotros.

Hypparchia alcyone ([Denis & Schiffermüller], 1775)

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); "Piapáxaro" [Pía Paxaro] (Pino Pérez & Castro González, 2012).

Nuevas citas: Alto do Couto: (a), 12-VII-1996. Campelo: 1♂, 5-VIII-1992 (g). Carbedo: 2♂♂, 5-VIII-1992 (g). Moreda: 1♂, 12-VII-1996 (g). Pacios: (a), 12-VII-1996. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂ y 1♀, 11-VIII-1990 (g); (aa), 12-VIII-1990; 1♂, 19-VII-1991 (g); 3♂♂, 20-VII-1991 (g); 3♂♂, 21-VII-1991 (g); 1♂ y 1♀, 5-VIII-1992; 1♂ y 1♀, 6-VIII-1992; (aa), 24-VII-1993; 3♂♂ y 2♀♀, 7-VIII-1993; 1♂, 9-VII-1994; (aa), 13-VIII-1994; (aa), 22-VII-1997; 1♂ y 1♀, 10-VII-1999; 1♂, 29-VII-2000; 1♂ y 1♀, 12-VIII-2001; 4♀♀ (ls), 2-IX-2001 (volada); 1♂, 28-VII-2002; 1♂, 15-VIII-2002; (aa), 23-VII-2006. Transecto Seoane-Moreda: (aa), 7-VIII-1992.

De un tiempo a esta parte, muchos autores contemplan como nombre válido para esta especie *hermione* Linnaeus, 1764, siguiendo a Kudrna (1977). Su concepción cuenta con importantes paladines entre reconocidos taxónomos. En Jutzeler (2016), relevante trabajo en donde se cuestiona dicha opinión, se compendia y discute detalladamente este asunto, demostrándose a nuestro parecer que la acción nomenclatural de Kudrna, aparte de ser inconveniente, está "viciada" en origen y que *alcyone* [Denis & Schiffermüller], 1775 es realmente el nombre válido para esta especie.

Hypparchia semele (Linnaeus, 1758)

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: (a), 2-IX-2007. Devesa da Rogueira: 1♂, 11-VIII-1990. Moreda: 1♂, 12-VII-1996. Pacios: (a), 12-VII-1996. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂ y 1♀, 11-VIII-1990; 1♂, 20-VII-1991; 2♂♂, 21-VII-1991; 1♂ y 1♀, 6-VIII-1992; 1♂, 7-VIII-1993; 1♂, 13-VIII-1994; 1♂, 10-VII-1999; 2♂♂ y 1♀, 29-VII-2000; 1♂ y 1♀, 12-VIII-2001; 3♀♀, 2-IX-2001; (a), 28-VII-2002; 4♂♂ y 2♀♀, 15-VIII-2002.

Neohipparchia statilinus (Hufnagel, 1766)

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); Devesa da Rogueira (Pino Pérez & Castro Gonzalez, 2012).

Nuevas citas: Campelo (encinar): 1♂, 11-VIII-1990. Carbedo: (aa), 13-VIII-1994. Carbedo (*supra*): 1♀, 2-IX-2001. Pacios: (aa), 14-VIII-1993. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 3♂♂, 11-

VIII-1990 (frecuente); 3♂♂, 12-VIII-1990; 1♂ (aa), 2-IX-2001. Transecto Seoane-Acampamento O Courel: (aa), 24-VIII-2014.

***Pseudotergumia fidia* (Linnaeus, 1767)**

Citas previas: A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Ferrería de Seoane: 1♀, 16-IX-2007. Monte Cido: 1♀ (ls), 2-X-2011 (muy volada). Moreda: 1♀, 12-IX-2010. Transecto Seoane-Moreda: 1♀ (aa), 13-VIII-2006; 2♀♀, 10-IX-2006.

***Erebia triaria* (De Prunner, 1798)**

Citas previas: "Sierra del Caurel" (Fernández Vidal, 1983); A Seara y Visuña (Fernández Vidal, 1984); O Courel (Fernández Vidal, 1992); "Courel" (Vila, 2004); A Seara (Mostert, 2013); Alto de Visuña (Dincă et al., 2015).

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂ y 2♀♀ (aa), 4-VII-1993 (volada); 20♂♂ y 2♀♀ (18♂♂ ls), 20-VI-1998 (abundante); 1♀, 2-VI-2002; 1♀, 3-VII-2005. Campelo: 1♂ (a), 5-IV-1997. Carbedo: 1♂, 5-VII-1993. Devesa da Rogueira: 1♀ (aa), 4-VII-1993 (muy volada); 1♂ (aa), 12-IV-1997. Moreda: (aa), 12-IV-1997. Pacios: 3♂♂ y 2♀♀, 15-VI-1996 (frecuente, volada); 14♂♂ y 2♀♀ (12♂♂ ls), 20-VI-1998 (abundante); 12♂♂ (7 ls), 2-VI-2001 (muy abundante); 6♂♂ y 1♀ (3♂♂ ls), 19-V-2002 (frecuente); 4♂♂, 23-V-2004. Transecto Alto do Couto-Carbedo: 28♂♂ y 9♀♀ (21♂♂ y 4♀♀ ls), 2-VI-2001 (muy abundante). Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 3♂♂ y 2♀♀, 5-VII-1993; 6♂♂ y 2♀♀, 11-VI-1994 (frecuente); 31♂♂ y 3♀♀ (20♂♂ ls), 4-VI-1995 (abundante); 6♂♂ y 6♀♀, 15-VI-1996 (abundante y frecuente en bebederos); 1♂ (aa), 10-VII-1999 (muy volada); 1♂, 19-V-2002.

***Erebia meolans* (De Prunner, 1798)**

Citas previas: A Seara (Mostert, 2013).

Aceptamos esta cita pero, como ya se dijo en la introducción, estimamos que necesita comprobación aunque no exista inconveniente ecológico ni biogeográfico para la presencia de esta especie en O Courel. En sus vertientes septentrionales nunca la hemos encontrado, pero sí ejemplares enanos de *E. palarica* que pudieran confundirse con ella.

***Erebia palarica* Chapman, 1905**

Citas previas: "Sierra del Caurel" (Fernández Vidal, 1983, 1988); "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); O Courel (Fernández Vidal, 1992); "Courel" (Vila, 2004); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: 6♂♂ y 1♀ (*), 24-VII-1993 (frecuente), (g); (a), 20-VI-1998; 1♀, 3-VII-2005. Devesa da Rogueira: (aa), 11-VIII-1990 (muy volada). Fonte de Carbedo: 1♂, 4-VI-1995. Moreda: 1♀, 22-VII-2001. Pacios: 2♂♂, 15-VII-1996. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂ y 1♀, 19-VII-1991 (volada); 5♂♂ y 2♀♀, 20-VII-1991; 4♂♂ y 1♀, 21-VII-1991 (g); 2♂♂, 5-VIII-1992 (muy volada); 2♂♂ y 2♀♀, 6-VIII-1992; 3♂♂, 24-VII-1993; 1♂ (*), 7-VIII-1993, (g); 6♂♂ y 2♀♀, 9-VII-1994; 2♂♂, 15-VI-1996; 3♂♂ y 1♀ (*), 22-VII-1997, (g); 3♂♂, 10-VII-1999; 2♂♂, 28-VII-2002; 1♂, 23-VII-2006.

(*) ♂♂ de envergadura muy pequeña, por lo que aparentemente pudieran pasar por *Erebia meolans*.

***Melanargia galathea* (Linnaeus, 1758)**

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991).

Nuevas citas: Alto do Couto: 6♂♂ y 3♀♀ (2♀♀ ls), 24-VII-1993 (abundante); 1♂, 14-VIII-1993 (frecuente, volada); 4♂♂ y 2♀♀, 12-VII-1996 (frecuente); 1♂, 20-VI-1998; (aa), 3-VII-2005. Devesa da Rogueira: 5♂♂, 4-VII-1993; (aa), 3-VII-2005 (frecuente). Moreda: 1♂ (aa), 24-VII-1993 (frecuente); 2♀♀, 12-VII-1996; (aa), 23-VII-2006; 1♀, 3-VIII-2008. Pacios: (aa), 14-VIII-1993;

2♂♂ y 1♀, 12-VII-1996 (abundante); (aa), 22-VII-2002. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂ y 2♀♀, 11-VIII-1990 (volada); 1♀, 12-VIII-1990; 2♂♂ y 2♀♀, 19-VII-1991 (muy abundante); 4♂♂ y 3♀♀, 20-VII-1991; 3♂♂ y 4♀♀, 21-VII-1991; 4♂♂ y 2♀♀, 5-VIII-1992 (abundante, volada); 2♂♂ y 2♀♀, 6-VIII-1992; 6♂♂ y 3♀♀ (♀♀, ls), 24-VII-1993 (abundante); 12♂♂ y 6♀♀ (6♂♂ y 3♀♀, ls), 7-VIII-1993 (abundante); 2♂♂ y 1♀, 9-VII-1994 (muy abundante); 1♂, 13-VIII-1994 (♀♀ ya muy voladas); 20♂♂ y 4♀♀ (15♂♂ ls), 22-VII-1997 (abundante); 4♂♂ y 1♀, 10-VII-1999 (abundante); 3♀♀, 29-VII-2000; 3♂♂ y 3♀♀, 22-VII-2001; 1♀, 12-VIII-2001; 4♂♂ y 3♀♀, 28-VII-2002 (muy abundante); (aa), 15-VIII-2002 (frecuente, volada); (aa), 23-VII-2006. Transecto Carbedo-Seoane: 4♂♂, 5-VII-1993. Transecto Seoane-Moreda: 1♀, 7-VIII-1992 (frecuente, volada); (aa), 30-VII-2006.

Melanargia lachesis (Hübner, 1790)

Citas previas: Punto en cuadrícula 29TPH51 (SGHN, 2001); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂, 12-VIII-2001. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂, 19-VII-1991; 1♂ y 1♀, 21-VII-1991; 2♀♀, 6-VIII-1992; 1♂, 10-VII-1999.

Mucho menos abundante y más localizada que la anterior especie en las áreas prospectadas. Los ejemplares relacionados pueden considerarse completamente esporádicos. En contra de lo que pudiera esperarse, nunca la hemos encontrado por debajo de los 800 m, algo incomprensible para nosotros aunque probablemente se trate de simple falta de oportunidad, por no haberla buscado en áreas y lugares idóneos para su presencia. Tenemos noticia de que es frecuente en áreas no calizas de O Courel (de Folgoso do Courel a Froxán, al menos).

Melanargia russiae (Esper, 1784)

Citas previas: A Seara (Fernández Vidal, 1988a); O Courel (Fernández Vidal, 1992); Piapáxaro [Pía Paxaro] (Pino Pérez & Castro Gonzalez, 2012); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂, 11-VIII-1990 (muy volado); 1♂ y 1♀, 19-VII-1991 (abundante, localizada); 4♂♂ y 3♀♀, 20-VII-1991; 5♂♂ y 4♀♀, 21-VII-1991; 1♂ y 1♀, 5-VIII-1992; 1♂ y 1♀, 6-VIII-1992; 1♂, 24-VII-1993; 1♂, 7-VIII-1993; 5♂♂ y 2♀♀, 9-VII-1994; 1♀, 10-VII-1999; (aa), 29-VII-2000; (aa), 28-VII-2002; (a), 15-VIII-2002.

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂, 24-VII-1993; (aa), 12-VII-1996. Carbedo (encinar): (aa), 5-VIII-1992; (aa), 7-VIII-1993. Carbedo (*supra*): (aa), 2-IX-2001. Devesa da Rogueira: 1♀ (aa), 4-VII-1993; (aa), 10-VII-1999; (aa), 3-VII-2005. Ferrería de Seoane: (aa), 23-VII-2006; (aa), 16-IX-2007. Moreda: (aa), 24-VII-1993; 1♂, 12-VII-1996; (aa), 22-VII-2001; (aa), 23-VII-2006; (aa), 3-VIII-2008. Pacios: (aa), 12-VII-1996. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 2♂♂, 21-VII-1991; 1♂, 5-VIII-1992; 1♂ y 1♀, 6-VIII-1992; 2♂♂, 5-VII-1993; 1♂ y 1♀, 7-VIII-1993; (aa), 13-VIII-1994; 1♂, 15-VI-1996; (aa), 10-VII-1999; (aa), 29-VII-2000; (aa), 12-VIII-2001; (aa), 15-VIII-2002. Transecto Carbedo-Alto do Couto: 2♂♂, 5-VII-1993; (aa), 9-VII-1994; (aa), 22-VII-2001. Transecto Seoane-Acampamento O Courel: (aa), 24-VIII-2014. Transecto Seoane-Moreda: (aa), 7-VIII-1992 (frecuente, volada); (aa), 30-VII-2006; (aa), 13-VIII-2006; (aa), 10-IX-2006.

Hyponephele lycaon (Kühn, 1774)

Citas previas: A Seara (Fernández Vidal, 1988); A Seara (Mostert, 2013).

Probablemente sólo esté distribuida en el área sudoriental de O Courel, que apenas hemos muestreado, por lo que no podemos aportar nuevas citas.

Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)

Citas previas: Moreda (Pino Pérez *et al.*, 2008); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: 3♂♂, 24-VII-1993; (aa), 12-VII-1996; 1♂, 3-VII-2005. Carbedo (encinar): 2♂♂, 9-VII-1994. Devesa da Rogueira: 3♂♂, 4-VII-1993; (aa), 10-VII-1999; (aa), 3-VII-2005. Moreda: 6♂♂, 12-VII-1996 (frecuente); (aa), 28-VII-2002. Pacios: 1♂, 28-VII-2002 (frecuente, volada). Romeor: (aa), 9-VII-1994. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 6♂♂, 19-VII-1991; 5♂♂, 20-VII-1991; 1♂ y 2♀♀, 21-VII-1991 (frecuente); 1♀, 5-VIII-1992 (frecuente, volada); (aa), 6-VIII-1992 (frecuente, volada); 4♂♂, 24-VII-1993; 2♂♂ y 1♀, 7-VIII-1993; 1♂, 22-VII-1997; 2♀♀, 10-VII-1999; 5♂♂, 29-VII-2000 (frecuente); 1♂, 22-VII-2001; 1♂, 28-VII-2002 (frecuente); (aa), 23-VII-2006. Transecto Seoane-Moreda: (aa), 7-VIII-1992 (frecuente, volada).

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto (*sub*): 1♂ y 1♀, 29-VII-2000 (muy abundante). Campelo (encinar): (aa), 11-VIII-1990 (abundante); (aa), 20-VII-1991; 1♀, 5-VIII-1992 (abundante). Carbedo: 1♀, 5-VIII-1992 (abundante). Carbedo (*supra*): (aa), 2-IX-2001. Ferrería de Seoane: (aa), 23-VII-2006; (aa), 16-IX-2007. Folgoso do Courel: 1♀ (ls) (aa), 23-VIII-2017. Fonte de Carbedo: (aa), 5-VIII-1992. Moreda: 1♂ y 1♀, 24-VII-1993 (frecuente); (aa), 12-VII-1996; (aa), 22-VII-2001 (frecuente); 1♂, 12-VIII-2001; 2♂♂, 28-VII-2002 (abundante); (aa), 23-VII-2006; (aa), 3-VIII-2008. Pacios: 3♂♂, 28-VII-2002 (abundante). Transecto Alto do Couto-Carbedo: (aa), 22-VII-2001 (abundante). Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂ y 1♀, 11-VIII-1990; (aa), 12-VIII-1990; 4♂♂, 19-VII-1991 (abundante); 1♂, 20-VII-1991; 1♂ y 1♀, 5-VIII-1992; 1♂, 6-VIII-1992; 1♂ y 1♀, 7-VIII-1993; (aa), 9-VII-1994; (aa), 13-VIII-1994; 1♀, 12-VIII-2001; (aa), 28-VII-2002; 1♂ (aa), 15-VIII-2002; (aa), 23-VII-2006. Transecto Seoane-Acampamento O Courel: (aa), 24-VIII-2014. Transecto Seoane-Moreda: (aa), 7-VIII-1992 (abundante); (aa), 30-VII-2006; (aa), 13-VIII-2006; (aa), 10-IX-2006.

Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)

No existen citas previas.

Nuevas citas: Transecto Ferramulín-Hórreos: 4♂♂, 5-VII-1994.

Nueva para O Courel.

Pyronia bathseba (Fabricius, 1793)

Citas previas: A Seara (Mostert, 2013).

En Fernández Vidal (1992: 164) no explicitamos que esta inconfundible especie estuviera presente en O Courel sino indicando que, por lo que respecta a territorio gallego, estaba "restringida a unos pocos enclaves en el sur orensano y SE lucense"; más adelante (p. 204) la reseñamos como presente en la provincia de Lugo, sin que se precisara confirmación porque poseíamos dos hembras (muy voladas y rotas, debido a impropio método de captura) procedentes de las cercanías de Ferramulín (recolectadas por un compañero ajeno a la lepidopterología a principios de agosto de 1983). Pudiera parecer extraño que los adultos de esta especie vuelen en el sur orensano desde finales de abril a junio por lo general y lo hagan en O Courel hasta agosto, pero no lo es que sea una especie tan tardía en áreas montañosas del extremo norte de su distribución geográfica ibérica; nosotros hemos recolectado en varias ocasiones hembras voladas en pleno agosto en las vertientes leonesas de la Cordillera Cantábrica, en localidades sobre los 1300-1500 m de altitud (Rabanal de Luna, Sierra de Alceo, Collada de Aralla, etc.) donde, por lo general, la especie vuela de mayo a julio.

Estas notas no pretenden deslucir la cita previa reseñada (primera concreta para O Courel) sino

hacer hincapié en que la presencia de esta especie en alguna localización de las cercanías de A Seara es fidedigna e incitar a que otros colegas traten de encontrar sus colonias, algo que también personalmente esperamos intentar en el futuro.

***Coenonympha pamphilus* (Linnaeus, 1758)**

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂, 4-VII-1993; 2♂♂, 20-VI-1998. Campelo (encinar): (aa), 11-VIII-1990. Carbedo (castelo): 1♂, 19-V-2002. Carbedo (*supra*): (aa), 2-IX-2001. Devesa da Rogueira: 1♂ (aa), 24-IV-2002. Ferramulín: (aa), 5-IV-1997. Moreda: 2♂♂, 11-VI-1994; 1♂, 5-IV-1997; 1♂, 12-IV-1997; 1♂ y 1♀, 19-V-2001; 1♂, 25-IV-2004; (aa), 8-V-2004; (aa), 23-V-2004. Pacios: (aa), 15-VI-1996; 1♂, 19-V-2001; 2♂♂, 2-VI-2001; 1♂, 24-IV-2002; (aa), 19-V-2002; 1♀, 8-V-2004; (aa), 23-V-2004 (abundante). Pontalor: (aa), 7-IV-2017. Transecto Alto do Couto-Carbedo: 1♂ y 1♀, 2-VI-2001. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♀, 5-VIII-1992; 1♂ y 1♀, 6-VIII-1992; 2♂♂, 5-VII-1993; 1♂ y 2♀♀, 13-VIII-1994; 1♀, 4-VI-1995; 1♂, 15-VI-1996; (aa), 19-V-2002; (aa), 28-VII-2002. Transecto Seoane-Moreda: (aa), 7-VIII-1992; (aa), 13-VIII-2006. Visuña: (aa), 5-IV-1997.

En este trabajo consideramos a *lyllus* Esper, 1805 como simple forma de *pamphilus*, dado que está presente en pequeña proporción en algunos de los demes de la especie en O Courel y hemos observado cópulas entre ambas.

***Coenonympha dorus* (Esper, 1782)**

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Moreda: 1♀ (ls), 3-VIII-2008. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂, 11-VIII-1990; 2♂♂ y 1♀, 21-VII-1991 (localizada); 4♂♂, 5-VIII-1992 (muy localizada); 1♂, 6-VIII-1992; 3♂♂, 7-VIII-1993 (localizada); 2♂♂, 9-VII-1994; 2♂♂, 13-VIII-1994; 1♂ (ls), 22-VII-1997; 1♂, 10-VII-1999; 2♂♂, 29-VII-2000; 1♂, 22-VII-2001; 4♂♂, 12-VIII-2001; 3♂♂ y 2♀♀, 2-IX-2001; 1♂, 28-VII-2002; 1♂, 15-VIII-2002 (muy localizada).

***Coenonympha arcania* (Linnaeus, 1761)**

Citas previas: A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♀♀, 24-VII-1993; 1♂ y 2♀♀, 12-VII-1996; (aa), 3-VII-2005. Devesa da Rogueira: 4♂♂, 4-VII-1993; (aa), 3-VII-2005. Moreda: (aa), 24-VII-1993; 1♂, 11-VI-1994; 2♂♂, 12-VII-1996; (aa), 28-VII-2002 (volada). Pacios: 5♂♂, 15-VI-1996; (aa), 12-VII-1996; 2♂♂, 28-VII-2002. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 7♂♂ y 6♀♀, 19-VII-1991 (frecuente); 3♂♂ y 4♀♀, 20-VII-1991; 2♂♂, 21-VII-1991; (aa), 5-VIII-1992; 2♂♂ y 1♀, 6-VIII-1992; 4♂♂ y 2♀♀, 24-VII-1993 (abundante); 1♂, 7-VIII-1993 (frecuente, volada); 3♂♂, 9-VII-1994 (frecuente); 2♂♂, 15-VI-1996; 19♂♂ y 2♀♀ (15♂♂ ls), 22-VII-1997; (aa), 10-VII-1999 (abundante); 1♂, 29-VII-2000; 2♂♂ y 2♀♀ (1♀ ls), 22-VII-2001; 1♀, 12-VIII-2001; 1♀, 28-VII-2002; 1♀, 15-VIII-2002. Transecto Carbedo-Seoane: 8♂♂, 5-VII-1993 (frecuente).

***Coenonympha iphioides* Staudinger, 1870**

Citas previas: "Caurel" (Fernández Vidal, 1988); A Seara (Mostert, 2013), como *Coenonympha glycerion* [(Borkhausen, 1788)].

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♀, 12-VII-1996; (aa), 3-VII-2005. Devesa da Rogueira: 1♂, 4-VII-1993. Moreda: (a), 20-VI-1998. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 3♀♀, 19-VII-1991 (localizada, volada); 1♂, 20-VII-1991; 2♂♂ y 2♀♀, 24-VII-1993; (aa), 7-VIII-1993 (localizada en prados de ladera); 1♂, 9-VII-1994; 1♂, 15-VI-1996; 1♂ y 1♀, 22-VII-1997; 2♂♂ y 1♀, 10-VII-1999; 1♀, 29-VII-2000; (aa), 22-VII-2001 (localizada en prados de ladera).

***Pararge aegeria* (Linnaeus, 1758)**

Citas previas: A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: (aa), 12-VII-1996; 1♂ y 1♀, 20-VI-1998; (aa), 23-VII-2006; (aa), 7-IV-2017. Devesa da Rogueira: (aa), 10-VII-1999; (aa), 24-IV-2002; (aa), 3-VII-2005. Ferramulín: (aa), 5-IV-1997. Ferrería de Seoane: (aa), 23-VII-2006; (aa), 16-IX-2007. Folgoso do Courel: (aa), 23-VIII-2017. Monte Cido: (aa), 2-X-2011 (frecuente). Moreda: (aa), 11-VI-1994; (aa), 12-VII-1996; (aa), 5-IV-1997; (aa), 12-IV-1997; 1♂, 10-IV-1999; 1♂, 19-V-2001; 1♀, 12-VIII-2001; 2♂♂, 28-VII-2002; 2♂♂, 25-IV-2004; 2♂♂, 8-V-2004; (aa), 23-V-2004; (aa), 23-VII-2006; (aa), 3-VII-2008; (aa), 12-IX-2010. Pacios: (aa), 12-VII-1996; 1♀, 24-IV-2002; (aa), 23-V-2004. Pontalor: (aa), 7-IV-2017. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: (aa), 24-VII-1993 (escasa y localizada en lugares umbrios); 1♀, 11-VI-1994; (a), 13-VIII-1994; (aa), 4-VI-1995; 1♂, 22-VII-1997; 1♂, 10-VII-1999; (aa), 22-VII-2001; (aa), 12-VIII-2001; (aa), 4-V-2016; (a), 2-VI-2016; (aa), 29-IX-2016. Transecto Seoane-Moreda: (aa), 30-VII-2006; (aa), 10-IX-2006. Visuña: (aa), 5-IV-1997.

***Lasiommata megera* (Linnaeus, 1767)**

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991).

Nuevas citas: Alto do Couto: 1♂, 24-VII-1993; 1♂ y 1♀, 20-VI-1998 (frecuente). Carbedo (*supra*): 1♂, 2-IX-2001; 1♂, 12-IX-2010. Ferramulín: 1♂ y 2♀♀, 5-IV-1997. Monte Cido: (aa), 2-X-2011 (frecuente). Pacios: (aa), 15-VI-1996; (aa), 19-V-2002. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 1♂, 11-VIII-1990; 2♂♂, 5-VII-1993 (frecuente en los prados de ladera); (aa), 11-VI-1994; (a), 9-VII-1994; 1♂, 13-VIII-1994; 3♂♂, 4-VI-1995; (a), 15-VI-1996; 1♂, 22-VII-1997; 1♂, 29-VII-2000; 1♂, 22-VII-2001; 4♂♂, 2-IX-2001; (aa), 19-V-2002; (a), 4-V-2016; (a), 29-IX-2016. Transecto Seoane-Moreda: (aa), 13-VIII-2006; (aa), 10-IX-2006. Visuña: (aa), 5-IV-1997.

***Lasiommata maera* (Linnaeus, 1758)**

Citas previas: "Monte Formigueiros" (Fernández Vidal, 1991); A Seara (Mostert, 2013).

Nuevas citas: Alto do Couto: 2♂♂ y 1♀, 4-VII-1993; 2♂♂ y 2♀♀, 24-VII-1993; 3♂♂ y 1♀, 12-VII-1996; (aa), 3-VII-2005. Devesa da Rogueira: 1♀, 4-VII-1993; (aa), 10-VII-1999. Ferrería de Seoane: (aa), 23-VII-2006. Moreda: (aa), 11-VI-1994; (aa), 12-VII-1996; (aa), 23-VII-2006; (aa), 3-VIII-2008. Pacios: 2♂♂, 15-VI-1996; (aa), 12-VII-1996; 2♂♂, 20-VI-1998. Transecto Alto do Couto-Carbedo: 1♂ (aa), 2-VI-2001. Transecto Alto do Couto-Devesa da Rogueira: 2♂♂, 11-VIII-1990 (g); 7♂♂, 19-VII-1991 (abundante); 2♂♂ y 2♀♀, 20-VII-1991; 3♂♂ y 1♀, 21-VII-1991; 1♂, 5-VIII-1992; 1♂ y 1♀, 5-VIII-1992; 2♂♂ y 3♀♀, 6-VIII-1992; 2♂♂ y 1♀, 5-VII-1993; 1♂ y 4♀♀, 24-VII-1993; 1♂ y 1♀, 7-VIII-1993; (a), 11-VI-1994; 3♂♂ y 1♀, 9-VII-1994 (abundante); (a), 13-VIII-1994; 1♂, 4-VI-1995; (aa), 15-VI-1996; 5♂♂ y 1♀, 22-VII-1997; 1♂, 10-VII-1999 (abundante, volada); (aa), 29-VII-2000; 2♂♂, 22-VII-2001; 1♂, 12-VIII-2001; 1♀, 15-VIII-2002. Transecto Seoane-Moreda: 1♂, 7-VIII-1992; (aa), 30-VII-2006.

Conclusiones y consideraciones

Hemos elaborado un catálogo de las especies de Satyridae (*sensu classico*) presentes en O Courel (Lugo), listando las citadas en la bibliografía precedente (22 recogidas en 12 trabajos), así como relacionando pormenorizadamente 451 nuevos registros correspondientes a 860 ejemplares de 21 especies. Añadimos una especie más (*P. cecilia*) a dicho catálogo.

A juzgar por los datos conocidos hasta el presente y a diferencia de su preponderancia en otras familias de lepidópteros, no se erige O Courel como la comarca más biodiversa en satíridos de Galicia, no siéndole exclusivo ninguno. Prácticamente se iguala en número de especies (no así en su composición) a las áreas de Ancares y Trevinca. Sin embargo estimamos que sea de lo más probable que se aumente su

censo en satíridos cuando se investiguen zonas no visitadas hasta ahora a este respecto, sobre todo de su cuadrante sudoriental. Eludimos comentar qué otras especies ibéricas o ya citadas de otras partes de Galicia pudieran también poblar O Courel, por estimar que sería demasiado hipotético.

Agradecimiento

A mi esposa Antonia Rodríguez Fandiño, colaboradora imprescindible para llevar a cabo mis labores entomológicas y en cuya compañía recolectamos parte del material relacionado en este trabajo.

Bibliografía

Agenjo, R. 1961. Morfología y distribución geográfica en España de *Hipparchia alcyone* (Schiff., 1776). *Graellsia*, **19**: 3-10.

Dincă, V.; Montagud, S.; Talavera, G.; Hernández-Roldán, J.; Munguira, M.L.; García-Barros, E.; Hebert, P.D.N. & Vila, R. 2015. DNA barcode reference library for Iberian butterflies enables a continental-scale preview of potential cryptic diversity. *Scientific Reports*, **5** [12395] DOI: 10.1038/srep12395. [12 pp.]; "Supplementary information" en <http://www.nature.com/srep>. [197 pp.].

Fernández Vidal, E.H. 1983. Acerca de las relaciones existentes entre los lepidópteros y el medio geológico. El género *Erebia* en la región gallega. Descripción de una nueva subespecie. *Cuadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe*, **6**: 99-151.

Fernández Vidal, E.H. 1984. Contribución al conocimiento sobre la morfología y distribución geográfica de la *Erebia triarius* (De Prunner, 1798) en la región gallega. (Lep. Satyridae). *Cuadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe*, **7**: 221-238.

Fernández Vidal, E.H. 1988a. Notas Lepidopterológicas del Noroeste Peninsular (VII). Casayo, ochenta años después (1ª. Parte). *SHILAP Revista de lepidopterología*, **16**(62): 141-157.

Fernández Vidal, E. H. 1988b. Notas lepidopterológicas del Noroeste Peninsular. (VII). Casayo, ochenta años después (2ª. Parte). *SHILAP Revista de lepidopterología*, **16**(64): 335-353.

Fernández Vidal, E.H. 1991. Notas lepidopterológicas del Noroeste peninsular (X). Una nueva subespecie gallega de *Aricia morronensis* (Ribbe, 1910) (Lepidoptera: Lycaenidae). *SHILAP Revista de lepidopterología*, **19**(75): 197.

Fernández Vidal, E.H. 2016. Lepidópteros de O Courel (Lugo, Galicia, España, N.O. Península Ibérica) I: Geometridae. (Lepidoptera). *Arquivos Entomolóxicos*, **15**: 297-320.

García-Barros, E. M.; Munguira, L.; Stefanescu, C. & Vives Moreno, A. 2013. *Lepidoptera Papilionoidea*. In Ramos, M.A. et al. (Eds.). *Fauna Ibérica*, vol. 37: 1213 pp. Museo Nacional de Ciencias Naturales. CSIC. Madrid.

Higgins, L.G. 1975. *The Classification of European Butterflies*: 320 pp. Collins. London.

Jutzeler, D. 2016. Doubts about the validity of the species name *Hipparchia hermione* Linnaeus, 1764 (Lepidoptera: Satyrinae) introduced by Kudrna (1977). *Entomologica romanica*, **20**: 5-56.

Kudrna, O. 1977. *A revision of the genus Hipparchia Fabricius*: 300 pp. E. W. Clasey Ltd. Faringdon.

López Vaamonde, C.; Estévez Rodríguez, R. & Pino Pérez, J.J. 1991. Datos corológicos de interés faunístico para la lepidopterología gallega. In Noticias generales. *SHILAP Revista de lepidopterología*, 19(76): 300-303.

Mostert, K. 2013. *Other taxonomic groups. Diurnal butterflies*. In Mostert, K. & Willensen, J. (eds.). *Mammal survey Serra do Courel Galicia, Spain*. Uitgave van den Veldwerkgroep van den Zoogdierverseniging. Rapport 2013.029: 42-43. Nijmegen.

Pino Pérez, J.J.; Camaño Portela, J.L.; Silva-Pando, F.J. & Pino Pérez, R. 2008. Aportaciones corológicas para Rhopalocera (Lepidoptera) del N de España. *Boletín BIGA*, 4: 59-86.

Pino Pérez, J.J. & Castro González, J. 2012. Algunos lepidópteros gallegos de la colección del Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña). *Boletín BIGA*, 11: 53-68.

SGHN. 2001. Os nosos insectos: *Melanargia lachesis* (Hubner, 1790). Paspallás, *Boletín divulgativo da Sociedade Galega de Historia Natural*, 31: 8.

Vila, M. 2004. *Effects of environmental changes during the Quaternary on the distribution of extant species. The case of the butterflies Erebia triaria and E. palarica*: 249 pp. Instituto Universitario de Xeoloxía. Universidade da Coruña.

Warren, B.C.S. 1936. *Monograph of the genus Erebia*: 407 pp., 104 láms. British Museum (Natural History). London.

Tabla I: Localidades y/o localizaciones gallegas citadas.

Nombre	Municipio	Provincia	Altitud	UTM 10x10
Acampamento O Courel	Folgoso do Courel	Lugo	610	29TPH52
Alto de Visuña	Folgoso do Courel	Lugo	1290	29TPH51
Alto do Couto	Folgoso do Courel	Lugo	1300-1340	29TPH51
Alto do Couto (sub)	Folgoso do Courel	Lugo	1200-1300	29TPH51
A Seara	Quiroga	Lugo	710	29TPH51
Campelo	Folgoso do Courel	Lugo	980	29TPH52
Campelo (encinar)	Folgoso do Courel	Lugo	1005	29TPH52
Carbedo	Folgoso do Courel	Lugo	740	29TPH52
Carbedo (castelo)	Folgoso do Courel	Lugo	915	29TPH52
Carbedo (supra)	Folgoso do Courel	Lugo	1050	29TPH52
Devesa da Rogueira	Folgoso do Courel	Lugo	730-1200	29TPH52
Ferramulín	Folgoso do Courel	Lugo	807	29TPH51
Ferrería de Seoane	Folgoso do Courel	Lugo	547	29TPH52
Ferrería Vella X	Folgoso do Courel	Lugo	535	29TPH52
Folgoso do Courel	Folgoso do Courel	Lugo	612	29TPH41
Fonte de Carbedo	Folgoso do Courel	Lugo	730	29TPH52
Fontes do Cervo	Folgoso do Courel	Lugo	1460	29TPH51
Froxán	Folgoso do Courel	Lugo	478	29TPH41
Hórreos	Folgoso do Courel	Lugo	1032	29TPH61
Monte Cido	Folgoso do Courel	Lugo	680	29TPH52

Nombre	Municipio	Provincia	Altitud	UTM 10x10
Monte Formigueiros	Folgoso do Courel	Lugo	1360-1500	29TPH51
Moreda	Folgoso do Courel	Lugo	800-830	29TPH52
Pacios	Pedrafita do Cebreiro	Lugo	830	20TPH52
Paderne	Folgoso do Courel	Lugo	912	29TPH42
Pía Paxaro	Folgoso do Courel	Lugo	1400-1560	29TPH51
Pontalor	Pedrafita do Cebreiro	Lugo	1155	29TPH52
Romeor	Folgoso do Courel	Lugo	915	29TPH52
Seoane	Folgoso do Courel	Lugo	640	29TPH52
Visuña	Folgoso do Courel	Lugo	1087	29TPH51