

ALGEBRAS DE BANACH-LA TEORIA DE GELFAND (*)

JANUARIO VARELA

En la presente exposición se tratará la teoría de Gelfand para álgebras de Banach conmutativas; como caso particular se considerarán las C^* -álgebras y se establece la célebre dualidad entre la categoría de los espacios compactos y la categoría de las C^* -álgebras conmutativas con elemento unidad.

La teoría de las álgebras de Banach es más o menos reciente; a su período de gestación están vinculados los nombres de A.D. Michal, R. S. Martin, M. Nagumo, K. Yosida, J. von Neumann, N. Wiener, M. H. Stone y otros.

El nacimiento de la teoría se localiza en 1941 con la aparición del famoso artículo de I. M. Gelfand Normierte Ringe donde se empieza a hacer uso sistemático de la teoría elemental de ideales en el estudio de estas álgebras.

El autor desea agradecer al Dr. Alonso Takahashi, Director del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, su invitación para participar en el IV Coloquio Colombiano de Matemáticas.

1. **Definición.** Un álgebra normada A es un álgebra sobre C provista de una

(*) Este artículo es el texto de la conferencia dictada por el autor en el IV Coloquio Colombiano de Matemáticas. N. del E.

norma tal que

- 1) $\|xy\| \leq \|x\| \|y\|$ para todo $x \in A, y \in A$
- 2) Si A tiene elemento unidad, entonces $\|1\| = 1$

Si además A es completo, es decir si toda sucesión de Cauchy de elementos de A es convergente en A , entonces A se llama *álgebra de Banach*.

2. **Ejemplos.** 1) El ejemplo más sencillo de *álgebra de Banach* con elemento unidad es $A = C$, el álgebra de los números complejos con las operaciones y la norma acostumbradas.

2) Sean T un espacio compacto (separado) y $A = C(T)$ el álgebra de todas las funciones continuas de T en C . Las operaciones se definen puntualmente y la norma está dada por

$$\|f\| = \sup \{ |f(t)| \mid t \in T \}$$

para todo $f \in C(T)$.

Sean H un espacio de Hilbert y $\mathcal{L}(H)$ el espacio de todos los operadores lineales acotados sobre H , como multiplicación se toma la composición y como norma

$$\|a\| = \sup \{ \|a(v)\| \mid \|v\| \leq 1 \}$$

3. Sean A un álgebra de Banach con elemento unidad y $a \in A$.

Si a tiene inverso en A , esto es si existe $b \in A$ tal que $ab = ba = 1$, se dice que a es *regular* en caso contrario a es *singular*.

De la completitud de A se deduce que si $x \in A$ y $\|x\| < 1$, entonces la serie $1 + x + x^2 + \dots$ es convergente en A y su suma es $(1-x)^{-1}$. En particular si $a \in A$ es tal que $\|1-a\| < 1$ entonces a es regular.

Si se designa por G el grupo multiplicativo de los elementos regulares de A , entonces la aplicación

$$x \mapsto x^{-1} : G \longrightarrow G$$

es continua; en efecto,

$$\|x^{-1} - a^{-1}\| = \|x^{-1}(a-x)a^{-1}\| \leq \|x^{-1}\| \|a-x\| \|a^{-1}\|,$$

además $x = a-b = a(1-a^{-1}b)$ donde $b = a-x$, así que si $\|b\| < \|a^{-1}\|^{-1}$ entonces $x^{-1} = (1-a^{-1}b)^{-1}a^{-1}$, la existencia de $(1-a^{-1}b)^{-1}$ está asegurada por $\|b\| < \|a^{-1}\|^{-1}$, más aún $\|x^{-1}\| \leq (1-\|a^{-1}b\|)^{-1}\|a^{-1}\| \leq (1-\|a^{-1}\| \|b\|)^{-1}\|a^{-1}\|$. Con esto queda establecido que $\|x^{-1} - a^{-1}\|$ es arbitrariamente pequeño cuando $\|x-a\|$ es suficientemente pequeño.

El grupo G de los elementos regulares de A es abierto, porque si $a \in G$ y $b \in A$ es tal que $\|b\| \leq \|a^{-1}\|^{-1}$, entonces $(1-a^{-1}b)^{-1}$ existe y $(a-b)^{-1} = (1-a^{-1}b)a^{-1}$.

4. Sean A un álgebra sobre C con elemento unidad y $x \in A$. Se llama *espectro* de x y se nota $Sp x$ el conjunto de todos los números complejos λ tales que $x - \lambda I$ es singular en A . Si A es un álgebra de Banach para $\lambda \in Sp x$ se tiene $|\lambda| \leq \|x\|$, pues en caso contrario $\|\frac{x}{\lambda}\| < 1$ lo cual aseguraría que $x - \lambda I = -\lambda(1 - \frac{x}{\lambda})$ es regular contrariamente a la hipótesis.

5. Sean A un álgebra sobre C con elemento unidad, entonces $Sp x^n = (Sp x)^n$ para todo $x \in A$, en efecto, dado un número complejo se consideran sus n raíces enésimas $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, entonces

$$x^n - \lambda I = (x - \lambda_1 I)(x - \lambda_2 I) \dots (x - \lambda_n I).$$

De manera que $x^n - \lambda I$ es singular si y sólo si $x - \lambda_i I$ es singular para algún i , de donde resulta la identidad propuesta.

Más generalmente se tiene $Sp p(x) = p(Sp x)$ para todo polinomio p con coeficientes complejos, es decir μ pertenece $Sp p(x)$ si y sólo si μ es de la forma $\mu = p(\lambda)$ para algún $\lambda \in Sp x$.

En efecto, sea $\lambda \in Sp x$. Consideremos el siguiente polinomio q en la indeterminada t , $q(t) = p(t) - p(\lambda)$.

Como $q(\lambda) = 0$, entonces q es de la forma $q(t) = \alpha (t - \lambda) (t - \lambda_1) \dots (t - \lambda_n)$ donde $\alpha, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in C$.

Por hipótesis $x - \lambda I$ es singular, por consiguiente $q(x) = \alpha (x - \lambda I) (x - \lambda_1 I) \dots (x - \lambda_n I) = p(x) - p(\lambda) I$ es singular, es decir, $p(\lambda) \in Sp p(x)$.

Recíprocamente, sea $\mu \in Sp (p(x))$. Consideremos el polinomio $q(t) = p(t) - \mu$ en la indeterminada t y denotemos por $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_m$ sus raíces, entonces $p(x) - \mu = q(x) = \beta (x - \zeta_1 I) \dots (x - \zeta_m I)$ para algún $\beta \in C$ y por consiguiente existe $\lambda_i, 1 \leq i \leq m$, tal que $x - \zeta_i I$ es singular, esto es, μ es de la forma $\mu = p(\zeta_i)$ con $\zeta_i \in Sp x$.

Ejercicio. Si $\lambda \in Sp(xy)$ y $\lambda \neq 0$ entonces $\lambda \in Sp(yx)$.

6. Sean A un álgebra sobre C con elemento unidad y $x \in A$. Se define el **radio espectral** $r(x)$ de x mediante la fórmula

$$r(x) = \sup \{ |\lambda| \mid \lambda \in Sp x \}$$

En virtud de 4, si A es un álgebra de Banach, $r(x) \leq \|x\|$ para todo $x \in A$.

7. **Teorema.** Para todo elemento x de un álgebra de Banach con elemento unidad se tiene

i) $S_p x$ es un subconjunto compacto y no vacío del plano

$$\text{ii) } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n} = r(x)$$

Demostración. i) $S_p x$ es compacto debido a que está acotado por $\|x\|$ y es cerrado pues el conjunto de los elementos regulares es abierto en A .

Ahora supongamos que $S_p x$ fuera vacío, en este caso $x - \lambda I$ sería regular para todo $\lambda \in \mathbb{C}$.

Sea l una forma lineal acotada sobre A , se define

$$f(\lambda) = l((x - \lambda I)^{-1})$$

Esta es una función compleja de variable compleja analítica en todo punto del plano.

Para ver que f es analítica se verifica que $\frac{df}{d\lambda} = l((x - \lambda I)^{-2})$ haciendo uso de la continuidad de $x \rightarrow x^{-1} : G \rightarrow G$. Además $\lim_{|\lambda| \rightarrow \infty} f(\lambda) = 0$, así que por el teorema de Liouville f es idénticamente igual a 0 . En particular $0 = f(0) = l(x^{-1})$. Esto es absurdo puesto que existe una forma lineal acotada l sobre A tal que $l(x^{-1}) \neq 0$. Por consiguiente $S_p x$ es no vacío.

ii) Supongamos que $\lambda \in S_p x$. Entonces $\lambda^n \in S_p x^n$ y por lo tanto $|\lambda^n| \leq \|x^n\|$. Esto demuestra que $r(x) \leq \liminf \|x^n\|^{1/n}$. Falta por demostrar que

$$r(x) \geq \limsup \|x^n\|^{1/n}.$$

Para cada forma lineal acotada l sobre A definamos de nuevo

$$f(\lambda) = l((x - \lambda I)^{-1})$$

esta función es analítica en $\mathbb{C} \setminus S_p x$. Por otra parte si $|\lambda| > \|x\|$, esto es, si $\|\frac{x}{\lambda}\| < 1$, entonces

$$(x - \lambda I)^{-1} = -\frac{1}{\lambda} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\lambda^{n+1}}, \quad \text{de donde } f(\lambda) = -\frac{l(1)}{\lambda} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{l(x^n)}{\lambda^{n+1}}$$

Pero $\{ \lambda \mid |\lambda| > r(x) \} \subset C \setminus Sp x$; por consiguiente la serie que representa a $f(\lambda)$ para $|\lambda| > \|x\|$ también la representa para $|\lambda| > r(x)$. En particular la sucesión $\left\{ \frac{l(x^n)}{\lambda^{n+1}} \right\}$ es acotada para cualquier l que se haya tomado. Por el teorema de Banach Steinhaus se deduce que la sucesión $\left\{ \frac{x^n}{\lambda^{n+1}} \right\}$ es también acotada para todo λ tal que $|\lambda| > r(x)$. Se ha demostrado que si $|\lambda| > r(x)$, entonces existe una constante K tal que $\|x^n\| \leq K \lambda^{n+1}$, para todo n . Se concluye que $\limsup \|x^n\|^{1/n} \leq r(x)$. Por lo tanto $r(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n}$.

8. **Teorema** (Gelfand-Mazur). Sea A un álgebra de Banach con elemento unidad.

Si todo elemento x de A diferente de cero es regular, entonces A es isométricamente isomorfa al álgebra C de los números complejos.

Demostración. Dado $a \in A$, por el teorema 7, $Sp a \neq \emptyset$, esto es, existe $\lambda \in C$ tal que $a - \lambda I$ es singular, entonces $a - \lambda I = 0$, por lo tanto la aplicación $a \rightarrow \lambda : A \rightarrow C$ establece el isomorfismo requerido.

9. Sea A un álgebra sobre C . Se dice que $I \subset A$ es un *ideal bilátero* de A , o simplemente un *ideal* de A , si I es un subespacio vectorial de A y además para todo $a \in A$ y $b \in I$ se tiene $ab \in I$ y $ba \in I$. Un ideal se llama *propio* si $I \neq A$. Si A tiene elemento unidad, I es propio si y sólo si $1 \notin I$.

Salvo que se diga explícitamente lo contrario todo ideal se supondrá propio.

Por *ideal máximo* de A se entiende un ideal \mathfrak{M} de A que no está contenido en ningún ideal distinto de sí mismo.

Si A tiene elemento unidad, todo ideal I de A está contenido en un ideal maximal. Para demostrar esto, designemos por \mathcal{F} el conjunto de todos los ideales de A que contienen a I . El conjunto \mathcal{F} ordenado por inclusión es inductivo, ya que toda unión de ideales propios resulta ser un ideal propio por no contener a 1 . El lema de Zorn nos permite concluir que existe un ideal maximal que contiene a I .

Si A es conmutativa y $x \in A$ no pertenece a ningún ideal maximal de A entonces x regular, en efecto $xA = A$ pues de otra manera $I = xA$ contiene a x y está contenido un ideal maximal de A lo cual es absurdo.

10. Sean A un álgebra de Banach con elemento unidad y \mathfrak{M} un ideal maximal de A , entonces \mathfrak{M} es cerrado, en efecto, la adherencia de \mathfrak{M} es claramente un ideal y es distinto de A pues en caso contrario I es adherente a \mathfrak{M} , lo cual implica que existe x en \mathfrak{M} tal que $\|1 - x\| < 1$, esto es imposible pues x sería regular y en consecuencia \mathfrak{M} sería igual a A .

De lo anterior se deduce que la adherencia de cualquier ideal propio de A sigue siendo un ideal propio de A .

11. Dado un ideal cerrado I de un álgebra normada A el cociente A/I está provisto de una estructura de espacio normado para la norma

$$\|x + I\| = \inf \{ \|x + y\| \mid y \in I \}$$

Es un hecho bien conocido en Análisis Funcional que si A es completo entonces A/I también es completo. Por otra parte es de verificación inmediata que

$$\|xy + I\| \leq \|x + I\| \|y + I\|,$$

para todo $x, y \in A$. Es decir, A/I resulta ser un álgebra normada.

Si A tiene elemento unidad, entonces $\|1 + I\| = 1$, pues claramente $\|1 + I\| \leq 1$ y si se tuviera $\|1 + I\| < 1$, existiría $x \in I$ tal que $\|1 + x\| < 1$ con lo cual $x \in I$ sería regular lo cual es imposible.

12. Sea A un álgebra de Banach con elemento unidad. Se llama *carácter* de A toda forma lineal τ sobre A tal que para todo $x, y \in A$, $\tau(xy) = \tau(x)\tau(y)$.

El conjunto de todos los caracteres de A se llama *espectro* de A y se denota por $\text{Spec } A$.

Es claro que $\tau(1) = 1$ para todo $\tau \in \text{Spec } A$. Dado $x \in A$ y $\tau \in \text{Spec } A$, se tiene $\tau(x) \in \text{Sp } x$ ya que $x - \tau(x)1 \in \ker \tau$ es singular, pues de otra manera $\ker \tau = A$. En particular $|\tau(x)| \leq \|x\|$ para todo $x \in A$, por lo tanto τ resulta continuo y

$$\|\tau\| = \sup \{ |\tau(x)| \mid \|x\| \leq 1 \} = 1$$

Recíprocamente si A es conmutativa, todo $\lambda \in \text{Sp } x$ es de la forma $\lambda = \tau(x)$ para algún $\tau \in \text{Spec } A$, porque si \mathfrak{M} es un ideal maximal de A que contiene al ideal $(x - \lambda 1)A \neq A$, designando por φ la aplicación canónica de A sobre A/\mathfrak{M} y C , entonces $\tau = j \circ \varphi$ es un carácter de A y claramente $\tau(x) = \lambda$.

Todo núcleo de un carácter τ es un ideal maximal ya que $A/\ker \tau$ es isomorfo a C y recíprocamente si A es conmutativa A/\mathfrak{M} es isomorfo a C y por lo tanto \mathfrak{M} es el núcleo de un carácter de A .

13. De aquí en adelante se supone que A es un álgebra de Banach conmutativa con elemento unidad, a menos que se diga lo contrario. Sea $T = \text{Spec } A$ y definamos la siguiente aplicación.

$$\begin{aligned} & : A \longrightarrow C^T \\ a & \longmapsto \hat{a} = (\tau(a))_{\tau \in T} \end{aligned}$$

Si consideramos C^T provista de su estructura de álgebra producto, la aplicación $\hat{\cdot}$ es un homomorfismo de álgebras cuyo núcleo es la intersección de todos los ideales maximales de A . Nos proponemos ahora caracterizar la imagen $\hat{A} \subset C^T$ de A por esta aplicación.

El conjunto $T = \text{Spec } A$ se dota de la topología menos fina para la cual la función

$$\begin{aligned} \hat{a} : T & \longrightarrow C \\ \tau & \longmapsto \hat{a}(\tau) = \tau(a) \end{aligned}$$

es continua, cualquiera que sea $a \in A$. Con esta topología una vecindad fundamental de $\tau_0 \in T$ es intersección finita de conjuntos de la forma

$$\{ \tau \in T \mid |\tau(a) - \tau_0(a)| < \varepsilon \},$$

para algún $a \in A$ y $\varepsilon > 0$.

Dicha topología sobre T es la inducida por la topología débil del dual. Consideremos la aplicación

$$\begin{aligned} \psi : T & \longrightarrow \prod_{x \in A} S_x \\ \tau & \longmapsto (\tau(x))_{x \in A} \end{aligned}$$

donde $S_x = \{ \lambda \in C \mid |\lambda| \leq \|x\| \}$.

Si sobre $\prod_{x \in A} S_x$ se toma la topología producto, entonces la aplicación ψ es un

homeomorfismo de T sobre $\psi(T)$. Por otra parte, $\psi(T)$ es un subconjunto cerrado de $\prod_{x \in A} S_x$, en efecto, si ρ es adherente a $\psi(T)$, entonces dados $\varepsilon > 0$, $x, y \in A$, existe un elemento $\tau \in \psi(T)$ tal que

$$|\rho(x) - \tau(x)| < \varepsilon, \quad |\rho(y) - \tau(y)| < \varepsilon, \quad |\rho(xy) - \tau(xy)| < \varepsilon,$$

pero como $\tau(xy) = \tau(x)\tau(y)$, entonces

$$|\rho(xy) - \rho(x)\rho(y)| < \varepsilon(1 + \|\tau(x)\| + \|\tau(y)\|),$$

para todo $\varepsilon > 0$, por lo tanto $\rho(xy) = \rho(x)\rho(y)$. De manera semejante se concluye que $\rho(x+y) = \rho(x) + \rho(y)$, $\rho(\lambda x) = \lambda\rho(x)$ y $\rho(1) = 1$ para todo $x, y \in A$ y $\lambda \in C$. Por consiguiente, $\psi(T)$ es cerrado en $\prod S_x$, pero $\prod S_x$ es compacto por el Teorema Tychonoff, así que $\psi(T)$ y su copia homeomorfa T son también espacios compactos.

Podemos ahora enunciar el siguiente

14. Teorema (Gelfand). Sea A un álgebra de Banach conmutativa con elemento unidad. La aplicación $a \rightarrow \hat{a} : A \rightarrow \hat{A} \subset C(T)$ es un homomorfismo continuo del álgebra A sobre un álgebra \hat{A} de funciones complejas continuas sobre el espacio compacto $T = \text{Spec } A$.

Demostración. La aplicación $a \rightarrow \hat{a}$, llamada también morfismo de Gelfand, es continua ya que

$$\begin{aligned} \|\hat{a}\| &= \sup \{ |\hat{a}(\tau)| \mid \tau \in \text{Spec } A \} \\ &= \sup \{ |\tau(a)| \mid \tau \in \text{Spec } A \} \\ &= \sup \{ |\lambda| \mid \lambda \in \text{Spec } A \} \\ &\leq \|a\|. \end{aligned}$$

Los restantes aspectos de este teorema fueron ya considerados en 13.

15. Sean T un espacio compacto y $C(T)$ el álgebra de todas las funciones continuas complejas definidas en T . Para cada $t \in T$, $\mathfrak{M}_t = \{f \in C(T) \mid f(t) = 0\}$ es un ideal maximal de $C(T)$, debido a que el núcleo del carácter $f \rightarrow f(t)$ es precisamente \mathfrak{M}_t .

Recíprocamente, todo ideal maximal \mathfrak{M} de $C(T)$ es de la forma $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_t$ para algún $t \in T$. En efecto, supóngase lo contrario. Entonces para cada $t \in T$ existe $f_t \in \mathfrak{M}$ tal que $f_t(t) \neq 0$. Sea V_t una vecindad de t tal que $f_t(s) \neq 0$ para todo $s \in V_t$.

La familia $\{V_t \mid t \in T\}$ forma un recubrimiento abierto del espacio compacto T . Existe entonces un sobrecubrimiento finito V_1, V_2, \dots, V_n de T .

Sea $f = f_1 \bar{f}_1 + f_2 \bar{f}_2 + \dots + f_n \bar{f}_n$; esta función pertenece a \mathfrak{M} y es invertible ya que $f(t) > 0$ para todo $t \in T$, lo cual es absurdo.

Por consiguiente, existe $t \in T$ tal que $\mathfrak{M} = \{f \in C(T) \mid f(t) = 0\}$. De lo anterior se deduce que para cada $\tau \in \text{Spec } C(T)$ existe $t \in T$ (único), tal que $\tau(f) = f(t)$ para todo $f \in C(T)$. Para ver esto basta factorizar τ a través de $A/\ker \tau$ haciendo uso del hecho que $\ker \tau = \mathfrak{M}_t$ para algún $t \in T$.

Entonces la aplicación

$$e: T \longrightarrow \text{Spec } C(T)$$

$$t \longmapsto \tau$$

donde $\tau(f) = f(t)$ para todo $f \in C(T)$, es una biyección.

Además, para todo $f \in C(T)$, $\hat{f} \circ e = f$. Esto garantiza la continuidad de

e en virtud de que la topología de $\text{Spec } C(T)$ es la menos fina que hace todas las \hat{f} continuas. Usando la compacidad de T se concluye que e es un homeomorfismo de T sobre $\text{Spec } C(T)$.

16. Dada un álgebra A sobre C se llama *involución* de A una aplicación de $x \rightarrow x^*$ de A en A tal que para todo $x \in A, y \in A, \lambda \in C$ se cumple

- (i) $(x^*)^* = x$
- (ii) $(x + y)^* = x^* + y^*$
- (iii) $(\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^*$
- (iv) $(xy)^* = y^* x^*$

Obsérvese que si A tiene elemento unidad, entonces $I^* = I'$, ya que $x I^* = (I x^*)^* = x^{**} = x$ para todo $x \in A$.

Un álgebra de Banach provista de una involución se llama *álgebra de Banach involutiva*. Si además, para todo $x \in A, \|x^* x\| = \|x\|^2$, A recibe el nombre de *C^* -álgebra*.

Si T es un espacio compacto, el álgebra $C(T)$ es una C^* -álgebra, cuya involución viene dada por $f^*(t) = \overline{f(t)}$. Si A es una C^* -álgebra, entonces para todo $x \in A$, se tiene $\|x^*\| = \|x\|$, en efecto, $\|x^*\| \|x\| \geq \|x^* x\| = \|x\|^2$, por lo tanto $\|x^*\| \geq \|x\|$. de igual manera $\|x\| = \|x^{**}\| \geq \|x^*\|$.

En razón de que $(x - \lambda I)^* = x^* - \bar{\lambda} I$ para todo $\lambda \in C$, se deduce

$$\text{Sp } x^* = \overline{\text{Sp } x}$$

17. Un elemento x de un álgebra con involución se llama *hermitiano* o *auto-adjunto* si $x = x^*$, se dice *normal* si $x x^* = x^* x$ y si se dice *unitario* si $x^{-1} = x^*$.

Todo elemento x de A se puede escribir de manera única en la forma $x = x_1 + i x_2$ donde x_1 y x_2 son hermitianos. En efecto, definiendo

$$x_1 = \frac{1}{2} (x + x^*) \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{1}{2i} (x - x^*),$$

se tiene que x_1 y x_2 son hermitianos y $x = x_1 + i x_2$.

Recíprocamente si $x = x_1 + i x_2$ donde x_1 y x_2 son hermitianos, entonces $x^* = x_1 - i x_2$, de donde $x_1 = \frac{1}{2} (x + x^*)$ y $x_2 = \frac{1}{2i} (x - x^*)$.

18. Proposición. Si A es una C^* -álgebra y $x \in A$ es normal, entonces

$$\|x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n}$$

Demostración. Obsérvese que para todo $a \in A$, $b = a^* a$ satisface la relación $\|b^2\| = \|b\|^2$, por ser b un elemento hermitiano de A . Para x normal se tiene,

$$\|x\|^4 = \|x^* x\|^2 = \|(x^* x)^2\| = \|(x^2)^* x^2\| = \|x^2\|^2, \quad \text{por lo tanto } \|x\|^2 = \|x^2\|.$$

Por inducción se demuestra que $\|x^{2^n}\| = \|x\|^{2^n}$, para todo entero positivo n .

$$\text{Por consiguiente, } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n} = \|x\|.$$

Corolario. Si A es una C^* -álgebra conmutativa con elemento unidad, entonces $\|x\| = r(x)$ para todo $x \in A$.

En efecto, todo elemento de A es normal y en virtud de 7, $r(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n}$.

19. Proposición. Si x es un elemento hermitiano de una C^* -álgebra entonces $\text{Spec } x \subset \mathbb{R}$.

Demostración (Arens). Sean $u + iv \in \text{Sp } x$ y k un número real cualquiera.

Considérese $y = x + ik1$, entonces

$$\lambda = u + i(v+k) \in Sp y$$

$$\lambda = u - i(v+k) \in Sp y^*$$

Entonces $\lambda \bar{\lambda} = |\lambda \bar{\lambda}| = |\lambda|^2$, $|\bar{\lambda}| \leq \|y\|$, $\|y^*\| = \|y\|^2 = \|y y^*\|$. Por lo tanto,

$$u^2 + v^2 + k^2 + 2kv \leq \|x^2 + v^2\| \leq \|x^2\| + k^2,$$

es decir, $u^2 + v^2 + 2kv \leq \|x^2\|$ para todo número real k , lo cual es absurdo si $v \neq 0$.

Nota 1. Sea A una C^* -álgebra con elemento unidad y $\tau \in Spec A$, entonces $\tau(x^*) = \overline{\tau(x)}$ para todo $x \in A$; esto se ve fácilmente escribiendo $x = x_1 + ix_2$ con x_1, x_2 hermitianos.

Nota 2. Si u es un elemento unitario de una C^* -álgebra con elemento unidad, entonces $|\lambda| = 1$ para todo $\lambda \in Sp u$. En efecto, $\|u\| = 1$ ya que $\|u\|^2 = \|u^* u\| = \|1\| = 1$, así que $r(u) \leq 1$ y $r(u^{-1}) \leq 1$, por lo tanto $Sp u$ y $Sp u^{-1} = (Sp u)^{-1}$ están contenidas en el disco unidad de C . Se concluye que $|\lambda| = 1$ para todo $\lambda \in Sp u$.

20. Teorema (Gelfand-Naimark). Si A es una C^* -álgebra con elemento unidad el morfismo de Gelfand $x \rightarrow \hat{x}: A \rightarrow C(Spec A)$ es un isomorfismo isométrico entre A y $C(Spec A)$.

Demostración. Para todo $x \in A$,

$$\|\hat{x}\| = \sup \{ |\tau(x)| \mid \tau \in Spec A \} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n} = \|x\|.$$

Por otra parte, las funciones \hat{x} separan los puntos de $T = Spec A$, pues si

$\tau_1 \neq \tau_2$ existe $a \in A$ tal que $\tau_1(a) \neq \tau_2(a)$. Para todo $\lambda \in C$, $(\lambda 1)^\wedge(\tau) = \tau(\lambda 1) = \lambda \tau(1) = \lambda$, es decir, las funciones constantes pertenecen a la imagen \hat{A} de A por el morfismo de Gelfand. Finalmente

$$\overline{\hat{a}}(\tau) = \overline{\tau(a)} = \tau(a^*) = (a^*)^\wedge(\tau),$$

dicho de otra manera, $\overline{\hat{a}} \in \hat{A}$ para todo $\hat{a} \in \hat{A}$.

Por medio del teorema de Stone-Weierstrass se concluye que $\hat{A} = C(\text{Spec } A)$.

21. Proposición. Sean A y B dos C^* -álgebras y f un homomorfismo de álgebras tal que $f(1) = 1$ y $f(x^*) = f(x)^*$ para todo $x \in A$. Entonces

$$\|f(x)\| \leq \|x\|$$

para cada $x \in A$.

Demostración. Es claro que para todo $x \in A$, $Sp f(x) \subset Sp x$, de donde $r(f(x)) \leq r(x) \leq \|x\|$. Usando 18 se tiene que

$$\|f(x)\|^2 = \|f(x^*x)\| = r(f(x^*x)) \leq \|x^*x\| = \|x\|^2$$

22. Se denota por \mathfrak{A} la categoría de las C^* -álgebras conmutativas con elementos unidad. Los morfismos son homomorfismos de álgebra $f: A \rightarrow B$ tales que $f(1) = 1$ y $f(x^*) = f(x)^*$ para todo $x \in A$.

Se denota por \mathfrak{C} la categoría de los espacios compactos, los morfismos son las aplicaciones continuas entre tales espacios. $Spec: \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{C}$, es un funtor contravariante que un álgebra $A \in \mathfrak{A}$ le hace corresponder su espectro $Spec A \in \mathfrak{C}$ y a cada morfismo de \mathfrak{A} , $f: A \rightarrow B$ le asigna la aplicación continua

$$Spec f: Spec B \rightarrow Spec A \text{ definida por } (Spec f) \tau = \tau \circ f.$$

También existe un funtor contravariante $C(\cdot)$ de \mathcal{C} en \mathcal{A} que asigna a cada $T \in \mathcal{C}$ el álgebra $C(T) \in \mathcal{A}$ y a una función continua $l: S \rightarrow T$ entre espacios compactos le hace corresponder el homomorfismo de álgebras

$$C(l): f \longleftarrow f \circ l : C(T) \longrightarrow C(S)$$

Para cualquier morfismo $f \in \mathcal{A}$ el siguiente diagrama es conmutativo.

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\quad \hat{\quad} \quad} & C(\text{Spec } A) \\
 \downarrow f & & \downarrow C(\text{Spec } f) \\
 B & \xrightarrow{\quad \hat{\quad} \quad} & C(\text{Spec } B)
 \end{array}$$

donde

$$\begin{array}{ccc}
 A & \xrightarrow{\quad \hat{\quad} \quad} & C(\text{Spec } A) \\
 B & \xrightarrow{\quad \hat{\quad} \quad} & C(\text{Spec } B)
 \end{array}
 \quad \text{y}$$

son isomorfismos por el Teorema de Gelfand Naimark .

Igualmente para cualquier $l \in \mathcal{C}$, aplicación continua entre espacios compactos, el siguiente diagrama es conmutativo

$$\begin{array}{ccc}
 S & \xrightarrow{e_S} & \text{Spec } C(S) \\
 \downarrow l & & \downarrow \text{Spec } C(l) \\
 T & \xrightarrow{e_T} & \text{Spec } C(T)
 \end{array}$$

donde $e_S(s)$ es el carácter τ de $C(S)$ tal $\tau(f) = f(s)$ para todo $f \in C(S)$.

En 15 se demostró que e_S (y e_T) son homeomorfismos. Por lo tanto el par de funtores contravariantes $(Spec, C(\cdot))$ establecen una dualidad entre las categorías \mathfrak{Q} y \mathfrak{C} .

23. Sean A un álgebra normada y $a \in A$. Se dice que a es un divisor topológico de cero a derecha (resp. a izquierda) si existe una sucesión $\{b_n\}$ de elementos de A tales que $\|b_n\| = 1$, $n = 1, 2, \dots$ y $b_n a \rightarrow 0$ (resp. $a b_n \rightarrow 0$).

Un divisor topológico de cero bilátero es un elemento que es simultáneamente un divisor topológico de cero a derecha y a izquierda.

Proposición. Todo elemento de la frontera del grupo G de los elementos regulares de un álgebra normada es un divisor topológico de cero bilátero.

Demostración. Sea a un elemento de la frontera de G . Como G es abierto, $a \notin G$. Sea $a_n \in G$ tal que $a_n \rightarrow a$. Consideremos la sucesión $\{\|a_n^{-1}\|\}$; si esta sucesión fuera acotada, entonces $a_n^{-1} a - 1 = a_n^{-1} (a - a_n) \rightarrow 0$, de donde $a_n^{-1} a \in G$ y se tendría $a \in G$, lo cual es absurdo. Por lo tanto $\{\|a_n^{-1}\|\}$ no es acotada. Supongamos que $\|a_n^{-1}\| \rightarrow 0$ y sea $b_n = b_n^{-1} / \|b_n^{-1}\|$, entonces

$$b_n a = b_n (a - a_n) + 1 / \|a_n^{-1}\| \rightarrow 0$$

$$a b_n = (a - a_n) b_n + 1 / \|a_n^{-1}\| \rightarrow 0,$$

lo cual demuestra que a es un divisor topológico de cero bilátero.

2.4 Proposición. Sean A un álgebra de Banach con elemento unidad y B una subálgebra cerrada de A que contiene el elemento unidad de A .

Para todo x en B se tiene

$$(i) \quad Sp_A^x \subset Sp_B^x$$

$$(ii) \quad Fr Sp_B^x \subset Fr Sp_A^x$$

Demostración La parte (i) es inmediata (ii) Supongamos que λ pertenece a la frontera de Sp_B^x , entonces $x - \lambda I$ pertenece a la frontera de los elementos regulares de B , por lo tanto $x - \lambda I$ es un divisor topológico de cero bilátero en B y obviamente también en A . Se deduce que $\lambda \in Sp_A^x$ y es fácil ver que $\lambda \in Fr Sp_A^x$.

Corolario Si se supone que además el interior de Sp_B^x es vacío, entonces

$$Sp_B^x = Sp_A^x$$

Demostración $Sp_B^x \supset Fr Sp_B^x$ porque Sp_B^x es cerrado. Por otra parte

$$Fr Sp_B^x \subset Fr Sp_A^x \subset Sp_A^x \subset Sp_B^x; \quad \text{así que } Sp_B^x = Sp_A^x$$

Nota En particular, si Sp_B^x es real, entonces $Sp_B^x = Sp_A^x$.

25 Proposición Sea A una C^* -álgebra con elemento unidad. Supongamos que A es generada por i y x (es decir, A es la menor sub- C^* -álgebra de A que contiene a i y x), entonces $\tau : \tau(x)$ es un homeomorfismo de $Spec A$ sobre Sp_x .

Demostración Esta es una aplicación continua y según se vió en 12, su imagen es Sp_x . Ahora si $\tau(x) = \tau'(x)$, el conjunto B de los $y \in A$ tales que $\tau(y) = \tau'(y)$ es una sub- C^* -álgebra de A que contiene a i y a x , así que $B = A$ y entonces $\tau = \tau'$. La aplicación considerada es entonces inyectiva y por lo tanto un homeomorfismo dado que $Spec A$ es compacto. Queremos termi-

nar con el siguiente resultado de Wiener.

26. **Proposición.** Sea A el espacio de las funciones complejas de variable real de la forma

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n e^{int} \quad \text{con } \alpha_n \in \mathbb{C},$$

donde

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\alpha_n| < \infty.$$

Si $x(t) \neq 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, entonces $\frac{1}{x(t)}$ también pertenece a A .

Demostración. El espacio A es un álgebra normada para operaciones definidas puntualmente y con la norma $\|x\| = \sum |\alpha_n|$. El álgebra A es de Banach por ser claramente isomorfa a l_1 , además $\|xy\| = \sum_n \left| \sum_k \alpha_{n-k} \beta_k \right| \leq \|x\| \|y\|$, donde $x(t) = \sum \alpha_n e^{int}$ y $y(t) = \sum \beta_n e^{int}$.

Sean x_0 el elemento de A tal que $x_0(t) = e^{it}$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y $\tau \in \text{Spec } A$, entonces $|\tau(x_0^n)| = |\tau(x_0^n)| \leq \|x_0^n\| = 1$, así que $\tau(x_0)$ es de la forma $\tau(x_0) = e^{i\theta}$ para algún $\theta \in \mathbb{R}$. Entonces $\tau(x_0^n) = e^{in\theta} = x_0^n(\theta)$ y en virtud de la continuidad de τ se tiene $\tau(x) = x(\theta)$. Como por hipótesis $x(\theta) \neq 0$, entonces x no pertenece al núcleo de τ , cualquiera que sea $\tau \in \text{Spec } A$. Por lo tanto x es invertible en A .

Bibliografía

- [1] J. Dixmier. *Les C^* -álgebras et leur représentations*. 2^{ème} éd. Gauthiers - Villars Paris, 1969
- [2] N. Dunford and J. T. Schwartz *Linear Operators* Part. II. Interscience publishers, New York - London, 1963.
- [3] I.M. Gelfand. *Normierte Ringe*. Mat Sbornik.

- [4] I. M. Gelfand. "Ideale und primäre Ideale in normierten Ringen". Mat. Sbornik N. S. 9 (51), 41-48, 1941.
- [5] I. M. Gelfand, M. A. Naimark. "On the embedding of normed rings into the ring of operators in Hilbert space". Mat. Sbornik N. S. 12 (54), 197-213, (1943).
- [6] M. A. Naimark. *Normed rings*. P. Noordhoff N. V., 1964.
- [7] C. E. Rickart. *General theory of Banach algebras*. Van Nostrand, 1960.
- [8] K. Yosida. *Functional Analysis*. Second Edition. Springer-Verlag New York Inc. 1968.

Bibliographie

- [1] J. Dixmier. Les C^* -algèbres et leur représentation. Masson, Paris, 1969.
- [2] N. Dunford and J. T. Schwartz. *Linear Operators. Part II. Interscience Publishers*. New York - London, 1963.
- [3] I. M. Gelfand. *Normierte Ringe*. Mat. Sbornik