126.- **Euphorbia maculata** L., *Sp. Pl.*, 1: 455. 1753. (EUPHORBIACEAE) (Lám. 11)

Syn.: ≡*Anisophyllum maculatum* (L.) Haw., *Syn. Pl. Succ.*: 162. 1812; =*Euphorbia supina* Raf., *Amer. Monthly Mag. & Crit. Rev.*, 2: 119. 1817; =*Euphorbia depressa* Torrey, *Catal. Pl. N. Y.*: 45. 1819 & Torrey *ex* Sprengel, *Syst. Veg.*, ed. 16, 3: 794. 1827; =*Euphorbia maculata* L. var. *parvula* Riddell, *Syn. Fl. West. States*: 32. 1835; ≡*Xamesyke maculata* (L.) Raf., *Autik. Bot.*: 97. 1840; =*Xamesyke supina* (Raf.) Raf., *Autik. Bot.*: 97. 1840; =*Euphorbia supina* Raf. *ex* Boiss. in De Candolle, A., *Prodr.* [De Candolle] 15(2): 47. 1862; =*Euphorbia maculata* L. var. *detonsa* Engelm. *ex* Boiss. in De Candolle, A., *Prodr.* [De Candolle] 15(2): 47. 1862; ≡*Tithymalus maculatus* (L.) Beckh. in Hasse, *Fl. West.*: 787. 1893; ≡*Chamaesyce maculata* (L.) Small, *Fl. S.E. U.S.*: 713. 1903; =*Chamaesyce supina* (Raf.) Moldenke, *J. Jap. Bot.*, 16: 119. 1939; =*Euphorbia jovetii* Huguet, *Botaniste,* 54: 153. 1971; =*Chamaesyce jovetii* (Huguet) Holub, *Folia Geobot. Phytotax.*, 8: 176. 1973.

Euphorbia maculata L., es un neófito naturalizado, que viven en zonas de lugares nitrificados, de suelos ricos, con humedad edáfica durante buena parte de la primavera y verano, habitualmente ligado a zonas viarias y márgenes de cauces de agua, linderos agrícolas, especialmente cultivos de regadío, donde convive con otros congéneres como *E. nutans* Lag., *E. canescens* L. o *E. postrata* Aiton.

Podemos discriminar a esta especie del resto de taxones del grupo (subgen.) *Chamaesyce* (S.F.Gray) Ces. *ex* Rchb., por la presencia de cápsulas pelosas con pelos aplicados, además de la presencia de maculas en las hojas, aunque este último no es un carácter constante en todas las poblaciones peninsulares (Benedí, 1997).

De esta especie teníamos testimonio en Extremadura para la provincia de Cáceres (Benedí, 1997), aunque no de la provincia de Badajoz. El testimonio que se presenta amplia el área de distribución de la especie en el SW de la Península Ibérica y suma a los ya conocidos de las provincias de Ciudad Real (Vaquero de la Cruz, 1993), Huelva (Bartoli & al., 2007), Salamanca (Navarro & al., 2000) y Sevilla (Roales, 1999), además de las aportaciones en Alto y Baixo Alentejo, Algarve y Estremadura en Portugal, encontradas en FloraOn (2019+).

Material estudiado:

Euphorbia maculata L.

Hs: Badajoz (Ba): Villagonzalo, Laguna Redonda, en las proximidades de las placas solares, 29SQC3197, 319-320 m.s.n.m., lámina de agua y márgenes de laguna, 14-VII-2015, *J. Blanco* & *F.M. Vázquez* (HSS65140 / HSS65146).

Bibliografía:

Bartoli, A., Sánchez Gullón, E., Weickert, P. & Tortosa, R.D. 2007. Contribuciones a la Flora Vascular de Andalucía (España). 124-137; 133. Plantas americanas nuevas para la flora adventicia del Sur de España. *Acta Bot. Malacitana*, 32: 276-282.

Benedí, C. 1997. *Chamaesyce* S.F.Gray, in Castroviejo, S. (Ed. Gral.), *Flora Ibérica* (*Haloragaceae-Euphorbiaceae*), 8: 286-297. CSIC. Madrid.

FloraON, 2019+. *Chamaesyce maculata* L. https://flora-on.pt/#/1Chamaesyce+maculata (Consulta VIII-2019)

Navarro, F., Valle, C.J. & Fernández, F.J. 2000. Fitocorología y fitocenología de tres nuevos taxones para la flora de Salamanca del género *Chamaesyce* S. F. Gray (*Euphorbiaceae*; *Stvd. Bot. Univ. Salamanca*, 19: 5-10.

Roales, J. 1999. Contribución al conocimiento de la Flora de Sevilla, III: novedades corológicas comarcales. *Lagascalia*, 21: 61-110.

Vaquero de la Cruz, J. 1993. Flora del Parque Natural de Cabañeros (Montes de Toledo, Ciudad Real; *Ecología*, 7: 79-111.

Francisco Mª Vázquez Pardo, Francisco Márquez García & David García Alonso
Departamento de Biodiversidad Vegetal (CICYTEX-La Orden)
Ctra. Madrid-Lisboa km. 372. 06187 Guadajira (Badajoz, España)
e-mail: *frvazquez50@hotmail.com*



Lámina 11.- Imagen del pliego novedad corológica de ***Euphorbia maculata*** L., conservado en el registro HSS65140.