

Fotografía Diagnóstica

Displasia de cadera en un perro Rottweiler de 6 meses

Francisco José Cordobés Fijo
Veterinario
Servicio Veterinario
Extremeño (Don Benito)



La displasia de cadera es un problema muy frecuente en determinadas razas, entre ellas, la raza Rottweiler en la que presenta una incidencia superior al 20%.

Enfermedad multifactorial, multigénica y hereditaria, en la que los factores ambientales cada vez son más influyentes en el desarrollo de dicha patología. Es una enfermedad del crecimiento.

La presentación en el perro joven es normalmente entre los 5 y 6 meses y presenta una clínica variada. En este caso en concreto, nos encontramos con una cojera grado II.

Este perro hubiera tenido una posible solución, con una técnica quirúrgica denominada sinfisiodesis púbica realiza a los tres meses aproximadamente que consiste en una cauterización de la línea de crecimiento del pubis probando el cierre prematuro de dicha línea para provocar una lateralización del íleon produciendo mayor envoltura en la articulación. Sin embargo se considera una técnica controvertida y a menudo sólo paliativa.

Con la edad del perro en cuestión sólo existen dos posibilidades quirúrgicas, una es la artroplastia de esción bilateral y otra, el remplazo de cadera bilateral con prótesis.

En la imagen se observa de forma clara la falta de congruencia articular, la inexistencia de cobertura coxofemoral e incluso signos de artrosis articular lo que evidencia una **displasia de grado E**.

