

Imágenes de gota tofácea

ORENES VERA AV, VÁZQUEZ GÓMEZ I, FLORES FERNÁNDEZ E, VALERA RIBERA C, VALLS PASCUAL E, YBÁÑEZ GARCÍA D, MARTÍNEZ FERRER A, ALEGRE SANCHO JJ

Servicio de Reumatología. Hospital Universitari Doctor Peset. València

Correspondencia: Dra. Ana Victoria Orenes Vera - Servicio de Reumatología - Hospital Doctor Peset - C/Juan de Garay, 21 - 46017 Valencia

✉ Ana.avov@gmail.com

Varón de 73 años con antecedentes personales de hipertensión arterial, fibrilación auricular anticoagulada, insuficiencia cardíaca crónica, cirrosis hepática enólica y obesidad derivado por hiperuricemia (10,5 mg/dL). El paciente refiere bultomas en áreas articulares de más de 20 años de evolución. A la exploración se confirma la presencia de tofos gotosos a nivel de primer dedo de ambos pies, rodillas y codos, siendo el del codo izquierdo de tamaño considerable incluso con fistulización y salida de material tofáceo.



Figura 2. Radiografía lateral de codo en la que se objetiva tofo gotoso de tamaño considerable con calcificaciones en su interior.



Figura 1. Radiografía antero-posterior de ambos pies en la que se visualiza estructura compatible con tofo gotoso a nivel de ambas articulaciones metacarpo-falángicas (MCF) e interfalángicas (IF) del primer dedo junto con geodas y erosiones.



Figura 3. Radiografía lateral de rodilla con tofo gotoso en tendón rotuliano.