

---

## ***Shigella sonnei* ¿Está ocurriendo un cambio en nuestro medio?**

José Guevara G., Rosa Cipriani, Dora Giraldo, Elvira Mezarina, Ivonne Sánchez, Zoraida Villagómez, Antonio Antezana, Rosa Alagón, Rosa Carranza

Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina, UNMSM

---

**Objetivos:** Determinar los serogrupos de *Shigella* como agentes etiológicos de diarrea.

**Diseño:** Estudio descriptivo, retrospectivo, analítico.

**Institución:** Instituto de Medicina Tropical Daniel A. Carrión, Facultad de Medicina, UNMSM.

**Participantes:** Aislamientos de *Shigella sp* en coprocultivos.

**Intervenciones:** Se revisó los aislamientos de *Shigella sp* en coprocultivos, durante los años 2010 y 2011, en la base de datos WHONET 5,6 del hospital, tanto de pacientes adultos como pediátricos, ambulatorios, hospitalizados y atendidos en emergencia. También se hizo su distribución por serogrupos.

**Principales medidas de resultados:** Frecuencia absoluta y frecuencia relativa, por años 2010 y 2011.

**Resultados:** En el año 2010 se aisló 64 *Shigellas sp*; 41 correspondieron a serogrupo *flexneri* (64,1%) y 20 a serogrupo *sonnei* (31,3%). En el año 2011, se aisló 90 *Shigellas sp*; 36 correspondieron a serogrupo *flexneri* (40%) y 50 a serogrupo *sonnei* (55,6%). Las diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas.

**Conclusiones:** *Shigella sonnei* es el serogrupo predominante en nuestro hospital.

**Palabras clave:** *Shigella*, coprocultivo, *Shigella flexneri*, *Shigella sonnei*.

---

## **Experiencias infantiles parentales e hiperémesis gravídica en gestantes atendidas en el Instituto Materno Perinatal de Lima, Perú**

Teodora Moscol, Ysis Roa, Aristides Vara

Instituto Materno Perinatal, Lima, Perú

---

**Introducción:** Los estudios sobre la sexualidad femenina se han centrado en aspectos biomédicos y fisiológicos. Así, los intensos síntomas durante el embarazo, no han sido considerados como objeto de análisis y exploración, debido a que son calificados como fenómenos 'normales' y, por tanto, de aparición y frecuencia esperadas. Supuesto que es contrario con los datos de recientes investigaciones, que revelan la influencia significativa de factores psicológicos y emocionales en las dolencias mencionadas, encontrando que las experiencias infantiles con los padres condicionan la frecuencia y significado de algunos síntomas durante la gestación, tales como las náuseas, los vómitos y la hiperémesis gravídica.

**Objetivos:** Precisar la relación entre las experiencias infantiles parentales y la presencia de hiperémesis gravídica en gestantes del Instituto Materno Perinatal (IMP).

**Diseño:** Descriptivo, prospectivo, transversal y correlacional.

**Institución:** Instituto Materno Perinatal, Lima, Perú.

**Participantes:** Gestantes.

**Intervenciones:** Se estudió 264 gestantes que acudieron al Instituto Materno Perinatal durante el periodo marzo-noviembre. La evaluación fue realizada por las alumnas de la EAP de Obstetricia del X ciclo. La aplicación de la encuesta se realizó in situ, con una duración de 15 minutos.

**Principales medidas de resultados:** Relación entre la hiperémesis gravídica y las experiencias infantiles negativas con los padres.

**Resultados:** Se encontró que los síntomas de hiperémesis actual estuvieron relacionados con la presencia de los síntomas de hiperémesis gravídica en embarazos anteriores ( $r=504$ ,  $p < 0,01$ ). Se encontró además una relación significativa positiva entre la hiperémesis gravídica y las experiencias infantiles negativas con los padres ( $MD=18,57$ ,  $DE=8,53$ ).

**Conclusiones:** Se halló una relación significativa entre las experiencias infantiles positivas con los padres y la presencia de hiperémesis gravídica.

**Palabras clave:** Gestantes, hiperémesis gravídica, experiencias infantiles, náusea, vómitos.