



DOI: <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v8i3>

Ciencias de la Salud  
Artículo de Revisión

***Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett***

***Importance of early diagnosis in patients with Gastroesophageal Reflux Disease for timely detection of Barrett's Esophagus***

***Importância do diagnóstico precoce em pacientes com Doença do Refluxo Gastroesofágico para detecção oportuna do Esôfago de Barrett***

Jairo David Villacis-Benavides <sup>I</sup>

[jairovilla01@hotmail.com](mailto:jairovilla01@hotmail.com)

<https://orcid.org/0000-0003-1376-7828>

Mercedes Isabel Guamán-Guamán <sup>II</sup>

[ismerint@gmail.com](mailto:ismerint@gmail.com)

<https://orcid.org/0000-0001-7405-8895>

**Correspondencia:** [jairovilla01@hotmail.com](mailto:jairovilla01@hotmail.com)

\***Recibido:** 29 de mayo del 2022 \***Aceptado:** 02 de junio de 2022 \* **Publicado:** 18 de julio de 2022

- I. Interno Rotativo de Medicina, Hospital General de Latacunga, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador.
- II. Médico tratante de gastroenterología, Hospital Docente Ambato, Universidad Técnica de Ambato, Ambato, Ecuador.

## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

### Resumen

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es una enfermedad provocada por la exposición crónica al reflujo patológico del contenido gástrico hacia el esófago. Constituye una de las causas más frecuentes de consulta gastroenterológica, representando una prevalencia a nivel mundial del 15% y que las principales manifestaciones clínicas son la pirosis y la regurgitación. Se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos médicas para recopilar información de artículos y guías médicas clínicas sobre la importancia de un diagnóstico temprano de la ERGE en las unidades de primer nivel de salud del Ecuador, con el fin de prevenir la progresión a Esófago de Barrett. Dentro de los resultados de búsqueda se analizaron 25 fuentes bibliográficas donde los principales factores de riesgo fueron la edad entre los 45-55 años, el sexo femenino, hábitos como el consumo de alcohol y tabaco, la obesidad, infecciones relacionadas con el *Helicobacter pylori* y gastritis. Se concluyó que la ERGE al ser una patología prevalente con múltiples factores de riesgo, representa un reto diagnóstico para las unidades básicas de salud y se debe establecer programas de prevención y protocolos de tratamiento oportuno de los síntomas con el fin de evitar la progresión hacia Esófago de Barrett y Adenocarcinoma esofágico.

**Palabras Claves:** Pirosis; Reflujo; Esofagitis; Reflujo gastroesofágico; Metaplasia.

### Abstract

Gastroesophageal reflux disease (GERD) is a disease caused by chronic exposure to pathological reflux of gastric contents into the esophagus. It is one of the most frequent causes of gastroenterological consultation, representing a worldwide prevalence of 15% and the main clinical manifestations are heartburn and regurgitation. A systematic search was carried out in medical databases to collect information from articles and clinical medical guidelines on the importance of an early diagnosis of GERD in first-level health units in Ecuador, in order to prevent progression to the esophagus from Barrett. Within the search results, 25 bibliographic sources were analyzed where the main risk factors were age between 45-55 years, female sex, habits such as alcohol and tobacco consumption, obesity, infections related to *Helicobacter pylori* and gastritis. It was concluded that GERD, being a prevalent pathology with multiple risk factors, represents a diagnostic challenge for basic health units and prevention programs and protocols for timely treatment of symptoms should be established in order to avoid progression to the esophagus. Barrett's and esophageal adenocarcinoma.

## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

**Keywords:** Pyrosis; Reflux; esophagitis; Gastroesophageal reflux; metaplasia.

### Resumo

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma doença causada pela exposição crônica ao refluxo patológico do conteúdo gástrico para o esôfago. É uma das causas mais frequentes de consulta gastroenterológica, representando uma prevalência mundial de 15% e as principais manifestações clínicas são azia e regurgitação. Foi realizada uma busca sistemática em bancos de dados médicos para coletar informações de artigos e diretrizes médicas clínicas sobre a importância do diagnóstico precoce da DRGE em unidades de saúde de primeiro nível no Equador, a fim de evitar a progressão para o esôfago de Barrett. Dentro dos resultados da pesquisa, foram analisadas 25 fontes bibliográficas onde os principais fatores de risco foram idade entre 45-55 anos, sexo feminino, hábitos como consumo de álcool e tabaco, obesidade, infecções relacionadas ao *Helicobacter pylori* e gastrite. Concluiu-se que a DRGE, sendo uma patologia prevalente e com múltiplos fatores de risco, representa um desafio diagnóstico para as unidades básicas de saúde e programas de prevenção e protocolos para tratamento oportuno dos sintomas devem ser estabelecidos para evitar a progressão para o esôfago, adenocarcinoma de Barrett e esôfago.

**Palavras-chave:** Pirose; Refluxo; esofagite; Refluxo gastroesofágico; metaplasia.

### Introducción

La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE) es el retorno del contenido gástrico que causa sintomatología o afectación a nivel de la mucosa esofágica. La pirosis y la regurgitación son los síntomas más frecuentes aunque también se pueden presentar en menor cantidad manifestaciones extraesofágicas. (1)

La ERGE representa una de las causas más frecuentes de consulta gastroenterológica y cuando la pirosis o la regurgitación gástrica son los síntomas predominantes, el diagnóstico tiene mayor sensibilidad y especificidad. (1)

El Esófago de Barrett (EB) se caracteriza por asociarse a la Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico Crónico, con la presencia de lesiones asalmonadas en la mucosa del esófago distal, identificadas endoscópicamente, donde se evidencia alteraciones anatomopatológicas. Estos cambios predisponen un factor de riesgo importante en el desarrollo de Adenocarcinoma Esofágico (ACE). (2)

## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

Existen múltiples factores de riesgo para la ERGE, como son: relajación temporal del esfínter esofágico inferior, mucosa esofágica inmunodeprimida, hipersensibilidad visceral, hernia hiatal y vaciamiento gástrico tardío. La obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la ERGE y también se relaciona con sus complicaciones, como la esofagitis erosiva, esófago de Barrett y el adenocarcinoma esofágico. (3)

La incidencia del EB en pacientes con síntomas de ERGE varía entre el 10-20% en los países occidentales y entre el 6 y el 15 % en pacientes sin síntomas. Su diagnóstico es cada vez más frecuente, pero su verdadera prevalencia en la población se desconoce y probablemente sea mucho más alta que lo esperado. (2)(4)(5)

La prevalencia estimada en pacientes con síntomas de ERGE es del 3 al 8 %; mientras que la de pacientes sometidos a endoscopia por cualquier motivo es del 1%. (2)

La ERGE se puede clasificar según la presencia o ausencia de erosiones; cuando hay síntomas de ERGE y el examen endoscópico no revela erosiones, se hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo no erosiva (ERNE), mientras que los síntomas de ERGE con erosiones constituyen una esofagitis erosiva. La ERGE complicada se caracteriza por estenosis, Esófago de Barret y adenocarcinoma esofágico. El diagnóstico de la ERGE se apoya, por una parte, en los datos clínicos y, por otra, en las pruebas diagnósticas. (3)(6)

La endoscopia es una de las técnicas de mayor importancia en el diagnóstico de la ERGE. Endoscópicamente, el EB se puede clasificar según su longitud y forma de prolongación, según los criterios de Praga. (7)

El diagnóstico más efectivo del EB es histológico, donde se busca la presencia o no de displasia y su grado de afectación, para así establecer la conducta terapéutica. (8)

### Métodos

Se realizó una búsqueda sistemática en bases de datos electrónicas para identificar publicaciones relacionadas con el diagnóstico temprano de la enfermedad de reflujo gastroesofágico y los factores de riesgo para la progresión hacia esófago de Barrett, en las fuentes de indexación PUBMED, SciELO, infoMED, The New England Journal of Medicine, The American Journal of Gastroenterology, ELSEVIER, Medigraphic, Google académico. Las preguntas de búsqueda fueron: ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico? ¿Cómo se

## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

diagnostica la Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico? ¿Cómo se relaciona la Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico con el esófago de Barrett?

Los términos de búsqueda avanzada para las bases de datos fueron: factores de riesgo, Enfermedad de Reflujo Gastroesofágico, esófago de Barrett, diagnóstico y cáncer de esófago. Para esta revisión se seleccionaron artículos científicos con ayuda de la búsqueda avanzada en las diferentes bases de datos publicados en los últimos 5 años, con resultados investigativos y aquellos con aspectos teórico-conceptuales donde los criterios de exclusión fueron artículos no acordes con el tema de la revisión. En la búsqueda se obtuvieron 1680 resultados de los cuales se utilizó un total de 25 referencias bibliográficas entre ellas guías internacionales, que cumplieran con los criterios de inclusión.

### **Marco teórico**

#### **Definición**

La Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico es una alteración mecánica a nivel del esfínter esofágico inferior, que impide un correcto vaciamiento del contenido gástrico y una falla en el peristaltismo esofágico, afectando a la barrera anti-reflujo, provocando un reflujo patológico del contenido gástrico hacia el esófago. (9)

El esófago de Barrett se define como una alteración histopatológica, donde ocurre una sustitución del epitelio propio del esófago, es decir el epitelio escamoso estratificado pasa a ser epitelio cilíndrico simple, esta transformación epitelial se observa a manera de lesiones asalmonadas que adoptan formas de lengüetas, circunferenciales o en islotes, que se extienden desde la unión gastroesofágica hacia el esófago proximal en forma ascendente, estos cambios se identifican por endoscopia digestiva alta, en donde se observa un área de afectación mayor a 1 cm y que se puede confirmar con la citología la presencia de metaplasia intestinal. (8)(10)

#### **Epidemiología y clasificación**

La ERGE predispone a la aparición de epitelio cilíndrico en el esófago distal con presencia de metaplasia gástrica o intestinal, siendo el factor desencadenante principal para que un porcentaje de pacientes desarrollen esófago de Barrett, siendo la única lesión premaligna que predispone a que una minoría de estos pacientes finalmente debute con adenocarcinoma de esófago; representando un riesgo de progresión de 0,3-0,6% al año aproximadamente. (3)(5) Algunos estudios demuestran una

## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

prevalencia de ERGE del 15% a nivel mundial, en América Latina, la prevalencia varía entre el 11.9-31.3% y en Ecuador es de hasta un 52,8%, estando relacionado principalmente con el sexo femenino y el consumo de alcohol. (11)

El esófago de Barrett puede tener una presentación asintomática, siendo más frecuente en hombres de raza blanca y al ser una patología adquirida y no congénita, es poco común la presentación en niños menores de 5 años. La prevalencia del esófago de Barrett puede alcanzar el 2-7% a nivel mundial y entre el 10-20% de los pacientes que presenten ERGE desarrollaran esófago de Barrett. (2)(12)

Se puede clasificar según la presencia o ausencia de erosiones; una ERGE sintomática sin evidencia endoscópica que muestre erosiones se define como enfermedad por reflujo no erosiva, mientras que una ERGE sintomática con evidencia de erosiones constituye una esofagitis erosiva. (4)

El EB se puede clasificar según la extensión del epitelio columnar, que va a tener una relación inversamente proporcional a la evolución clínica y a la adaptación al tratamiento, así tenemos: (5)(13)

- **Esófago de Barrett de segmento corto:** cuando la lesión metaplasica abarca una extensión < 3 cm del esófago distal, siendo la presentación más frecuente con una prevalencia de 10-20% y mostrando un menor riesgo de desarrollar displasia. (5)(14)
- **Esófago de Barrett de segmento largo:** cuando la lesión metaplasica involucra una extensión > 3 cm sobre la unión gastroesofágica, siendo la menos común con una prevalencia del 3-5%, pero mostrando un riesgo de hasta 15-20 veces más, de desarrollar adenocarcinoma esofágico. (5)(14)

Existe otro tipo de clasificación denominada clasificación endoscópica de Praga, en donde se valora la forma de prolongación de las lesiones, siendo en forma de lengüetas, islotes o circunferencial, tomando como referencia la longitud del desplazamiento circunferencial (C) y la máxima longitud (M) del segmento metaplásico afectado a nivel de la unión gastroesofágica identificado por endoscopia. (3)(5)(15)

### Factores de riesgo

- El reflujo gastroesofágico crónico con al menos 5 años de evolución representa el principal factor de riesgo para el desarrollo de Esófago de Barrett. (5)(16)

## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

- La hernia de hiato y obesidad central con un perímetro abdominal mayor a 85 cm en mujeres y 90 cm en hombres ha demostrado que existe un incremento de la presión intraabdominal, siendo este un factor predisponente de desarrollo de reflujo gastroesofágico. (5) (16)
- Un historial de tabaquismo representa otro factor de riesgo con un incremento de progresión de reflujo gastroesofágico y adenocarcinoma esofágico de hasta 1,7 veces más en comparación con personas no fumadoras sin ERGE. (5) (16)
- El Esófago de Barrett y el Adenocarcinoma de Esófago se presenta mayoritariamente en pacientes de sexo masculino y de raza caucásica. (5) (16)
- Los antecedentes familiares determinan otro factor de riesgo cuando existe historial de familiares de primer y segundo grado diagnosticados con Esófago de Barrett. (5) (16)
- Pacientes con una edad de 50 años o más representan un riesgo de progresión de entre el 2-9% en comparación con el resto de la población en general. (5) (16)

### Fisiopatología

El reflujo gastroesofágico es el retorno del contenido gástrico hacia el esófago producto de una alteración funcional del esfínter esofágico inferior. La agresión constante hacia la mucosa va a desencadenar una esofagitis erosiva por reflujo, estimulando la secreción de ácido clorhídrico, enzimas pancreáticas y sales biliares, estos fluidos representan un factor de riesgo en la fisiopatogenia del esófago de Barrett y del adenocarcinoma. (10)(17)

El ácido clorhídrico también va a promover la activación de la pepsina, que es uno de los responsables del daño a la mucosa esofágica. En la ERGE se produce un debilitamiento de la barrera antirreflujo, los factores defensivos intrínsecos del epitelio y del aclaramiento esofágico, provocando el reflujo del contenido gástrico del estómago al esófago. (10)

En personas sin ERGE, el reflujo fisiológico se produce cuando el esfínter esofágico inferior se relaja de manera esporádica en ausencia de la deglución, debido a un reflejo vagal que es provocado por la distensión gástrica. Cuando hay un aumento del contenido gástrico debido a la ingesta alimentaria, en la obstrucción pilórica o el síndrome de estasis gástrico, el contenido gástrico va a tener más posibilidades de retroceder, esto también puede ocurrir cuando el contenido gástrico se ubica cerca de la unión gastroesofágica o si aumenta la presión gástrica por el embarazo, obesidad o por el uso de fajas. (10)(18)



## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

### Manifestaciones clínicas

La presentación del esófago de Barrett suele ser asintomática, generalmente los pacientes con esta patología podrían presentar síntomas de ERGE, se debe tener en cuenta que la severidad de las manifestaciones clínica no es proporcional a la intensidad del reflujo. (5)(7)

Los síntomas clásicos son: pirosis (sensación de ardor que asciende del estómago al esófago o la parte inferior del tórax, con posibilidad de irradiación a cuello, faringe y espalda), se presenta hasta en el 95% de los pacientes, generalmente tiene una presentación postprandial empeorado por comidas abundantes, picantes o grasosas, junto con la regurgitación ácida, que aumenta al inclinarse o colocarse en posición supina y puede presentarse hasta en el 70% de los pacientes, también puede aparecer la disfagia que sugiere una alteración de la motilidad, la odinofagia puede aparecer a causa de la esofagitis y se acompaña de dolor torácico. (1)(4)

También, se pueden presentar síntomas como sialorrea, náuseas, eructos, hipo, vómito, epigastralgia y pesadez postprandial. (11)

Existen otros síntomas extra esofágicos como tos crónica irritativa, laringitis, sinusitis, neumonía, disfonía, fibrosis pulmonar, disnea nocturna, apnea del sueño y úlceras bucales, que se puede presentar hasta en el 20% de los pacientes con ERGE. (4)(6)(11)

### Diagnóstico

El acercamiento diagnóstico se basa principalmente en la sospecha clínica, pero también se puede apoyar de estudios complementarios para confirmar el diagnóstico.

**Endoscopia:** tiene una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de la ERGE. Su uso debe ser limitado, ya que no está indicada en la mayoría de los casos, y se debe diferenciar a los pacientes con ERGE con lesiones esofágicas, de aquellos que no las tienen, se justifica su uso en pacientes con ERGE mayor a 5 años de evolución o ERGE refractaria, frente a signos de alarma como disfagia, hemorragia digestiva, dolor torácico y pérdida de peso brusca, así como en aquellos pacientes con factores de riesgo para EB y en los casos con sospecha de esofagitis eosinofílica. La endoscopia permite evaluar y clasificar el grado de lesión de la mucosa esofágica, en donde se emplea la clasificación de Los Ángeles. (11)(19)



## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

**Figura 1.** Tomado de Lundell et al. Gut 1999;45(2):172-180.

Clasificación de Los Ángeles	
Grado A	≥ 1 ruptura mucosa ≤ 5 mm sin pasar pliegues
Grado B	≥ 1 ruptura mucosa > 5 mm sin pasar pliegues
Grado C	Una o más rupturas mucosas que pasan pliegues e involucran < 75% de la circunferencia del esófago.
Grado D	Una o más rupturas mucosas que involucran al menos el 75% de la circunferencia del esófago.

La endoscopia además permite la toma de biopsias, las cuales serán tomadas de múltiples zonas y se realiza cuando existe duda diagnóstica o sospecha de alguna complicación (pacientes con ERGE o con disfagia). Las biopsias se tomarán de cualquier área con sospecha de metaplasia, displasia o mucosa esofágica de aspecto anormal. (11)(19)(20)

La endoscopia también se usará para evaluar pacientes con clínica de ERGE que no responden al tratamiento empírico con Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP). (11)(19)

### Manometría esofágica

Clínicamente, los pacientes con segmento largo de EB, suelen tener síntomas de reflujo más severos, que aquellos con segmento corto. La Manometría Esofágica es la prueba que mide las presiones intraluminales del esófago y la coordinación de la actividad en la musculatura del mismo, no se emplea para diagnosticar ERGE y está indicada para la evaluación preoperatoria en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo con el fin de descartar alteraciones graves de la motilidad esofágica (acalasia, escleroderma). (11)

### Tratamiento

El tratamiento debe ser individualizado debido a la presentación variada de los síntomas y debe estar dirigido al control de la sintomatología. (17)

En la ERGE no erosiva el tratamiento es sintomatológico, mientras que en la ERGE erosiva, se busca el control y cicatrización de las erosiones, evitando la progresión a futuras complicaciones. (17)

El objetivo terapéutico frente al EB será evitar la progresión a displasia y adenocarcinoma estableciendo un diagnóstico oportuno y especializado. (21)

**Tratamiento no farmacológico:** se centra en cambiar el estilo de vida para disminuir los factores de riesgo predisponentes: evitar hábitos tóxicos como fumar o consumo de alcohol, control de sobrepeso y obesidad, siguiendo estrategias de nutrición adecuada. (17)

## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

**Tratamiento farmacológico:** los medicamentos utilizados en el manejo de la ERGE son: los inhibidores de la bomba de protones (IBP) como fármaco de primera línea por su eficacia, siendo el omeprazol el fármaco de elección a dosis de 20-30 mg diarios, ha demostrado una reducción significativa de la sintomatología clásica de la ERGE y efectos adversos raros, considerando una seguridad a largo plazo elevada. Se puede emplear de forma continua a dosis mínima según la respuesta sintomática y suspender cuando exista ausencia de la sintomatología o se puede emplear de forma intermitente a dosis estándar por periodos de 2-4 semanas durante cada evento recidivante. (17)(22)(23)

En la ERGE erosiva, el tratamiento deberá ser administrado por 8 semanas con IBP, con lo cual se alcanza un control de los síntomas y de las lesiones de hasta el 80% de los casos. En los casos de esofagitis grado C y D, se recomienda el uso de endoscopia de control entre las 8-12 semanas después del inicio del tratamiento para descartar la presencia de EB, debido a la alta recurrencia de las lesiones dentro de los primeros 6 meses después del tratamiento, por lo que se establecerá la posibilidad de resolución quirúrgica. (17)(24)(25)

### Discusión

La ERGE es una de las causas más frecuentes de consulta médica tanto en el primer nivel de atención, como en la consulta gastroenterológica. La ERGE al ser una patología con sintomatología muy variada, requiere de medidas diagnósticas y terapéuticas especializadas que permitan un control adecuado.

Siendo la identificación temprana tanto de los factores de riesgo como de la sintomatología típica de la enfermedad la base de la prevención. La pirosis y la regurgitación son los síntomas más frecuentes presentándose entre el 40-50% de los pacientes con ERGE y que también se acompañan de otros síntomas atípicos que orientan hacia la impresión diagnóstica, en las unidades de primer nivel es primordial identificar los factores de riesgo que predisponen a la progresión de la enfermedad y a complicaciones crónicas graves.

El diagnóstico se establece principalmente por las manifestaciones clínicas y se debe confirmar con la endoscopia digestiva alta, pero al no ser una prueba accesible en las unidades de primer nivel, se debe hacer énfasis en la identificación temprana de las manifestaciones clínicas con el fin de establecer un tratamiento que evite la complicación de los síntomas y la exposición crónica al reflujo del contenido gástrico.

## Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

Se puede establecer un tratamiento farmacológico efectivo para la ERGE a base IBP, que permitan controlar la enfermedad desde las unidades básicas de salud evitando la exposición crónica de reflujo y evitando la progresión a complicaciones como el EB y el adenocarcinoma esofágico.

El EB suele ser asintomático en la mayoría de los casos, por lo que es importante sospechar en pacientes con presencia de pirosis y regurgitación, que corresponden a síntomas de alerta, y factores de riesgo como fumador y obesidad. Su diagnóstico se basa en la realización de endoscopia sin embargo su diagnóstico definitivo se basa en la observación de metaplasia en muestras histopatológicas del tejido lesionado. Debido a que este tipo de metaplasia predispone a malignización es fundamental su diagnóstico temprano y oportuno, para así, poder darle un tratamiento integral adecuado, basándonos en 3 pilares como son la erradicación de la enfermedad por reflujo, con cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico ajustado a la respuesta clínica del paciente; una vigilancia endoscópica personalizada con base en los hallazgos histopatológicos del tejido lesionado y un tratamiento definitivo de acuerdo al grado de displasia, tomando en cuenta nuevas técnicas endoscópicas como la ablación por radiofrecuencia.

### Referencias

1. A.López-Colombo, M.-Q. L.-M.-A.-G.-J.-A.-H.-J.-J. (2017). Risk factors associated with gastroesophageal reflux disease relapse in primary care patients successfully treated with a proton pump inhibitor. *Revista de Gastroenterología de México*, 82, 106-114. doi:<https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2016.09.001>
2. Martín Quirán, M., Manzotti, L., Tawil, J., Bolino, C., Canseco, S., Sanchez, C., . . . Cerisoli, C. (2020). Prevalencia de esófago de Barrett en lengüetas menores a 1 cm. *Acta Gastroenterológica Latinoamericana*, 50(4), 418-428. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199365992006>
3. Alfredo Hierro González, L. T. (2020). Clinical, Endoscopic and Histological Description of Barrett's Esophagus. *Arch.cuba.gastroenterol.*, 1(2).
4. Eduardo Josué Milian-Hernández, J. B.-G.-Z.-C.-V. (2021). Comportamiento clínico endoscópico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. *Dominio de las ciencias*, 7(1), 509-519. doi:<http://dx.doi.org/10.23857/dc.v7i1.1656>

Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

5. FERRO DL, M. S. (2018). Esófago de Barrett. Enciclopedia Cirugía Digestiva, 1(172), 1-17. Obtenido de <https://sacd.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/Esofago-de-Barrett.pdf>
6. LópezDíaz, A. (2020). Gastro-oesophageal reflux disease. Medicine - Programa de Formación Médica Continuada Acreditado, 13(7), 374-383. doi:<https://doi.org/10.1016/j.med.2020.05.002>
7. Valverde, D. J., Padilla, D. C., & Villalobos, D. T. (2019). Actualización en esófago de Barrett. Revista Médica Sinergia, 4(12), 304. doi:<https://doi.org/10.31434/rms.v4i12.304>
8. Aliaga Ramos, J. J. (2022). Esófago de Barrett con displasia de alto grado o adenocarcinoma intramucoso: ¿EMR o ESD? Revista de Gastroenterología del Perú, 39(3), 265-272. Obtenido de [http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1022-51292019000300010&lng=es&tlng=es](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1022-51292019000300010&lng=es&tlng=es).
9. G., C. E. (2019). ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFAGICO (ERGE). Hospital Clínico San Borja-Arriarán, 527–553. Obtenido de <https://cirugiasanborja.cl/wp-content/uploads/2019/06/2.-Enfermedad-por-Reflujo-GastroEsofagico-3.pdf>
10. J.L. Herrera Elizondo, R. M. (2017). Prevalence of Barrett's esophagus: An observational study from a gastroenterology clinic. Revista de Gastroenterología de México, 82(4), 296-300. doi:<https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2017.01.006>
11. Ortiz, F. G., Tixi, C. E., Vinueza, V. V., & Manzano, E. P. (2019). Enfermedad por reflujo gastroesofágico. RECIAMUC, 3(2), 572-596. Obtenido de <http://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/354>
12. F. Valdovinos-Andraca, A. B.-M.-Z.-G.-L.-M.-R.-Á. (2018). Barrett's esophagus: Ten years of experience at a tertiary care hospital center in Mexico. Revista de Gastroenterología de México, 83(1), 25-30. doi:<https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2017.03.007>
13. Rajesh Krishnamoorthi, S. S. (2018). Factors Associated With Progression of Barrett's Esophagus: A Systematic Review and Meta-analysis. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 16(7), 1046-1055. doi:<https://doi.org/10.1016/j.cgh.2017.11.044>

Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

14. Fernández-Esparrach, G. y.-G. (2020). Esófago de Barrett: ¿Cómo evaluarlo e informarlo?, ¿cuándo biopsiar y cuándo no? *Acta Gastroenterológica Latinoamericana*, 50(4), 44-46. Obtenido de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199367756009>
15. Milagros Salazar González, J. N. (2021). Characterization of patients with esophagus premalignant lesions. *MEDISAN*, 25(2). Obtenido de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192021000200265&script=sci\\_arttext&tlng=en](http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1029-30192021000200265&script=sci_arttext&tlng=en)
16. Constanza Ciriza de losRíos, M. A.-R. (2022). Enfermedades del esófago (I): enfermedad por reflujo gastroesofágico. Diagnóstico y tratamiento. *FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria*, 29(4), 164-173. doi:<https://doi.org/10.1016/j.fmc.2021.08.002>
17. F. Huerta-Igaa, M. B.-F.-T.-D.-d. (2016). Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico: recomendaciones de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. *Asociación Mexicana de Gastroenterología*, 81(4), 208-222. doi:10.1016/j.rgm.2016.04.003
18. XavierCalvet. (2016). Oesophageal disease: gastroesophageal reflux disease, Barrett's oesophagus, achalasia and eosinophilic oesophagitis. *Gastroenterología y Hepatología*, 39(1), 47-52. doi:[https://doi.org/10.1016/S0210-5705\(16\)30174-1](https://doi.org/10.1016/S0210-5705(16)30174-1)
19. Mittal, R. V. (2020). Esophageal Motility Disorders and Gastroesophageal Reflux Disease. *New England Journal of Medicine*, 382(20), 1961–1972. doi:10.1056/nejmra2000328
20. Elizondo VJR, C. P. (2019). Actualización en esófago de Barrett. *Revista Médica Sinergia*, 4(12), 304. Obtenido de <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=90284>
21. Mildred Cecilia Armenteros-Torres, R. A.-Q.-d.-O.-M.-E.-N. (2021). The Hybrid-APC in the endoscopic treatment of Barrett's esophagus. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 25(1). Obtenido de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1025-02552021000100016](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-02552021000100016)
22. L. Soifer, J. T.-T. (2021). Degree of concordance on the management of patients with gastroesophageal reflux disease. A study among specialists that are members of the

Importancia del diagnóstico temprano en pacientes con Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico para detección oportuna de Esófago de Barrett

---

- Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología (SLNG). Revista de Gastroenterología de México, 70-79. doi:<https://doi.org/10.1016/j.rgmx.2021.02.006>
23. José P. Galicia, R. L. (2018). Prevalencia de Esófago de Barrett en pacientes con y sin síntomas de Reflujo. Rev. Fac. Med, 1(24), 27-32. Obtenido de <https://revista-medicina.ufm.edu/publicaciones/wp-content/uploads/2019/10/Prevalencia-de-Es%C3%B3fago-de-Barrett-en-pacientes-con-y-sin-s%C3%ADntomas-de-Reflujo.pdf>
24. Ulfran Castro Salas, J. C. (2020). La identificación del reflujo gastroesofágico fisiológico evita estudios innecesarios. Biociencias, 15(2), 119-128. Obtenido de <https://doi.org/10.18041/2390-0512/biocien-cias.2.7357>
25. Cisternas, D. (2022). Diagnosticando la enfermedad por reflujo gastroesofágico en 2022: los cómo y los por qué. Acta Gastroenterológica Latinoamericana, 52(2), 128–134. doi:<https://doi.org/10.52787/agl.v52i2.215>