


Limpieza y cuidados del orificio de salida del catéter de D.P.C.A.

M. Martín, R. Velázquez, F. De Alvaro, R. Fadrique, L. Heras, B. Lázaro.
Servicio Nefrología. Hospital Clínico Universitario. Valladolid.




La diálisis peritoneal ambulatoria continua es una forma de tratamiento sustitutivo de la insuficiencia renal crónica terminal, cada vez más extendida.

La peritonitis sigue siendo la complicación más frecuente de dicho tratamiento, siendo la infección del orificio de salida uno de los puntos más habituales de contaminación.

Presentamos una guía para la limpieza y cuidados del orificio de salida del catéter, para evitar su infección y de esta forma suprimir una de las fuentes más importantes de contaminación de esta técnica.

Esta información básica, ilustrada con dibujos, es entregada a todos nuestros pacientes en D.P.C.A. al finalizar el periodo de aprendizaje.

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE VALLADOLID





ES ESENCIAL
MANTENER EL ORIFICIO DE SALIDA
DEL CATETER SANO. PARA QUE LA DIALISIS
PERITONEAL SEA SATISFACTORIA.



LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES
SE HAN DISEÑADO PARA AYUDARLE A CUIDAR
EL ORIFICIO DE SALIDA DE SU CATETER.



DEFINICIONES


ORIFICIO DE SALIDA

La piel que rodea al catéter de diálisis peritoneal



TUNEL


El trayecto que sigue su catéter desde la piel, a través de la grasa y el músculo, hasta alcanzar la cavidad peritoneal



EXUDADO

Sangre o líquido claro que sale por el orificio de salida del catéter después de su colocación o después de traumatismos sobre el catéter.

Normalmente desaparece tras el proceso de curación



COSTRA

Material seco que se forma en el orificio de salida. No tiene relación con cirugía o traumatismo.


Debe ser retirado durante el lavado diario.



CARACTERISTICAS DE UN ORIFICIO DE SALIDA SANO

LIMPIO

SECO



NO ROJO

NO DOLOROSO

SIN EXUDADO

SIN COSTRA

CUIDADOS DE UN ORIFICIO DE SALIDA SANO


Un especial cuidado del orificio de salida del catéter es esencial para mantenerlo sano.

El cuidado rutinario incluye:

- 1 Lavado de la piel con el fin de retirar la suciedad y disminuir el número de bacterias.
- 2 Examinar el orificio y el túnel para descartar signos de infección.
- 3 Fijar el catéter con esparadrapo para evitar tracciones y retorcimientos.

El cuidado rutinario debe hacerse:

- 1 Diariamente
- 2 Siempre que el orificio esté húmedo o sucio



METODO DE CUIDADO DEL ORIFICIO DE SALIDA DEL CATETER

- 1 Lavado de las manos
- 2 Lavado cuidadoso del catéter de la forma que se le ha enseñado.
- 3 Secar cuidadosamente con una gasa o secador.
- 4 Examinar cuidadosamente el orificio y el túnel.
- 5 Fijar el catéter con esparadrapo.



COMPLICACIONES EN EL ORIFICIO DE SALIDA DEL CATETER

inflamación:

Enrojecimiento del orificio

infección

Enrojecimiento con calor, dolorimiento, hinchazón o formación de exudado.



Si su orificio de salida del catéter se vuelve inflamado o infectado, llame a su enfermera de DPAC, o al médico inmediatamente.



INFECCION DEL ORIFICIO DE SALIDA

CALOR

DOLOR



SENSIBLE

EXUDADO

IRRITACION

HINCHAZON

TRATAMIENTO DE LA INFECCION DEL ORIFICIO DE SALIDA

hay tres componentes en el tratamiento.

- 1 Antibióticos intravenosos o en el líquido de diálisis peritoneal
- 2 Antibióticos orales
- 3 Cuidados locales del orificio de salida del catéter

es muy importante:

- 1 Tomar los antibióticos a su hora.
- 2 Completar todo el tratamiento
- 3 Acudir al Hospital para evaluación



COMPLICACIONES DE LA INFECCION DEL ORIFICIO DE SALIDA

Pueden ocurrir las siguientes complicaciones:

INFECCION DEL TUNEL
PERITONITIS
PERDIDA DEL CATETER

Es más probable que ocurran estas complicaciones cuando

- 1 No se trata.
- 2 No se trata precozmente.
- 3 Se trata inadecuadamente.
- 4 No responde al tratamiento.

SIGNOS Y SINTOMAS DE LAS COMPLICACIONES

infección del túnel

- 1 Dolor o sensibilidad en el trayecto del catéter
- 2 Inflamación o endurecimiento del túnel
- 3 Piel sobre el túnel caliente y enrojecida

peritonitis

- 1 Líquido turbio
- 2 Dolor abdominal, malestar o retortijones.

NOTA

Estos síntomas pueden acompañarse de pérdida de apetito, fiebre, náuseas, vómitos o pobre drenaje de líquido.

Si usted tiene síntomas de infección del túnel o peritonitis, llame a su enfermera de Diálisis Peritoneal, o a su médico inmediatamente.



RETIRADA DEL CATETER

La retirada del catéter de Diálisis Peritoneal puede ser necesaria cuando la infección del orificio de salida se asocia con:

- 1 INFECCION DEL TUNEL
- 2 PERITONITIS PERSISTENTE
- 3 PERITONITIS DE REPETICION



CUIDADOS PARA MANTENER EL ORIFICIO DE SALIDA DEL CATETER SANO

- Lavarse las manos antes de tocar el catéter.
- Seguir las instrucciones rutinarias de cuidado del catéter.
- Ducharse diariamente.
- Mantener los pliegues de la piel limpios y secos.
- Llevar ropa interior limpia.
- Examinar el orificio de salida diariamente.
- Mantener el orificio de salida limpio y seco.
- Sujetar siempre el catéter con esparadrapo.



ACTIVIDADES PELIGROSAS PARA EL ORIFICIO DE SALIDA



TRACCIONES Y REYORCIMENTOS



RASCARSE



IRRITACION POR LA ROPA



SUCIEDAD



INMERSION EN AGUA



COSTRA



POLVOS



CREMAS Y POMADAS NO PRESCRITAS



ALCOHOL



¡¡USTED PUEDE HACERLO!!

CUIDADOS DE RUTINA



EXAMEN DEL ORIFICIO

AVISAR PRONTO

PARA CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL TELEFONO: 25 40 00 (Extensión 123 ó 124)

