

merulopaties amb glomèruls òpticament normals observades en el curs d'hemosarcomes, l'evolució de la síndrome nefròtica ha estat fidelment paral·lela a l'evolució de la lesió causal.

La patogènia de les lesions és atribuïda a un dipòsit de complexos immunes en el vessant extern de la membrana basal glomerular resultat de l'acció de diversos sistemes antigen-anticòs lligats al càncer. Hom ha pogut demostrar la presència en els glomèruls d'antígens carcino-embrionaris.

El diagnòstic precoç de l'embaràs gemellar

Els embarassos gemellars impliquen un risc fetal tres o quatre vegades superior al dels embarassos normals. Interessa, doncs, fer-ne el diagnòstic precoç. L'ecografia constitueix en aquest aspecte un gran avenç; l'únic inconvenient és que la seva utilització ha d'ésser més aviat tardana. La dosificació ràdio-immunològica de l'hormona coriònica gonadotròpica (HCG) és una ajuda ja en les primeres setmanes de l'embaràs. Diuen que set dies després de la concepció aquesta hormona ja és detectable en el plasma. Al cap de 4 a 5 setmanes les xifres ja són valorables, i en cas d'embaràs gemellar són el doble de les que es troben en el monofetal.

És un mètode que cal retenir i assajar.

El tractament de la colelitiasi per l'àcid quenodesoxicòlic

Ja fa uns quants anys que hom administra l'àcid quenodesoxicòlic per al tractament de la litiasi biliar amb càlculs de colesterol. Els resultats són satisfactoris en xifres absolutes perquè és l'únic tractament que aconsegueix la desaparició dels càlculs per mètodes incruents. En xifres relatives ja és una altra qüestió, perquè comptat i debatut el tant per cent de càlculs que es fonen no passa del vint.

Cercant la dosi òptima, s'han assajat les de 500, 750 i 1000 mg diaris i hom ha vist que la de 500 mg diaris és ineficaç, i que els efectes dels 750 i dels 1000 mg són si fa no fa iguals. La desaparició dels càlculs no passa ni amb una ni amb l'altra de la cinquena part dels casos. La dissolució parcial sí que és més freqüent amb la dosi més alta. També els efectes, complets i incomplets, s'obtenen més aviat donant 1000 mg diaris que donant-ne 750.