

Caso Clínico

Resumen del expediente presentado ante la S.E.D.O. - Caso Clínico n.º 1

M.^a CRUZ DE ANDRES CORADA

ANDRES CORADA MC (1987): Resumen del expediente presentado ante la SEDO
Caso Clínico n.º 1. *Ortod Esp*, 28, 173-176.

CASO N.º 1 - G.L.A.

Edad 15 años-3 meses
Sexo Femenino

Exploración

- Paciente mesocéfala con facies armónica.
- Buena tonicidad labial y maseteros hipertónicos.
- Clase II, División 2.^a.

Estudio de modelos

Arcada superior

- Cuadrangular.
- Mesialización de sectores laterales con rotación 16 y 26.
- Caninos en mesiovestibulorotación.
- Linguoversión de incisivos.

Arcada inferior

- Ovalada.
- Vestibuloversión del 31.
- Discrepancia 1,5 mm.

Oclusión

- Clase II molar y canina.
- Sobremordida 3/13.
- Resalte 2,5 mm.

Análisis cefalométrico

- Linguoversión de incisivo central superior con una posición aceptable del incisivo inferior.

- Clase II ósea por retrognacia mandibular.
- Patrón de crecimiento mesofacial.
- Hipogonia.

Diagnóstico

- Clase II, División 2.^a.
- Sobremordida.
- Apiñamiento superior severo.

Tratamiento

- Para conseguir espacio en la arcada superior, se hicieron extracciones del 14 y 24.
- Se corrigió la sobremordida con un arco utilitario superior de intrusión, al mismo tiempo se distalizaron los caninos superiores con arcos seccionales para posteriormente retruir el frente superior con arcos de cierre. A la vez se fue nivelando la arcada inferior. Se acabó con arcos de 0,17 × 0,25 ideales, dejando los molares en Clase II.

Retención

- Como aparato de retención llevó un posicionador.

Duración del tratamiento activo

- Un año, cinco meses.

Resultados

- Mejoró la Clase II.
Se corrigió la sobremordida, consiguiendo una buena intercuspidación.




Fig. 1. Fotos de cara del perfil derecho y frente, antes del tratamiento arriba y después del tratamiento abajo.




Fig. 2. Vistas laterales y oclusales de los modelos antes y después del tratamiento.




Fig. 3. Cefalograma antes y después del tratamiento (trazos continuo y discontinuo, respectivamente). Abajo las superposiciones para evaluar los cambios habidos en el tratamiento.